

[Página Principal](#) [IT.Q003](#) [Módulo 2. Atención enfermera al final de la vida.](#)

Prueba de conocimientos Módulo 2

Comenzado el lunes, 25 de marzo de 2024, 08:52

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 25 de marzo de 2024, 10:11

Tiempo empleado 1 hora 18 minutos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la obstrucción intestinal el tratamiento puede incluir: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Descompresión abdominal mediante sondaje nasogástrico conectado a bolsa.
- b. Ocreotride
- c. Metoclopramida
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los síntomas y signos de linfedema nos podemos encontrar: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Piel eritematosa, delgada y traslúcida.
- b. Hipoestesias, parestesia y alodinia.
- c. Afectación ganglionar tumoral.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A un paciente paliativo con diarrea le recomendaríamos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Limitar el azúcar y las grasas en la dieta. ✓
 - b. Beber mucho volumen de líquidos de una sola vez y con gran contraste de temperatura.
 - c. Comer alimentos integrales, así como legumbres y frutas.
 - d. Ingerir bebidas gaseosas.
-

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el tratamiento de la anorexia en el paciente paliativo se usan: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Dexametasona como estimulante del apetito.
 - b. Domperidona para aumentar el funcionamiento gastrointestinal enlentecido.
 - c. Acetato de megestrol como estimulante del apetito.
 - d. Todas son correctas. ✓
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método válido para la detección de alteraciones en la deglución es: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Test clínico volumen viscosidad (MECV-V). ✓
 - b. Test de Lattinen.
 - c. McGill Pain Questionnaire (MPQ).
 - d. B y c son correctas.
-

Pregunta

6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Entre las alteraciones hematopoyéticas en el paciente paliativo nos encontramos con: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Anemia. ✘
- b. Trombopenia.
- c. Neutropenia.
- d. Todas con correctas.

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de elección para la administración de fármacos en el paciente paliativo? Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Subcutánea. ✘
- c. Oral.
- d. Rectal.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el paciente paliativo existen alteraciones en la nutrición debido a problemas al tragar, deglutir o masticar, náuseas, vómitos, anorexia, dificultades en la absorción y efectos secundarios a fármacos, de ahí que la enfermera como objetivo prioritario en los cuidados básicos establezca: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Invitaremos a que coma todo lo posible, cuanto más mejor.
- b. Se servirá en cantidades copiosas y platos grandes para nutrir bien al paciente.
- c. Añadiremos salsas picantes con textura adecuada para propiciar la deglución.
- d. Haremos hincapié en los cuidados higiénicos de la boca e hidratación adecuada. ✔

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las ventajas de la vía subcutánea se encuentra. Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Técnica segura y poco agresiva.
- b. Puede evitar o reducir la hospitalización.
- c. Limitación de fármacos y fluidos. ✓
- d. No precisa de medidas especiales de mantenimiento.

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para valorar la disnea en un paciente paliativo utilizaremos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Cancer Dyspnea Scale. ✗
- b. Verbal Scale Rating.
- c. Escala Visual analógica (EVA).
- d. Todas son correctas.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la incorrecta. La compresión medula:

Seleccione una:

- a. En muchos casos supone el debut oncológico del paciente.
- b. La demora en la atención puede producir parálisis irreversible e incontinencia de esfínteres.
- c. No supone una emergencia médica. ✓
- d. A y b son correctas.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las medidas para prevenir la mucositis podemos destacar: Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Calentar alimentos a altas temperaturas. ✓
- b. Buena higiene dental con cepillo suave.
- c. Realizar colutorios con agua con bicarbonato o manzanilla.
- d. B y c son correctas

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta. En el síndrome de vena cava superior.

Seleccione una:

- a. Entre los signos y síntomas se encuentra edema en esclavina, ingurgitación yugular y cianosis en cara y miembros superiores.
- b. Puede ser debida a tumores de pulmón, trombosis de vena cava superior por trastornos paraneoplásicos y pacientes con accesos venosos centrales relacionado con la trombosis del mismo.
- c. Entre los tratamientos se encuentra la radioterapia y colocación de endoprotesis.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la mucositis Grado 1 según la clasificación de la OMS. Seleccione la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. El paciente sólo tolera líquidos.
- b. El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.
- c. El paciente presenta eritema en la mucosa oral. ✓
- d. El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las terapias complementarias del dolor podemos encontrar. Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Técnicas de relajación.
- b. Musicoterapia.
- c. Risoterapia.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la evaluación de los síntomas del paciente con necesidades paliativas: Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se debe evaluar la intensidad de los mismo.
- b. La frecuencia con que se producen.
- c. La evaluación la hace el personal sanitario sin contar con el paciente. ✓
- d. La opinión del paciente es importante.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos de la incapacidad de la persona para retener la orina, unido en la mayoría de los casos de un deseo continuo de orinar, nos referimos a: Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Retención urinaria.
- b. Tenesmo vesical.
- c. Espasmo vesical.
- d. Incontinencia urinaria. ✓

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el alivio de la xerostomía en el paciente paliativo es recomendable: Seleccione la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Chupar trocitos de hielo saborizados con zumo de frutas.
- b. Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.
- c. Realizar enjuagues con manzanilla con limón.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La xerostomía es un síntoma frecuente en los pacientes paliativos. Entre sus causas están: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Fármacos como opioides y corticoesteroides.
- b. Radioterapia.
- c. A y b son correctas. ✓
- d. La hiperhidratación.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la hipercalcemia tumoral aparecen síntomas como: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Anorexia.
- b. Polidipsia.
- c. Deshidratación.
- d. Todas son correctas. ✓

Actividad previa

◀ Polos de manzanilla para la mucositis

Ir a...

Siguiente actividad