



1) Los resultados que muestran los estudios en relación con la prevalencia de la ansiedad son muy homogéneos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones al respecto es incorrecta?

- ☐ a) Newcomb et al. utilizaron la escala TSI (Trauma Symptom Inventory) para valorar el grado de ansiedad.
- ☐ b) Los resultados entre víctimas de abuso sexual y no víctimas son una razón de posibilidades de 2,00 según el estudio realizado por Li et al.
- ☒ c) Fergusson et al. llevaron a cabo un estudio descriptivo transversal.
- ☐ d) Cortés et al. obtuvieron niveles más elevados de ansiedad en víctimas con respecto a las no víctimas.
- ☐ e) La ansiedad supone un diagnóstico a consecuencia del abuso sexual infantil, que, además, se encuentra más prevalente en mujeres que en hombres.

2) ¿Cuál es el factor más relevante en los problemas de estrés, ansiedad y depresión en la vida adulta?

- ☐ a) Situación sentimental.
- ☐ b) Relaciones familiares.
- ☐ c) Política.
- ☐ d) Vida social.
- ☒ e) Situación laboral.

3) ¿Cuál es la única sustancia psicoactiva donde se han encontrado diferencias de consumo entre estudiantes y profesionales?

- ☒ a) Alcohol.
- ☐ b) Tabaco.
- ☐ c) Marihuana.
- ☐ d) Heroína.
- ☐ e) Cocaína.

4) En cuanto a las conclusiones de las consecuencias psiquiátricas del abuso sexual infantil, podemos afirmar que:

- ☐ a) La mayoría de los estudios analizados destacan una menor prevalencia de la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático.
- ☒ b) Los diagnósticos fueron más frecuentes, con diferencias estadísticamente significativas, en las víctimas de abuso sexual infantil que en las no víctimas.



- ☐ c) Mostraron una mayor prevalencia conforme menor era la gravedad del abuso.
- ☐ d) Sería conveniente aumentar la producción científica de estudios transversales que permitieran identificar mejor los diagnósticos psiquiátricos a partir de la etapa tardía del abuso sexual infantil.
- ☐ e) Todos los esfuerzos van destinados a detectar los «casos» tras su cronificación.

5) En relación con los modelos de herencia y con la arquitectura genética de la esquizofrenia, sabemos que:

- ☐ a) Es un trastorno monogénico de herencia mendeliana.
- ☐ b) Es un trastorno explicado exclusivamente por el efecto de factores ambientales durante etapas prenatales.
- ☐ c) En la etiología de la esquizofrenia, están implicadas múltiples variantes genéticas comunes (polimorfismos) de efecto menor.
- ☐ d) En la etiología de la esquizofrenia, están implicadas variantes genéticas raras o de baja frecuencia que suelen tener un mayor impacto sobre el riesgo (en comparación con las variantes comunes).
- ☐ e) Las respuestas c y d son correctas.

6) La heredabilidad es un parámetro que:

- ☐ a) Nos indica cuál es la arquitectura genética del rasgo que estamos estudiando.
- ☐ b) Nos indica cuál es el papel del ambiente en el origen de un trastorno.
- ☐ c) Nos indica cuál es la probabilidad de heredar el color azul de ojos.
- ☐ d) Nos indica qué proporción de la varianza del fenotipo es debida a las diferencias genéticas.
- ☐ e) En un rasgo complejo, siempre tendrá el valor de 1.

7) ¿Cuál de las siguientes es una escala utilizada para valorar la calidad del sueño?

- ☐ a) Test de Richmond.
- ☐ b) Test de Fagerström.
- ☐ c) Índice de Pittsburgh.
- ☐ d) Escala Norton.
- ☐ e) Índice de Barthel.

8) ¿Cuál de los siguientes enunciados respecto a los pensamientos rumiativos es correcto?

- ☐ a) El grupo de profesionales presentó niveles más altos de rumiación que el de estudiantes.
- ☐ b) Los pensamientos rumiativos no se relacionan con el consumo de sustancias en ninguna etapa de la vida.
- ☐ c) Los pensamientos rumiativos tienen siempre consecuencias negativas para el sujeto.
- ☐ d) La rumiación va aumentando a medida que se alcanza la edad adulta.
- ☐ e) Los pensamientos rumiativos pueden tener un papel adaptativo en el desarrollo personal.

9) Con respecto a los estudios realizados o por realizar acerca del abuso sexual infantil, es incorrecto que:

- ☐ a) Los estudios comunitarios manifiestan que la probabilidad de padecer un trastorno mental en el futuro en niños víctimas de abusos sexuales se multiplicaría de dos a doce veces con respecto a aquellos que no han sufrido dicho abuso.
- ☐ b) Los principales motivos para empezar a investigar acerca de los abusos sexuales infantiles son el fin de detectarlos de una forma precoz y poder llevar a cabo un abordaje individualizado de cada uno de ellos.
- ☐ c) Son números, diversos y amplios en el tiempo los estudios epidemiológicos realizados que abordan el abuso sexual infantil.
- ☐ d) David Finkelhor, en 1994, recogió datos de más de 20 estudios epidemiológicos de diferentes países acerca de este problema y, en España, los resultados fueron del 23 y el 15 % en mujeres y hombres, respectivamente.
- ☐ e) Sería conveniente aumentar la producción científica de estudios longitudinales, o de seguimiento, que permitiera identificar mejor los diagnósticos psiquiátricos a partir de la etapa inmediata del abuso sexual infantil.

10) ¿Cuál es la sustancia psicoactiva con mayor aceptación social entre los jóvenes?

- ☐ a) Tabaco.
- ☐ b) Alcohol.
- ☐ c) Marihuana.
- ☐ d) Cocaína.
- ☐ e) Otra.



**BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA**
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

