

Comenzado el jueves, 25 de febrero de 2021, 23:56

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 26 de febrero de 2021, 00:28

Tiempo empleado 32 minutos 13 segundos

Puntos 40,00/40,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la toxicidad renal de la inmunoterapia. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Es una de las toxicidades más frecuentes ✓
- b. Las toxicidades renales más reportadas han sido la insuficiencia renal y la hiponatremia
- c. Ante la presencia de una insuficiencia renal aguda en un paciente en tratamiento con inmunoterapia, siempre nos tenemos que plantear esta posibilidad, pero no debemos olvidar que debemos realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades.
- d. En toxicidades severas, es recomendable la realización de una ecografía, y, si procede, biopsia y una valoración por el nefrólogo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es una de las toxicidades más frecuentes

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la toxicidad hipofisaria de la inmunoterapia,

Señale la **respuesta correcta**

Seleccione una:

- a. Su diagnóstico suele ser fácil, ya que la clínica asociada es prácticamente patognomónica.
- b. La técnica de imagen de elección es una resonancia cerebral. ✓
- c. La posibilidad de hipogonadismo o hipotiroidismo secundario permanente es muy baja.
- d. En el tratamiento de la hipofisitis, el tratamiento sustitutivo con cortisol y levotiroxina deben iniciarse simultáneamente para evitar toxicidades severas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La técnica de imagen de elección es una resonancia cerebral.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La atención social en el campo de la salud...

Seleccione una:

- 1. Tiene como objetivo cuidar las carencias sociales que han aparecido o se han visto agravadas a raíz de la aparición de la enfermedad.
- 2. Tiene como objetivo resolver aquellas cuestiones que han aparecido con la enfermedad y que no existían antes del diagnóstico.
- 3. Se centra, exclusivamente, en la gestión de recursos sociosanitarios.
- 4. Tiene como objetivo cuidar aquellas carencias sociales que han aparecido o se han visto agravadas a raíz de la aparición de la enfermedad, en el contexto de intervención a nivel preventivo, resolutorio y educativo. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene como objetivo cuidar aquellas carencias sociales que han aparecido o se han visto agravadas a raíz de la aparición de la enfermedad, en el contexto de intervención a nivel preventivo, resolutorio y educativo.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué caso estaría indicada la extracción de una pieza dental antes del inicio de la radioterapia?

Seleccione una:

- a. Presencia de placa bacteriana.
- b. Diagnóstico de líquen plano.
- c. Presencia de una pequeña caries oclusal en un molar.
- d. Molar con una lesión periapical extensa. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Molar con una lesión periapical extensa.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de desarrollar toxicidad pulmonar de la inmunoterapia?

Señale la **respuesta correcta**

Seleccione una:

- a. Neoplasia de pulmón
- b. Patología pulmonar previa
- c. Combinación de inhibidores de puntos de control inmune
- d. Sobreexpresión de PDL1 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sobreexpresión de PDL1

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué medidas adoptamos cuando se aplica la radioterapia para disminuir efectos colaterales como el trismo?

Seleccione una:

- 1. Radioterapia de Intensidad Modulada.
- 2. Adecuar la dosis de radioterapia total.
- 3. Usar radioprotección.
- 4. Todas las anteriores. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

Seleccione una:

- a. El tratamiento nutricional en cáncer de cabeza y cuello debe realizarse en todos los casos, ya que se trata de pacientes de alto riesgo. ✓ La respuesta es correcta. La afirmación que es incorrecta en esta actividad es la primera, puesto que el tratamiento nutricional en cáncer de cabeza y cuello no debe realizarse en todos los casos.
- b. El cribado nutricional en los pacientes con tumores de cabeza y cuello clasificará al paciente en riesgo nutricional o no.
- c. El tratamiento nutricional en cáncer de cabeza y cuello deberá realizarse siempre después de una valoración nutricional completa.
- d. El tratamiento nutricional en cáncer de cabeza y cuello dependerá del estado nutricional actual del paciente y del tratamiento oncológico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El tratamiento nutricional en cáncer de cabeza y cuello debe realizarse en todos los casos, ya que se trata de pacientes de alto riesgo.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

De los cinco niveles que se establecen para el cuidado de la xerostomía, ¿qué posición ocupa el tratamiento farmacológico?

Seleccione una:

- a. El primer nivel.
- b. El segundo nivel.
- c. El tercer nivel. ✓ La respuesta es correcta.
- d. No ocupa ninguno porque depende del caso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El tercer nivel.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las nuevas tecnologías utilizadas en radioterapia disminuyen la mucositis aguda cuando hacemos tratamientos de cabeza y cuello.

Seleccione una:

- a. Si, puesto que permiten disminuir las dosis en zonas no incluidas en el volumen tumoral. ✓ La respuesta es correcta.
- b. No, es imposible.
- c. Esto es cierto en los pacientes que no utilizan quimioterapia.
- d. La primera y la tercera respuesta son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si, puesto que permiten disminuir las dosis en zonas no incluidas en el volumen tumoral.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**:

Seleccione una:

- a. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente no aumenta la toxicidad a nivel laríngeo. ✓ La respuesta es correcta. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente sí aumenta la toxicidad a nivel laríngeo.
- b. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente es más efectiva en el control de la enfermedad neoplásica.
- c. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente precisa medidas de soporte como sonda nasogástrica, etc.
- d. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente suele requerir tratamiento con esteroides.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente no aumenta la toxicidad a nivel laríngeo.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Son factores de riesgo para la aparición de toxicidad inmunomediada. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Los antecedentes familiares o personales de enfermedades autoinmunes
- b. Diferentes fármacos como los antiarrítmicos y los AINES ✓
- c. Las infecciones por gérmenes oportunistas
- d. La infiltración inmune

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diferentes fármacos como los antiarrítmicos y los AINES

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a la toxicidad hepática de la inmunoterapia. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Aparece con mayor frecuencia con la combinación de antiPD1 y anti CTLA4 que en monoterapia
- b. Habitualmente es asintomática
- c. Es imprescindible descartar otras causas mediante la realización de una anamnesis dirigida, descartando enolismo y otros tratamientos, realización de serologías víricas, estudio de la autoinmunidad, del hierro, ecografía abdominal e incluso una biopsia hepática.
- d. En pacientes con toxicidad severa que no responden a corticoterapia endovenosa, puede utilizarse inmunosupresores como el infliximab ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En pacientes con toxicidad severa que no responden a corticoterapia endovenosa, puede utilizarse inmunosupresores como el infliximab

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Desde el punto de vista de la atención integral al paciente con cáncer, ¿por qué es importante conocer los aspectos relacionados con su estructura y organización familiar?

Seleccione una:

- a. Nos permite estar alerta sobre cambios que puedan darse en cuanto a las dinámicas y roles establecidos en el funcionamiento familiar y que pudiesen repercutir en la atención al paciente o en la sobrecarga del cuidador.
- b. Desde el punto de vista asistencial, este no es un aspecto relevante a tener en cuenta en la atención al paciente oncológico.
- c. Desde un punto de vista de atención integral, conocer aquellos aspectos relacionados con la estructura, la organización familiar así como la tipología de familia y el momento de ciclo vital por el cual está atravesando el paciente nos facilitará estar alerta de posibles cambios que puedan darse durante el proceso de la enfermedad y sean determinantes para la aparición de dificultades en el cuidado del paciente.
- d. La primera y la tercera respuesta son correctas. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La primera y la tercera respuesta son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es patología auditiva más frecuente inducida por la radioterapia?

Seleccione una:

- a. Otitis externa.
- b. Otitis media. ✓ La respuesta es correcta.
- c. Hipoacusia neurosensorial.
- d. Acufeno.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Otitis media.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

1. Respecto a la inmunoterapia en general, seleccione la respuesta **correcta**:

Seleccione una:

- a. El sistema inmune innato está mediado principalmente por los linfocitos T y B, y el adaptativo, principalmente, por los neutrófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas (DC), células Natural-Killer (NK), mastocitos, células T y diversos componentes humorales.
- b. La interacción entre las células malignas y los diversos componentes de la respuesta inmune siempre inhibe el crecimiento tumoral.
- c. La inhibición de los puntos de control inmune mediante anticuerpos monoclonales es la estrategia inmunoterápica más utilizada actualmente. ✓
- d. La respuesta inmune endógena de los CECC no tiene un significado pronóstico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La inhibición de los puntos de control inmune mediante anticuerpos monoclonales es la estrategia inmunoterápica más utilizada actualmente.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- 1. El rash acneiforme es un evento precoz y frecuente observado durante el tratamiento con Cetuximab.
- 2. Las fisuras se localizan en áreas de hiperqueratosis.
- 3. La administración tópica de eflortinina puede reducir la hipertricosis.
- 4. Los antihistamínicos están contraindicados en el manejo de prurito secundario a Cetuximab. ✓ La respuesta es correcta. Esta afirmación es incorrecta. Los antihistamínicos no están contraindicados en el manejo de prurito secundario a Cetuximab.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los antihistamínicos están contraindicados en el manejo de prurito secundario a Cetuximab.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes fármacos **NO** está aprobado en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello?

Seleccione una:

- a. Cisplatino
- b. Cetuximab
- c. Nivolumab
- d. Bevacizumab ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Bevacizumab

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: la técnica de acompañar o acompañamiento nos facilita validar o normalizar las emociones del paciente.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓ La respuesta es correcta. Adaptarnos al ritmo del paciente durante la entrevista (tono y ritmo de voz). Abordar los temas que preocupan al paciente, es decir, centrarnos en la agenda del paciente y no en lo que cree el profesional que es importante o preocupante para el paciente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de desarrollar toxicidad pulmonar de la inmunoterapia? Señale la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Neoplasia de pulmón
- b. Patología pulmonar previa
- c. Combinación de inhibidores de puntos de control inmune
- d. Sobreexpresión de PDL1 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sobreexpresión de PDL1

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, los pilares fundamentales son....

Seleccione una:

- a. La prevención y la anticipación
- b. La detección y el tratamiento
- c. La monitorización
- d. Todos los anteriores son ciertos ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todos los anteriores son ciertos

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Quando hablamos de una hiposialia extrema o grado III, entendemos que el flujo salival en 3 minutos es:

Seleccione una:

- a. < 0,30. ✓ La respuesta es correcta.
- b. < 0,60.
- c. < 0,80.
- d. Ninguno de los anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: < 0,30.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estas actividades es necesaria para disminuir el riesgo de tapón mucoso?

Seleccione una:

- a. Hidratación del paciente y humidificación del medio ambiente.
- b. Fisioterapia respiratoria y tratamiento con aerosolterapia.
- c. Minimizar al máximo las aspiraciones.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Ante un paciente de 75 años que recibió radioterapia cervical hace 15 años, en el que se palpa un nódulo de tiroides a la exploración física, **es cierto que:**

Seleccione una:

- a. Lo más probable es que se trate de un nódulo benigno. ✓ La respuesta es correcta. Pese a que el antecedente de radioterapia cervical sea un factor de riesgo a tener en cuenta para segundas neoplasias tiroideas, la enfermedad nodular tiroidea benigna sigue siendo la afectación más habitual dada su alta prevalencia. Además la radioterapia fue dada en la etapa adulta por lo que su efecto como factor de riesgo es menor que si hubiera sido dada durante la infancia o adolescencia.
- b. Dado el alto riesgo de cáncer de tiroides está indicada la tiroidectomía total.
- c. La prueba de imagen más útil es un TAC cervical.
- d. No es necesario determinar hormonas tiroideas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lo más probable es que se trate de un nódulo benigno.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La toxicidad cutánea a la inmunoterapia. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Es la toxicidad inmunomediada más frecuente
- b. Generalmente se manifiesta en forma de rash y prurito
- c. El grado de severidad de la misma va a depender más del tipo de lesión que del área de superficie corporal que comprometa ✓
- d. Un punto fundamental en la prevención y el tratamiento es la educación sanitaria

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El grado de severidad de la misma va a depender más del tipo de lesión que del área de superficie corporal que comprometa

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué grado clasificarías la mucositis provocada por quimioterapia que impide la alimentación oral?

Seleccione una:

- a. Grado I.
- b. Grado II.
- c. Grado III.
- d. Grado IV. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Grado IV.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos **NO** es un punto de control inmune de los linfocitos T?

Seleccione una:

- a. Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) ✓
- b. Antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4)
- c. Receptor de muerte programada tipo 1 (PD-1)
- d. Gen 3 de activación de linfocitos (LAG - 3)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ligando 1 de muerte programada (PD-L1)

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Referente al estudio Checkmate 141. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Incluye una población de pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello con progresión a platino en menos de 6 meses.
- b. Los randomizó 2:1, nivolumab 3mg/kg bisemanal versus tratamiento a criterio de investigador (incluyendo: metotrexate, docetaxel, cetuximab) hasta progresión o toxicidad no aceptable.
- c. El brazo control consiguió un beneficio claro en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global ✓
- d. El brazo de nivolumab presentó un mejor perfil de seguridad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El brazo control consiguió un beneficio claro en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos **NO** es un mecanismo de evasión inmune de las células tumorales?

Seleccione una:

- a. La regulación de la maquinaria intracelular de presentación de antígenos tumorales.
- b. El aumento del reconocimiento antigénico por parte del sistema inmune. ✓
- c. La promoción de la inmunosupresión a nivel del microambiente tumoral de los CECC, mediante el reclutamiento de inmunosupresores (iTreg y MDSCs) y la producción de citoquinas inmunosupresoras y enzimas (factor de crecimiento endotelial y la dioxigenasa indolamina 2,3).
- d. La expresión de inhibidores del punto de control del sistema inmune a nivel tumoral y del microambiente tumoral.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El aumento del reconocimiento antigénico por parte del sistema inmune.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿A partir de qué distancia interincisal se considera que la apertura oral está limitada?

Seleccione una:

- a. <30 mm.
- b. <35 mm. ✓ La respuesta es correcta.
- c. <40 mm.
- d. <45 mm.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: <35 mm.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Palimerfina es un tratamiento con evidencia IA recomendado:

Seleccione una:

- a. Para los pacientes con quimioterapia de cabeza y cuello.
- b. Para los pacientes con radioterapia sola a dosis moderadas.
- c. Para los pacientes que solo reciben 5 Fu como quimioterapia adyuvante a radioterapia.
- d. En la quimioterapia de acondicionamiento para trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes hematológicos. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En la quimioterapia de acondicionamiento para trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes hematológicos.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo participa el músculo trapecio en el movimiento del hombro?

Seleccione una:

- a. Rotación externa.
- b. Rotación interna.
- c. Basculación de la escápula a la flexo-abducción del hombro y elevación del hombro. ✓ La respuesta es correcta.
- d. Todas las respuestas son ciertas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Basculación de la escápula a la flexo-abducción del hombro y elevación del hombro.

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a la osteonecrosis maxilar es cierto que:

Seleccione una:

- a. Se presenta exclusivamente en pacientes que han recibido radioterapia como parte de su tratamiento oncológico.
- b. Se presenta siempre como una exposición ósea intraoral, dolor importante y supuración.
- c. Es una de las complicaciones más severas de la radioterapia y puede aparecer hasta 10 años después de haber concluido el tratamiento. ✓
La respuesta es correcta.
- d. Asociada a medicamentos es exclusiva de mujeres en tratamiento para el cáncer de mama.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es una de las complicaciones más severas de la radioterapia y puede aparecer hasta 10 años después de haber concluido el tratamiento.

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la neurotoxicidad periférica por platinos:

Seleccione una:

- a. La dosis total acumulada, la intensidad de dosis y los esquemas que combinan diferentes agentes neurotóxicos se consideran factores de riesgo asociados al desarrollo de neuropatía crónica por platinos.
- b. La edad es el principal factor de riesgo de la neuropatía por platinos. ✓
La respuesta es correcta. La edad no es el principal factor de riesgo de la neuropatía por platinos.
- c. La neurotoxicidad aguda es característica del oxaliplatino.
- d. La neurotoxicidad asociada a los platinos se debe principalmente en su acúmulo en el soma de la neurona sensitiva en el ganglio raquídeo posterior.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: La edad es el principal factor de riesgo de la neuropatía por platinos., La neurotoxicidad asociada a los platinos se debe principalmente en su acúmulo en el soma de la neurona sensitiva en el ganglio raquídeo posterior.

Pregunta **34**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la afirmación que consideras **incorrecta**:

Seleccione una:

- a. La condronecrosis laríngea es una complicación grave que puede requerir una cirugía radical.
- b. Las lesiones de toxicidad aguda laríngeas no suelen responder a los esteroides. ✓ La respuesta es correcta. Las lesiones de toxicidad aguda laríngeas sí suelen responder a los esteroides.
- c. La condronecrosis suele precisar tratamiento con antibióticos.
- d. La radiomucosistis aguda puede cursar con disfagia, disfonía y disnea.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las lesiones de toxicidad aguda laríngeas no suelen responder a los esteroides.

Pregunta **35**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuanto a otras toxicidades menos frecuentes. Señale la respuesta **correcta**

Seleccione una:

- a. Las toxicidades oculares inmunomediadas más frecuentes son la episcleritis, la conjuntivitis y la uveítis ✓
- b. Las transfusiones de hemoderivados están contraindicadas en las citopenias inmunomediadas
- c. Los síntomas de presentación son bastante específicos, por lo que su identificación es sencilla
- d. Los pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello tratados con nivolumab presentan un mayor porcentaje de efectos secundarios reumatológicos que los pacientes con otro tipo de tumor

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las toxicidades oculares inmunomediadas más frecuentes son la episcleritis, la conjuntivitis y la uveítis

Pregunta **36**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estas medidas tomaría ante la sospecha de una toxicidad neurológica inmunomediada?

Señale la **respuesta correcta**

Seleccione una:

- a. Valoración por el neurólogo
- b. RNM cerebral
- c. Punción lumbar
- d. Todas las anteriores son correctas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **37**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes actuaciones no evita la broncoaspiración?

Seleccione una:

- a. Colocar en posición fowler al paciente durante su ingesta con nutrición enteral por sonda nasogástrica.
- b. Si el paciente tiene cánula, no es necesario realizar ninguna actividad de seguridad. ✓ La respuesta es correcta.
- c. Comprobar el correcto emplazamiento de la sonda nasogástrica antes de la ingesta.
- d. Asegurar que el balón de la cánula está correctamente hinchado durante la ingesta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si el paciente tiene cánula, no es necesario realizar ninguna actividad de seguridad.

Pregunta **38**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Paciente con 67 años con antecedente carcinoma de cavidad oral hace 4 años, tratado con cirugía y radioterapia, que acude a control habitual en consultas externas. Refiere odontalgia esporádica que mejora con tratamiento analgésico pero que desde hace una semana se asocia a mal sabor de boca. ¿Qué deberíamos hacer primero en este caso?

Seleccione una:

- a. Asegurarnos de que el paciente no tenga el diente cariado. Para ello se derivará al paciente de forma preferente a su odontólogo de zona.
- b. Descartar recidiva de su neoplasia, por lo que se pide biopsia urgente.
- c. Realizar una exploración minuciosa en búsqueda de datos compatibles con osteonecrosis. ✓ La respuesta es correcta.
- d. Esta sintomatología es normal en pacientes que han recibido radioterapia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Realizar una exploración minuciosa en búsqueda de datos compatibles con osteonecrosis.

Pregunta **39**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el motivo principal por el que se deriva un paciente al Servicio de Rehabilitación?

Seleccione una:

- a. Limitación funcional del hombro.
- b. Limitación del movimiento cervical.
- c. Edema facial.
- d. Todas las respuestas son ciertas. ✓ La respuesta es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son ciertas.

Pregunta **40**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos es un factor de riesgo de infección añadido en pacientes afectados de cáncer de cabeza y cuello?

Seleccione una:

- a. Malnutrición.
- b. Neutropenia.
- c. Daño de la barrera mucosa de la cavidad oral.
- d. Todas son ciertas. ✔ La respuesta es correcta. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, a menudo tienen alteraciones de las barreras físicas, dispositivos implantados, y se consideran relativamente inmunocomprometidos (debido a la malnutrición, los déficits en la inmunidad celular y humoral y la deficiente fagocitosis) o claramente inmunodeficientes, en casos de neutropenia establecida. Tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden prolongar la malnutrición, la mielosupresión y el daño de la barrera mucosa. La de la cavidad oral y del tracto digestivo sirve como importante barrera mecánica y su afectación juega un papel central en la fisiopatología de la infección sistémica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

◀ Últimas noticias
sobre la
Inmunoterapia;
manejo de la toxicidad

Ir a...



Encuesta de
satisfacción del curso



