

# ACCESOS VASCULARES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

[Página Principal](#) / [AV.Q009](#) / Evaluación Agosto / [Curso: Accesos vasc...](#)

Comenzado el	lunes, 16 de agosto de 2021, 10:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 16 de agosto de 2021, 10:35
Tiempo empleado	10 minutos 20 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (97%)
Comentario -	Apto

**PREGUNTA 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se considera una máxima en la canalización de catéter venoso periférico (CVP), señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre canalizar el CVP de mayor calibre posible.
- ☐ b. Siempre canalizar el CVP de menor calibre posible.
- ☐ c. Siempre canalizar una vía central.
- ☒ d. Utilizar el menor acceso venoso para la terapia intravenosa que precise el paciente. ✓

La respuesta correcta es: Utilizar el menor acceso venoso para la terapia intravenosa que precise el paciente.

**PREGUNTA 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las situaciones siguientes favorecen la infección de los reservorios subcutáneos?

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración de las defensas de los pacientes.
- ☐ b. Técnica poco aséptica.
- ☐ c. Infusión de nutrición parenteral.
- ☒ d. Todos los anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

**PREGUNTA 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los síntomas de una trombosis de catéter?

Seleccione una:

- ☐ a. Dificultad para infundir líquidos.
- ☐ b. Dificultad para extraer sangre.
- ☒ c. A y B son correctas. ✓
- ☐ d. A y B son falsas.

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

**PREGUNTA 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se diferencian los catéteres tunelizados de los reservorios subcutáneos?

Seleccione una:

- ☐ a. Los tunelizados tienen un acceso central, pero inserción periférica y los subcutáneos son centrales.
- ☒ b. Los tunelizados tienen recorrido subcutáneo y los subcutáneos tienen un reservorio en tejido subcutáneo. ✓
- ☐ c. Los tunelizados son siempre de una luz y los subcutáneos tienen siempre dos luces.
- ☐ d. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Los tunelizados tienen recorrido subcutáneo y los subcutáneos tienen un reservorio en tejido subcutáneo.

**PREGUNTA 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se puede retirar el punto de sujeción del catéter tunelizado?

Seleccione una:

- ☐ a. A los 21 días tras la inserción.
- ☐ b. Cuando el paciente esté sin inmunosupresión.
- ☒ c. Cuando el dacrón esté formado y fije el catéter. ✓
- ☐ d. No se retira en ningún caso.

La respuesta correcta es: Cuando el dacrón esté formado y fije el catéter.

**PREGUNTA 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué luz del catéter tunelizado tipo Hickman® usaremos preferentemente para extracción sanguínea?

Seleccione una:

- ☐ a. La luz blanca.
- ☒ b. La luz roja. ✓
- ☐ c. Cualquiera de las anteriores.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores, canalizaremos un CVP.

La respuesta correcta es: La luz roja.

**PREGUNTA 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En cuál de las siguientes ocasiones está indicado insertar un catéter tunelizado en los pacientes oncológicos?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando esté previsto trasplante de médula ósea.
- ☐ b. Para administración de quimioterapia.
- ☐ c. Cuando son precisas múltiples extracciones sanguíneas.
- ☒ d. En todas las situaciones anteriores. ✓

La respuesta correcta es: En todas las situaciones anteriores.

**PREGUNTA 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la infusión de medicación en bolos en los catéteres centrales son necesarias jeringas de 10cc siempre. ¿Cuál es la razón?

Seleccione una:

- ☐ a. Para que llegue hasta el torrente sanguíneo.
- ☒ b. Para evitar sobrepresión. ✓
- ☐ c. Se puede usar cualquier jeringa.
- ☐ d. Con estos catéteres no se puede poner medicación en bolo.

La respuesta correcta es: Para evitar sobrepresión.

**PREGUNTA 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes son cuidados que debemos enseñar a los pacientes que porten catéter tunelizado?

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar tirones.
- ☐ b. Mientras esté canalizado, no se pueden duchar.
- ☐ c. Lavar una vez al día con agua y jabón y secar al aire.
- ☒ d. Las respuestas A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

**PREGUNTA 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se debe hacer si nos percatamos de que el dacrón se ha salido de la piel?

Seleccione una:

- ☐ a. Lo reintroduciremos porque debe sujetarse siempre con este dispositivo.
- ☒ b. Lo fijaremos a la piel con punto de sutura o steri-strip. ✓
- ☐ c. Retiraremos el catéter.
- ☐ d. El dacrón no se sale nunca.

La respuesta correcta es: Lo fijaremos a la piel con punto de sutura o steri-strip.

**PREGUNTA 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes vías pueden ser canalizar por las enfermeras?

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter venoso periférico.
- ☐ b. Catéter tunelizado.
- ☐ c. Catéter venoso central de inserción periférica.
- ☒ d. A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas.

**PREGUNTA 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes se considera acceso central?

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter venoso central de acceso periférico (PICC).
- ☐ b. Catéter de Hickmann.
- ☐ c. Reservorio subcutáneo totalmente implantable.
- ☒ d. Todos los anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

**PREGUNTA 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO son zonas habituales de inserción para el PICC?

Seleccione una:

- ☒ a. Vena subclavia. ✓
- ☐ b. Vena cefálica.
- ☐ c. Vena basílica.
- ☐ d. Vena antecubital.

La respuesta correcta es: Vena subclavia.

**PREGUNTA 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de elección para pacientes oncológicos en estado terminal?

Seleccione una:

- ☒ a. Vía subcutánea. ✓
- ☐ b. Vía intravenosa periférica.
- ☐ c. Catéter tunelizado.
- ☐ d. Reservorio subcutáneo.

La respuesta correcta es: Vía subcutánea.

**PREGUNTA 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes son indicaciones de inserción de catéter subcutáneo en paciente terminal?

Seleccione una:

- ☐ a. Disfagia.
- ☐ b. Control del dolor sin acceso venoso.
- ☐ c. Manejo sintomático domiciliario.
- ☒ d. Todas las anteriores son indicaciones. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son indicaciones.



**PREGUNTA 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿De cuál de las siguientes maneras se puede administrar medicación por vía subcutánea?

Seleccione una:

- ☐ a. En bolos.
- ☐ b. En perfusión continua.
- ☐ c. A y B son falsas.
- ☒ d. A y B son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: A y B son verdaderas.

**PREGUNTA 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dispositivo usamos para el control de síntomas en domicilio?

Seleccione una:

- ☐ a. Bomba de jeringa.
- ☐ b. Bomba volumétrica.
- ☒ c. Elastómero. ✓
- ☐ d. En domicilio no se pueden usar dispositivos.

La respuesta correcta es: Elastómero.

**PREGUNTA 18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿A partir de qué valor en la escala de Maddox debemos retirar un catéter?

Seleccione una:

- ☐ a. A partir del 4, estado avanzado de flebitis.
- ☐ b. A partir del 2, inicio de flebitis.
- ☒ c. A partir del 1, posible inicio de flebitis. ✖
- ☐ d. Siempre a las 72 horas de canalización.

La respuesta correcta es: A partir del 2, inicio de flebitis.

**PREGUNTA 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el mejor antiséptico para canalizar un CVP?

Seleccione una:

- ☐ a. Povidona yodada.
- ☒ b. Clorhexidina. ✔
- ☐ c. Alcohol del 70°.
- ☐ d. Peróxido de hidrógeno.

La respuesta correcta es: Clorhexidina.

**PREGUNTA 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de catéter es el de elección cuando vamos a tener un tratamiento de más de 6 días de duración y con una osmoralidad de más de 500 mOsm/l?

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter venoso periférico.
- ☐ b. Catéter venoso central de inserción periférica.
- ☐ c. Reservorio subcutáneo.
- ☒ d. B y C son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: B y C son ciertas.

**PREGUNTA 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se comenzó a utilizar el reservorio totalmente implantable, Port-a-Cath®?

Seleccione una:

- ☐ a. Se usa desde el siglo XVII.
- ☐ b. Desde principios del siglo XX.
- ☒ c. En 1982, y lo inventó Neiderhuber. ✓
- ☐ d. Es invento de Hickman en los años 70.

La respuesta correcta es: En 1982, y lo inventó Neiderhuber.

**PREGUNTA 22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En cuál de las partes del reservorio subcutáneo pincharemos la aguja para la infusión y la extracción?

Seleccione una:

- ☒ a. Membrana o septum. ✓
- ☐ b. Portal o cámara.
- ☐ c. Conexión.
- ☐ d. La aguja está previamente insertada.

La respuesta correcta es: Membrana o septum.

**PREGUNTA 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indican los colores de los catéteres venosos periférico?

Seleccione una:

- ☒ a. Cumplen una norma ISO de correspondencia entre calibre y color. ✓
- ☐ b. Sigue el criterio establecido por cada casa comercial.
- ☐ c. Depende únicamente de las modas actuales.
- ☐ d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Cumplen una norma ISO de correspondencia entre calibre y color.

**PREGUNTA 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el acceso para un reservorio subcutáneo más habitual?

Seleccione una:

- ☐ a. Abdominal.
- ☐ b. Femoral.
- ☒ c. Torácica. ✓
- ☐ d. Cualquiera de las anteriores son habituales.

La respuesta correcta es: Torácica.

**PREGUNTA 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un enfermo oncológico que va a recibir ciclo de quimioterapia por vía periférica, ¿qué recomendaciones seguiremos?

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar venas de los miembros inferiores, zonas de flebitis, hematomas o edemas previos.
- ☐ b. No utilizar una vía ya existente, ya que el riesgo de extravasación es mayor.
- ☐ c. Evitar usar venas principales.
- ☒ d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

**PREGUNTA 26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la complicación más importante que se puede dar en los pacientes oncológicos con terapia intravenosa?

Seleccione una:

- ☐ a. Flebitis.
- ☒ b. Extravasación de citostático. ✓
- ☐ c. Extravasación de analgesia.
- ☐ d. Pérdida accidental del catéter.

La respuesta correcta es: Extravasación de citostático.

**PREGUNTA 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se clasifican los citostáticos en función de su capacidad de irritación?

Seleccione una:

- ☐ a. Vesicantes y no irritantes.
- ☐ b. Irritantes y no vesicantes.
- ☐ c. Vesicantes.
- ☒ d. La respuesta B y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: La respuesta B y C son correctas.

**PREGUNTA 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué acción no debemos realizar NUNCA en caso de extravasación de citostático?

Seleccione una:

- ☒ a. Continuar la infusión hasta que termine, la importancia del tratamiento es mayor que el riesgo de la extravasación. ✓
- ☐ b. Retirar el sistema, pero no el CVP.
- ☐ c. Extraer de 5 a 10 cc de líquido y pinchar las ampollas si las hubiera.
- ☐ d. Mantener el miembro elevado.

La respuesta correcta es: Continuar la infusión hasta que termine, la importancia del tratamiento es mayor que el riesgo de la extravasación.

**PREGUNTA 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes accesos centrales, ¿cuál se considera subcutáneo totalmente implantable?

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter Broviac®.
- ☐ b. Catéter Hickman®.
- ☒ c. Porth-a-Cath®. ✓
- ☐ d. Todos los anteriores.

La respuesta correcta es: Porth-a-Cath®.

PREGUNTA 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes recomendaciones son indispensables en el cuidado de los reservorios subcutáneos?

Seleccione una:

- ☐ a. Lavado de manos antes de cada manipulación.
- ☐ b. Desinfección de los tapones previo a cada manipulación.
- ☐ c. Cambio del apósito transparente cada 7 días y siempre que sea necesario.
- ☒ d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

◀ Documentación complementaria

Ir a...

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

MENÚ PRINCIPAL

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas