

A través de una vía intra ósea pueden administrarse

Seleccione una:

- a. B. Componentes sanguíneos
- b. A. Sueroterapia
- c. C. Está contraindicado el uso de esta vía para la administración de fibrinolíticos
- d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la adrenalina, señale la afirmación correcta

Seleccione una:

- a. C. Se administrará 1 mg (1 ampolla cada 3 - 5 min)
- b. A. Ante una PCR y en ritmos desfibrilables se administrará adrenalina tras la segunda o tercera desfibrilación
- c. A y C son correctas
- d. B. Se administrará vía endotraqueal como primera opción quedando relegado la vía intra ósea como última opción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los dispositivos supraglóticos, señale la afirmación correcta

Seleccione una:

- a. C. La ML Fastrach tiene incorporado un tubo de drenaje que permite el drenaje del contenido gástrico
- b. B. Con la ML Fastrach no se requiere la movilización de la cabeza
- c. A. Con la ML clásica se debe realizar la hiperextensión del cuello
- d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al decálogo de atención prehospitalaria, señale la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- a. Para distancias de 200km se utilizará el helicóptero sanitario como primera elección para el transporte.
- b. La fase de alerta es una etapa pasiva.
- c. La densidad del tráfico es un factor condicionante en la elección del medio de transporte
- d. Las ambulancias de clase C son las destinadas a proporcionar SVA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fase de alerta es una etapa pasiva.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es incorrecto con respecto a la utilización del dispositivo Airtraq

Seleccione una:

- a. Entre sus inconvenientes destaca que no permite la colocación de tubos endotraqueales de todos los tamaños
- b. Se trata de un dispositivo supraglótico utilizado en el manejo de la vía aérea difícil
- c. Todas son incorrectas
- d. Requiere la alineación de los ejes oral, faríngeo y laríngeo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para garantizar la continuidad asistencial del paciente es necesario una correcta transferencia entre profesionales. Un modelo estandarizado de transferencia es el

Seleccione una:

- a. OPUMA
- b. ISOBAR
- c. ALEC
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ISOBAR

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- a. Valores por encima de 25 mmHg predicen, en un alto porcentaje, la recuperación del pulso.
- b. La elevación súbita y sostenida del EtCO₂ es una alerta precoz de recuperación de la circulación espontánea.
- c. Todas son correctas
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La elevación súbita y sostenida del EtCO₂ es una alerta precoz de recuperación de la circulación espontánea.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- a. La asistolia es el ritmo más frecuente de la PCR en el adulto
- b. Ninguna es correcta
- c. La AESP se caracteriza por una actividad ventricular rápida y desorganizada
- d. La torsades de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La torsades de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- a. Hay evidencia clara de los beneficios del uso de la fibrinólisis como tratamiento del tromboembolismo pulmonar
- b. Ninguna de las anteriores es correcta
- c. La toracocentesis con la colocación de un tubo de drenaje pleural es el tratamiento definitivo al neumotórax a tensión.
- d. El ERC considera la administración de Naloxona IM o IN incluso por testigos

legos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El ERC considera la administración de Naloxona IM o IN incluso por testigos legos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta con respecto a la intubación endotraqueal

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Se fija como ideal realizar la intubación sin interrumpir las compresiones torácicas
- c. La intubación traqueal no debe demorar la desfibrilación
- d. Cada intento de intubación no debe superar los 30 sg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- a. El sulfato de magnesio se encuentra indicado ante torsades de pointes
- b. Se puede sustituir la amiodarona por vasopresina
- c. Se administrar án 300 mg de amiodarona si tras tres descargas persiste la FV/TVSP
- d. No se recomienda el uso de Atropina en asistolia o AESP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede sustituir la amiodarona por vasopresina

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se ñala la afirmaci ón incorrecta en relaci ón a la mascarilla lar íngea cl ásica

Seleccione una:

- a. B. El tama ño se selecciona con el peso del paciente
- b. A y C son incorrectas
- c. C. Ante la duda para la elecci ón de tama ño se seleccionar á aquel m ás peque ño
- d. A. Los n úmeros de ML correspondiente a adultos van del 4 al 6.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son incorrectas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera hiperpotasemia leve a cifras Potasio s érico

Seleccione una:

- a. 6.5-7mEq/l

- b. Ninguna de las anteriores es correcta
- c. Menor que 6,5 mEq/l
- d. 7-8 mEq/l

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menor que 6,5 mEq/l

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el test Mallampati, Samsoon y Young, ¿qué clase se le asigna cuando se puede visualizar el paladar blando y la base de la úvula?

Seleccione una:

- a. Clase III
- b. Clase II
- c. Clase IV
- d. Clase I

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clase III

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la clasificación de Cormack-Lehane, el grado IV corresponde a:

Seleccione una:

- a. Puede verse únicamente la epiglotis
- b. No se observa epiglotis ni glotis

- c. La glotis puede estar expuesta
- d. Se observa la glotis, incluyendo comisura anterior y posterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se observa epiglotis ni glotis

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se tienen dudas si FV fina o asistolia

Seleccione una:

- a. Se desfibrilar á
- b. Se analizar á nuevamente el ritmo, ya que es dif ícil no distinguir entre estas dos arritmias
- c. Se realizar á RCP CV 30:2
- d. Se realizar á una cardioversi ón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizar á RCP CV 30:2

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son causas potencialmente reversibles de la PCR todas las siguientes, except

Seleccione una:

- a. Hipovolemia
- b. Tromboembolismo pulmonar
- c. Hipertensi ón



d. Hipotermia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertensi ón