

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AS-DC-APAPC](#) / [Anexos y examen final](#) / [Exámen final](#)

Comenzado el jueves, 15 de marzo de 2018, 14:00

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 15 de marzo de 2018, 14:15

Tiempo empleado 15 minutos 2 segundos

Puntos 24,00/30,00

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El automatismo o cronotropismo hace referencia a

Seleccione una:

- ☐ a. Grado de fuerza que el corazón debe realizar en su contracción para vencer las resistencias vasculares
- ☐ b. Ninguna es correcta
- ☒ c. Propiedad de producir estímulos rítmicos ✓
- ☐ d. Capacidad de las células de transmitir un potencial de acción

La respuesta correcta es: Propiedad de producir estímulos rítmicos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El ILCOR fue creado en el año

Seleccione una:

- ☐ a. 1985
- ☐ b. 1986
- ☐ c. 1979
- ☒ d. Ninguna es correcta ✓

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los factores inotrópicos

Seleccione una:

- ☐ a. Se consideran positivos cuando disminuyen la contractilidad
- ☐ b. Hacen referencia a la capacidad de las células para transmitir un potencial de acción
- ☐ c. Se consideran negativos cuando aumentan la contractilidad
- ☒ d. Todas son incorrectas ✓

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al ILCOR, señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☒ b. La última y más reciente "Conferencia de Consenso" del ILCOR fue en el año 2015 ✓
- ☐ c. El ILCOR realiza reuniones cada 5 años dónde surgen las nuevas recomendaciones en RCP.

La respuesta correcta es: La última y más reciente "Conferencia de Consenso" del ILCOR fue en el año 2015

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna es correcta ✓
- ☐ b. En 1884 a Heiberg y en 1888 a Esmarch se les atribuyen el uso de la tracción mandibular para controlar la vía aérea
- ☐ c. En 1947 a P.Safar se les atribuyen el uso de la tracción mandibular para controlar la vía aérea
- ☐ d. En 1830 Howar, con el objetivo de desobstruir la vía aérea propone coger la punta de la lengua y desplazarla hacia la derecha.

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Ante un precipitado en un acantilado en el que para su atención, tras valorar la escena, se detecta riesgo evidente para la integridad física del socorrista

Seleccione una:

- ☐ a. Solicita ayuda a testigos e intervienen
- ☐ b. Utiliza métodos improvisados para el rescate de la víctima
- ☐ c. Interviene para salvar la vida del accidentado
- ☒ d. No interviene y llama al 112 ✓

La respuesta correcta es: No interviene y llama al 112

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Corresponde al tercer eslabón de la cadena de supervivencias en ahogamientos

Seleccione una:

- ☐ a. Sacar a la víctima del agua
- ☐ b. Proporcionar asistencia sanitaria a la víctima
- ☐ c. Prevenir el ahogamiento
- ☒ d. Proporcionar flotación ✓

La respuesta correcta es: Proporcionar flotación

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

De los enunciados que se exponen a continuación señala la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Un porcentaje alto de las PCR extrahospitalarias se asocian a asistolia
- ☐ b. El tratamiento de estas arritmias es la cardioversión
- ☒ c. Todas son incorrectas ✓
- ☐ d. La asistolia no tratada con desfibrilación evoluciona a FV o TVSP

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación al aumento de la supervivencia, señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor probabilidad de supervivencia si intervención del primer interviniente en los 3 primeros eslabones de la cadena de supervivencia
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Mayor probabilidad de supervivencia si inicio de RCPa dentro de los primeros 8 min tras la PCR
- ☐ d. Se ha demostrado que el inicio temprano de la RCPb y la desfibrilación antes de los primeros 4 min tras la PCR aumenta la supervivencia.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre las funciones del operador telefónico ante un aviso de PCR se encuentra

Seleccione una:

- ☒ a. A y B son correctas ✓
- ☐ b. C. Enviar únicamente la ayuda solicitada
- ☐ c. A. Indicar los pasos para realizar RCP con compresiones torácicas a testigos no formados
- ☐ d. B. Contribuir a la localización rápida de un DESA en las proximidades del suceso

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Con respecto a las ventilaciones en RCPb, señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Para la administración de ventilaciones se deberá mantener la vía aérea abierta y pinzar la nariz
- ☐ b. En los primeros minutos tras la PCR la Hb está saturada adecuadamente con O₂.
- ☐ c. Se debe permitir la exhalación del aire entre respiraciones
- ☒ d. La administración de las ventilaciones/insuflaciones no deberá interrumpir las compresiones torácicas más de 20 segundos. ✓

La respuesta correcta es: La administración de las ventilaciones/insuflaciones no deberá interrumpir las compresiones torácicas más de 20 segundos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación a la respiración agónica, señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. Al detectar respiración agónica se colocará a la víctima en PLS ✓
- ☐ b. La identificación de respiración agónica al comprobar respiración del paciente es sinónimo a decir que el paciente no respira
- ☐ c. La presencia de respiración agónica durante la RCP no supone RCE
- ☐ d. Ante duda se tratará como si no respirará

La respuesta correcta es: Al detectar respiración agónica se colocará a la víctima en PLS

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación al masaje cardiaco externo (MCE), señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Profundidad de al menos 5cm pero no más de 6cm ✓
- ☐ b. Frecuencia de 100 comp/min con un máximo de 160 comp/min
- ☐ c. Profundidad de al menos 4cm pero no más de 5cm
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Profundidad de al menos 5cm pero no más de 6cm

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La PLS se utilizará en

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes inconscientes que no respiran
- ☐ b. Pacientes en PCR
- ☐ c. Pacientes conscientes
- ☒ d. Pacientes inconscientes con respiración mantenida ✓

La respuesta correcta es: Pacientes inconscientes con respiración mantenida

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

La regla nemotécnica para valorar la consciencia de un accidentado se conoce como

Seleccione una:

- ☐ a. VOS
- ☒ b. OPUMA ✗
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. AVDN

La respuesta correcta es: AVDN

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Ante una víctima de PCR, de los dispositivos que se exponen a continuación cuál se utilizará

Seleccione una:

- ☒ a. B y C son correctas ✓
- ☐ b. A. Mascarilla ventimask
- ☐ c. B. Balón autoinflable - v. álvula- bolsa de reservorio (B-M-V)
- ☐ d. C. Cánula de Guedel

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El dispositivo B-V-M puede utilizarse

Seleccione una:

- ☐ a. A. Sin conectar a fuente de oxígeno
- ☐ b. B. Es imprescindible para su funcionamiento que sea conectada a fuente de oxígeno
- ☒ c. A y C son correctas ✓
- ☐ d. C. Conectada a bolsa de reservorio y a una fuente de oxígeno para alcanzar concentraciones de O₂ superiores

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El uso de la cánula orofaríngea está indicado en todas las siguientes situaciones, excepto

Seleccione una:

- ☐ a. Paciente inconsciente que respira de manera espontánea
- ☒ b. Ante un paciente inconsciente con reflejo nauseoso conservado ✓
- ☐ c. Ante un paciente con crisis convulsiva
- ☐ d. Durante la aspiración de secreciones faríngeas al paciente inconsciente

La respuesta correcta es: Ante un paciente inconsciente con reflejo nauseoso conservado

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación a las cánulas orofaríngeas, se indica la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Facilita la ventilación con el uso del dispositivo B-V-M
- ☐ b. Permeabilizan la vía aérea pero no la glotis
- ☐ c. Facilitan la aspiración de secreciones en faringe
- ☒ d. Permiten abandonar la tracción mandibular y la extensión ✓

La respuesta correcta es: Permiten abandonar la tracción mandibular y la extensión

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación al dispositivo B-V-M señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. Alcanzan niveles de FiO₂ entre 26 - 50 por ciento ✓
- ☐ b. Debe proporcionar un sellado hermético
- ☐ c. El volumen de la bolsa en adultos es de 1500cc
- ☐ d. En adultos la forma de la mascarilla es triangular

La respuesta correcta es: Alcanzan niveles de FiO₂ entre 26 - 50 por ciento

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación a la adrenalina, se indica la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☒ a. A y C son correctas ✓
- ☐ b. A. Ante una PCR y en ritmos desfibrilables se administra adrenalina tras la segunda o tercera desfibrilación
- ☐ c. B. Se administra vía endotraqueal como primera opcional quedando relegada la vía intraósea como última opción
- ☐ d. C. Se administrar 1 mg (1 ampolla cada 3 - 5 min)

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación al protocolo de atención prehospitalaria, se indica la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Para distancias de 200km se utilizará el helicóptero sanitario como primera elección para el transporte.
- ☐ b. La densidad del tráfico es un factor condicionante en la elección del medio de transporte
- ☒ c. La fase de alerta es una etapa pasiva. ✓
- ☐ d. Las ambulancias de clase C son las destinadas a proporcionar SVA.

La respuesta correcta es: La fase de alerta es una etapa pasiva.

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Para garantizar la continuidad asistencial del paciente es necesario una correcta transferencia entre profesionales. Un modelo estandarizado de transferencia es el

Seleccione una:

- ☐ a. ISOBAR
- ☒ b. Ninguna es correcta ✖
- ☐ c. ALEC
- ☐ d. OPUMA

La respuesta correcta es: ISOBAR

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. La AESP se caracteriza por una actividad ventricular r ápida y desorganizada
- ☐ b. La torsades de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular
- ☒ c. Ninguna es correcta ✖
- ☐ d. La asistolia es el ritmo m ás frecuente de la PCR en el adulto

La respuesta correcta es: La torsades de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Se ñala la afirmaci ón correcta con respecto a la intubaci ón endotraquea

Seleccione una:

- ☐ a. Se fija como ideal realizar la intubaci ón sin interrumpir las compresiones tor ácidas
- ☒ b. Todas son correctas ✔
- ☐ c. La intubaci ón traqueal no debe demorar la desfibrilaci ón
- ☐ d. Cada intento de intubaci ón no debe superar los 30 sg.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En relaci ón a las convulsiones tras la RCE, es cierto que

Seleccione una:

- ☐ a. No se aconseja el uso de anticonvulsionantes como tratamiento tras la PCR
- ☒ b. Ninguna es correcta ✔
- ☐ c. Las convulsiones t ónicas son frecuentes tras la PCR.
- ☐ d. No se ha demostrado relaci ón entre las convulsiones y el aumento de lesi ón cerebral que ha producido la PCR.

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Entre las actividades a realizaci ón en relaci ón a la circulaci ón tras la RCE, se ñala la afirmaci ón incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Se propone como objetivo mantener una TAM que permita una diuresis de menor que 3ml/kg/h.
- ☐ b. Considerar la inserci ón de un desfibrilador autom ático implantable (DAI) en pacientes isqu émicos con disfunci ón ventricular izquierda significativa.
- ☐ c. Considerar instauraci ón de acceso venoso central
- ☒ d. Se debe realizar control estricto de los niveles de lactato plasm ático. ✖

La respuesta correcta es: Se propone como objetivo mantener una TAM que permita una diuresis de menor que 3ml/kg/h.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Es un objetivo de los cuidados postresucitaci ón

Seleccione una:

- ☐ a. Alcanzar valores de saturaci ón de ox ígeno arterial de 94-98 por ciento
- ☒ b. Todas son correctas ✔
- ☐ c. Mantener una temperatura estable de 32-34grados C durante 24h para posterior recalentamiento
- ☐ d. Mantener glucemias inferiores a 180mg/dl

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Respecto al control de la temperatura, se ñala la afirmaci3n incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. El recalentamiento se realizar á con aumentos de 0,2 a 0,5 grados C por hora hasta restablecer los 37 grados C. ✖
- ☐ b. La hipotermia terap éutica parece mejorar la supervivencia y los resultados neurol3gicos despu és de la parada cardiaca.
- ☐ c. Es frecuente un periodo de hiperpirexia tras la RCE.
- ☐ d. Se recomienda mantener una temperatura estable de 30-32 grados C durante 24h.

La respuesta correcta es: Se recomienda mantener una temperatura estable de 30-32 grados C durante 24h.

Pregunta 30

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Son factores de mal pron3stico, todos los siguientes except

Seleccione una:

- ☐ a. Hipocapnia
- ☐ b. Duraci3n prolongada de la PCR
- ☐ c. Hipoglucemia
- ☒ d. Hiperglucemia ✖

La respuesta correcta es: Hipoglucemia