

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El s índrome postparada card íaca tras la recuperaci ón de la circulaci ón espont ánea

Seleccione una:

- ☐ a. Disfunci ón card íaca
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Alteraci ón de otros órganos
- ☐ d. Lesi ón cerebral

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relaci ón a las convulsiones tras la RCE, es cierto que

Seleccione una:

- ☐ a. No se aconseja el uso de anticonvulsionantes como tratamiento tras la PCR
- ☒ b. Ninguna es correcta
- ☐ c. Las convulsiones t ónicas son frecuentes tras la PCR.
- ☐ d. No se ha demostrado relaci ón entre las convulsiones y el aumento de lesi ón cerebral que ha producido la PCR.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al control de la ventilación, se ñala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Se monitorizar á SPO2 y eTCO2.
- ☒ b. Se considera la hipocapnia como elemento protector de la lesión cerebral
- ☐ c. Se ajustarán los par ámetros de ventilación para alcanzar valores de saturación de oxígeno arterial de 94-98 por ciento.
- ☐ d. Se aconseja utilizar la capnografía con forma de onda

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se considera la hipocapnia como elemento protector de la lesión cerebral

Pregunta **4**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las actividades a realización en relación a la circulación tras la RCE, se ñala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Considerar instauración de acceso venoso central
- ☐ b. Se debe realizar control estricto de los niveles de lactato plasm ático.
- ☒ c. Se propone como objetivo mantener una TAM que permita una diuresis de menor que 3ml/kg/h.
- ☐ d. Considerar la inserción de un desfibrilador autom ático implantable (DAI) en pacientes isqu émicos con disfunción ventricular izquierda significativa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se propone como objetivo mantener una TAM que permita una diuresis de menor que 3ml/kg/h.

Pregunta **5**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es cierto que

Seleccione una:

- ☐ a. A. Mediante TAC cerebral y torácica puede identificarse causa neurológica o respiratoria respectivamente.
- ☒ b. A y B son correctas
- ☐ c. C. Si el ECG presenta alteraciones de ischemia miocárdica, se realizará como primera opción una TAC.
- ☐ d. B. La ecocardiografía se realizará a todos los pacientes con RCE tras una PCR.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **6**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un objetivo de los cuidados postresucitación

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener una temperatura estable de 32-34grados C durante 24h para posterior recalentamiento
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Mantener glucemias inferiores a 180mg/dl
- ☐ d. Alcanzar valores de saturación de oxígeno arterial de 94-98 por ciento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **7**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ley 41/2002 se relaciona con el principio de Belmont

Seleccione una:

- ☐ a. Principio de no maleficiencia
- ☐ b. Principio de Beneficiencia
- ☐ c. Principio de justicia
- ☒ d. Principio de Autonomía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Principio de Autonomía

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al control de la temperatura, señale la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. El recalentamiento se realizará con aumentos de 0,2 a 0,5 grados C por hora hasta restablecer los 37 grados C.
- ☐ b. La hipotermia terapéutica parece mejorar la supervivencia y los resultados neurológicos después de la parada cardíaca.
- ☒ c. Se recomienda mantener una temperatura estable de 30-32 grados C durante 24h.
- ☐ d. Es frecuente un periodo de hiperpirexia tras la RCE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda mantener una temperatura estable de 30-32 grados C durante 24h.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. En ausencia de órdenes de No Intentar la Resucitación poco claras se iniciar a RCP inmediatamente.
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. La decisión de no reanimar a las PCR en incidentes con múltiples víctimas correspondería al principio de justicia.
- ☐ d. Ante signos evidentes de muerte (livideces, rigor mortis) se consideraría la no reanimación del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son factores de mal pronóstico, todos los siguientes excepto

Seleccione una:

- ☒ a. Hipoglucemia
- ☐ b. Hipocapnia
- ☐ c. Hiperglucemia
- ☐ d. Duración prolongada de la PCR

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipoglucemia

Pregunta **11**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son objetivos de los cuidados postresucitación conseguir

Seleccione una:

- ☐ a. ETCO<sub>2</sub> 40-45mmHg
- ☒ b. PaCO<sub>2</sub> 40-45mmHg
- ☐ c. FC 40-60 lpm
- ☐ d. Glucemia 180-200 mg/dl

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PaCO<sub>2</sub> 40-45mmHg