

Enfermería y salud mental

Módulo 2 (100% correctas)

1) Los resultados que existen hasta el momento de los estudios de genoma completo en esquizofrenia indican que:

- a) La variabilidad común analizada explica la totalidad de las bases genéticas de la esquizofrenia.
- b) Las variantes comunes están asociadas a un mayor incremento del riesgo que las variantes raras.
- c) Existen numerosas variantes genéticas que se asocian únicamente a esquizofrenia.
- d) Los principales mecanismos biológicos asociados a la esquizofrenia implican la regulación de la función hepática.
- e) Todas son falsas.

2) Los estudios que analizan la sintomatología psiquiátrica derivada del abuso sexual infantil son menos numerosos, pero algunos de ellos muestran conclusiones muy significativas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones al respecto es correcta?

- a) Kilcommons et al. destacan la presencia de alucinaciones y delirios.
- b) Wondie et al. observan la presencia de pensamientos intrusivos mediante la escala CITES-R (Children's Impact of Traumatic Events Scale-Revised).
- c) Newcomb et al. señalan la presencia de pensamientos intrusivos mediante la escala TSI (Trauma Symptom Inventory).
- d) La sintomatología psicótica es más prevalente en mujeres que en hombres.
- e) Todas son correctas.

3) En relación con el análisis del trastorno bipolar, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?

- a) La existencia del trastorno bipolar como consecuencia a largo plazo podría deberse al tiempo que ha de transcurrir hasta su diagnóstico definitivo.
- b) Este mismo proceso diagnóstico es lo que quizás muestre una prevalencia menor de la que realmente existe, ya que la depresión, o depresión unipolar,

podría ser realmente trastorno bipolar y haber sido diagnosticada erróneamente.

- c) La genética o el consumo de sustancias no se puede establecer como factor determinante para su aparición.
- d) Se deberían valorar otros factores como desencadenantes del trastorno no contemplados en los estudios y que podrían dar explicación a los resultados hallados.
- e) El trastorno bipolar es una de las consecuencias psicológicas menos estudiadas del abuso sexual infantil, encontrándose únicamente dos trabajos idóneos para realizar el estudio.

4) La puntuación media obtenida por los estudiantes en la escala Hamilton indicaría un nivel de ansiedad:

- a) Moderado.
- b) Grave.
- c) Menor.
- d) Ausente.
- e) Invalidante.

5) Los resultados que muestran los estudios en relación con la prevalencia de la ansiedad son muy homogéneos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones al respecto es incorrecta?

- a) Newcomb et al. utilizaron la escala TSI (Trauma Symptom Inventory) para valorar el grado de ansiedad.
- b) Los resultados entre víctimas de abuso sexual y no víctimas son una razón de posibilidades de 2,00 según el estudio realizado por Li et al.
- c) Fergusson et al. llevaron a cabo un estudio descriptivo transversal.
- d) Cortés et al. obtuvieron niveles más elevados de ansiedad en víctimas con respecto a las no víctimas.
- e) La ansiedad supone un diagnóstico a consecuencia del abuso sexual infantil, que, además, se encuentra más prevalente en mujeres que en hombres.

6) ¿Cuál es la única sustancia psicoactiva donde se han encontrado diferencias de consumo entre estudiantes y profesionales?

- a) Alcohol.
- b) Tabaco.
- c) Marihuana.
- d) Heroína.
- e) Cocaína.

7) ¿Cuál es la tercera sustancia psicoactiva más consumida, después del alcohol y el tabaco?

- a) Marihuana.
- b) Cocaína.
- c) Medicamentos ansiolíticos.
- d) Éxtasis.
- e) Heroína.

8) ¿Cómo es la evolución natural de los tics en el síndrome de la Tourette?

- a) La evolución natural de los tics implica que, en la mayoría de los casos, se produce una mejoría en la gravedad, frecuencia y repercusiones durante la adolescencia o el inicio de la edad adulta.
- b) Pueden remitir íntegramente en muchos de los casos.
- c) Los tics empeoran paulatinamente afectando la funcionalidad de la persona que padece el síndrome de la Tourette.
- d) En la actualidad, se desconoce la evolución del síndrome.
- e) Las respuestas a y b son ciertas.

9) Hasta el momento, el factor genético asociado a un mayor riesgo de presentar esquizofrenia es:

- a) Ser portador de un cromosoma Y.
- b) Tener un hermano gemelo (monocigótico) afectado.
- c) Ser de origen caucásico.
- d) Ser portador de las variantes genéticas de riesgo comunes en los genes DISC1, RGS4, GAD1, ILB1, NRG1 y DTNBP1.
- e) Ninguna de las respuestas es correcta.

10) ¿Cuál es la prevalencia en la población entre los 5 y los 18 años del síndrome de la Tourette?

- a) Entre el 0,1 y el 1,8 %, siendo más común en mujeres.
- b) Entre el 4 y el 10,8 %, siendo más común en hombres.
- c) Entre el 0,3 y el 3,8 %, siendo más común en hombres.
- d) Entre el 0,3 y el 3,8 %, siendo igual de común en ambos sexos.
- e) Ninguna es correcta.