

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Avisan de paritorio por cesárea programada de recién nacido mujer de 40 semanas de gestación, peso estimado de 3500 gramos, diagnosticada antenatalmente en la ecografía de la semana 38 de defecto en la continuidad de la piel y columna a nivel lumbar.

Pregunta 1

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué diagnóstico sospecharías?

Seleccione una:

a. ONFALOCELE

b. MIELOMENINGOCELE

c. ENCEFALOCELE (erroneamente mencionado en los apuntes como ENFALOCELE)

d. HIDROCEFALIA

Pregunta 2

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué complicaciones debes prever que ocurran en las primeras horas de vida?

Seleccione una:

a. Hipotermia

b. Oliguria

c. Fiebre secundaria a infección del defecto

d. a y b son correctas

Pregunta 3

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿cuál es la posición más recomendada en la que colocaremos al recién nacido en la cuna térmica nada más nacer?

Seleccione una:

- a. decúbito supino
- b. decúbito lateral
- c. decúbito prono
- d. b y c son correctas

Pregunta 4

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo cubriremos el defecto lumbar?

Seleccione una:

- a. Con apósito de gasa estéril adhesivo
- b. Con gasas estériles húmedas con agua estéril
- c. Con gasas estériles humedecidas con suero salino templado
- d. Con gasas estériles humedecidas con suero salino templado y protegido por plástico transparente

Pregunta 5

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo manipularemos el defecto?

Seleccione una:

- a. Con medidas de barrera como si estuviera en aislamiento de contacto (guantes, gorro y mascarilla)
- b. Guantes estériles sin látex
- c. Guantes estériles con látex
- d. Guantes normales

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Recién nacido a término de 41+1 semanas de gestación y de buen peso, hijo de madre de treinta años de edad, multípara, sin antecedentes de salud anterior de interés, grupo O, que llega en trabajo de parto, con dilatación completa, y sin signos de sufrimiento fetal (líquido amniótico claro y cardiotacografía normal), estreptococo grupo B negativo. Presentación de nalgas. En el parto se produce distocia de cabeza, quedando esta retenida durante 5 minutos; requiriendo maniobras especiales para su extracción.

Al nacimiento Apgar 0-2 rápidamente se procedió a su reanimación (intubación endotraqueal y ventilación con PPI). Se trasladó al Servicio de Cuidados Intensivos neonatales, al llegar al mismo en estado crítico se acopló a equipo de ventilación y se procedió a iniciar su estudio y tratamiento intensivo.

Sistema Neurológico: Alerta, postura en flexión, hipertónico, manos en flexión palmar, pulgar oculto, no movimientos convulsivos, fontanelas amplias, con diastasis de suturas y circunferencia cefálica de 39 cm. Reflejos tendinosos exaltados y se mueve de forma agitada e intranquila.

Glucemia 72mg/dl

coagulación: Normal

Gasometría arterial Acidosis metabólica severa

PH 7.26, HCO3 12.4 mEq/L, PCO2 20 mmHg,

EB -17.4 mEq/L, PO2 80 mmHg , SO2 96%

Pregunta 1

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Qué situación de riesgo crees que ha podido sufrir este recién nacido durante el trabajo de parto?

Seleccione una:



a. Hemorragia por sangrado materno



b. Infección por extracción dificultosa



c. Asfixia perinatal



d. Distocia de caderas

Pregunta 2

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si aplicamos alguna de las escalas para clasificar la encefalopatía ¿Qué tipo de encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) presentaría este recién nacido?

Seleccione una:

- a. EHI leve
- b. EHI moderada
- c. EHI grave
- d. Ninguna

Pregunta 3

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala qué NO es potencialmente perjudicial a nivel neurológico en este paciente

Seleccione una:

- a. una temperatura corporal mayor que 37.5°C
- b. una PaCO2 menor que 20 mmHg
- c. una SpO2 del 100%
- d. una Glucemia capilar menor que 50 mg/dl.

Pregunta 4

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Recién Nacido presenta TAM de 30 mmHg. ¿Qué medidas crees que se deberían llevar a cabo?

Seleccione una:

- a. Ninguna, es una TAM aceptable.
- b. Monitorizaría la TA cada 4-6h para asegurarme de que no se hipotensa.
- c. Monitorizaría la TA mínimo cada hora y avisaría al médico de guardia.
- d. Sólo monitorizaría la TA si observo cambios en la frecuencia cardiaca del paciente.

Pregunta 5

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un RN con EHI leve ¿Qué medida NO crees que se debería llevar a cabo?

Seleccione una:

- a. Monitorización cerebral continua (EEG)
- b. Iniciar protocolo de hipotermia terapéutica
- c. Repetir valoración neurológica con clasificación de Sarnat a la 1-3 y 5 horas de vida
- d. Todas son medidas que se deberían llevar a cabo

Siguiente