

# Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

## Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En la valoración secundaria del tórax ¿cuál de estas actividades no realizaremos?

Seleccione una:

- ☐ a. Inspeccionar pared anterior y lateral
- ☒ b. Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque
- ☐ c. Valorar parrilla costal y esternón
- ☐ d. Auscultación de ambos campos pulmonares

## Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Indica las funciones de los dispositivos para inmovilización cervical llamado X-Collar

Seleccione una:

- ☐ a. Un conjunto de correas de velcro para asegurar al paciente a la camilla y así evitar el movimiento de lateralización y de flexo-extensión
- ☐ b. Proporciona un mayor grado de inmovilización
- ☐ c. Proporciona un grado de movilización flexo-extensión.
- ☒ d. a y b son correctas

## Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En cuanto tiempo se aconseja hacer una valoración primaria en la asistencia a politrauma

Seleccione una:

- ☒ a. 10 segundos
- ☐ b. 15 segundos
- ☐ c. 13 segundos
- ☐ d. ninguna de las anteriores es correcta

**Pregunta 4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Auscultando la zona abdominal de mesogastrio ¿Qué órganos se encuentran en dicha zona?

Seleccione una:

- ☐ a. Colon descendente
- ☐ b. Útero
- ☐ c. Vejiga
- ☒ d. Yeyuno

**Pregunta 5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En la aplicación de Celox®, ¿cuál de estas actuaciones son correctas?

Seleccione una:

- ☐ a. Cubrir la herida y presionar en “this side up”
- ☒ b. Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar
- ☐ c. Vendaje por el extremo suelto en la herida y tapar con el resto
- ☐ d. Colocar almohadilla sobre la herida y envolver la venda elástica alrededor de la extremidad o parte del cuerpo lesionado

**Pregunta 6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Está indicado el sondaje vesical antes del traslado al centro hospitalario en el paciente politraumatizado en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. Sangre en meato urinario
- ☐ b. Equimosis perineal
- ☐ c. Hematoma escrotal
- ☒ d. Ninguna es correcta

**Pregunta 7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Qué consideraciones tendrás en cuenta si realizas un torniquete:

Seleccione una:

- ☐ a. Estos deben quedar siempre visibles.
- ☐ b. Apuntar la hora de inicio.
- ☐ c. En principio no se retirarán hasta estar en una situación y en un entorno controlado como un quirófano
- ☒ d. Todas son correctas

**Pregunta 8**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las fracturas que suponen riesgo vital e implican traslado urgente son: Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Fracturas abiertas
- ☐ b. Fracturas bilaterales de fémur
- ☐ c. Fractura con sección arterial o ausencia de pulso
- ☒ d. Todas son correctas

**Pregunta 9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Mediante la auscultación pulmonar y cardíaca, podremos descubrir las siguientes lesiones, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Fracturas costales
- ☐ b. Hemotórax
- ☐ c. Taponamiento cardíaco
- ☐ d. Neumotórax

**Pregunta 10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La mortalidad en el 2º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☒ a. Aproximadamente 30%
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☐ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

**Pregunta 11**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para valorar la zona hepática lo buscaremos en:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipogastrio
- ☐ b. Fosa iliaca derecha
- ☐ c. Fosa iliaca izquierda
- ☒ d. Hipocondrio derecho

**Pregunta 12**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Mediante la inspección abdominal en un politrauma, se realiza la siguiente técnica. Indica la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Se buscará la presencia de distensión abdominal, hematomas y heridas.
- ☐ b. Se valorará el peristaltismo
- ☐ c. Se explorarán zonas dolorosas, comprobando timpanismo (aire) o matidez (líquido).
- ☐ d. Todas son correctas

**Pregunta 13**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La mortalidad en el 3º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☐ a. Aproximadamente 30%
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☒ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

**Pregunta 14**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Indica algunas de las causas que pueden comprometer la ventilación del paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Neumotórax a tensión
- ☐ b. Neumotórax abierto
- ☐ c. Neumotórax masivo
- ☒ d. Todas son correctas

**Pregunta 15**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿cuál es el primer paso ante una hemorragia exanguinante?:

Seleccione una:

- ☒ a. Compresión directa con gasas y compresas
- ☐ b. Uso de hemostáticos
- ☐ c. Torniquete
- ☐ d. Vendaje israelí

**Pregunta 16**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En qué nivel de la escala Glasgow estará el paciente politrauma para aislar la vía aérea con IOT

Seleccione una:

- ☐ a. menor que 10
- ☒ b. menor que 8
- ☐ c. menor que 11
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

**Pregunta 17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En el 3º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☐ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☒ d. Shock séptico

**Pregunta 18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si palpas un pulso carotideo que TA aproximada puede tener nuestro paciente

Seleccione una:

- ☐ a. mayor que 80 mmHg.
- ☐ b. mayor que 70 mmHg.
- ☒ c. mayor que 60 mmHg
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

**Pregunta 19**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

De las siguientes afirmaciones indica cual es una contraindicación del sondaje vesical:

Seleccione una:

- ☐ a. Globo vesical
- ☐ b. Sangre en el meato urinario
- ☐ c. Equimosis perineal
- ☒ d. B y C son correctas

**Pregunta 20**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En el 2º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☒ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☐ d. Shock séptico

Volver a: Módulo 1. Evalu... ➡