

Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

Comenzado el	domingo, 14 de noviembre de 2021, 18:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 14 de noviembre de 2021, 18:09
Tiempo empleado	7 minutos 36 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una fractura de peroné inmovilizada mediante yeso para su seguimiento
¿Cuál de las siguientes respuestas no es una complicación que pueda presentar?

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome compartimental
- ☒ b. Distrofia muscular
- ☐ c. Síndrome de desuso
- ☐ d. Úlceras por presión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distrofia muscular

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando un enfermo aumenta voluntariamente la tensión de sus músculos, pero no se mueve la articulación ni cambia la longitud del músculo, está haciendo ejercicio

Seleccione una:

- ☒ a. Isométrico
- ☐ b. Pasivo
- ☐ c. Isotónico
- ☐ d. Del arco de movimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Isométrico

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es la medida prioritaria a aplicar en la atención al paciente con politraumatismo?

Seleccione una:

- ☐ a. Perfundir líquidos para prevenir el shock
- ☒ b. Mantener vía aérea permeable
- ☐ c. Controlar la hemorragia
- ☐ d. Valoración neurológica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener vía aérea permeable

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fractura en la que el hueso se rompe de forma incompleta al permanecer la cortical y el periostio íntegro produciéndose una angulación se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Fractura abierta
- ☐ b. Fractura cerrada
- ☐ c. Fractura incompleta
- ☒ d. Fractura en tallo verde

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fractura en tallo verde

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El primer síntoma que puede indicar la aparición de síndrome compartimental es:

Seleccione una:

- ☒ a. Dolor pulsátil en el miembro que no cede con analgésicos
- ☐ b. calor en la zona afectada
- ☐ c. Relleno capilar normal
- ☐ d. sensación de pesadez en la zona afectada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor pulsátil en el miembro que no cede con analgésicos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La profilaxis antitrombótica en el paciente que sufre una fractura de cadera se realiza mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Antiagregante plaquetario oral
- ☒ b. Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea
- ☐ c. No es necesario dicha profilaxis
- ☐ d. Soluciones fibrinolíticas en distintas proporciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La desviación lateral de la columna vertebral en forma de S se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. cifosis
- ☐ b. Lordosis
- ☒ c. Escoliosis
- ☐ d. Torticollis postural

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escoliosis

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de las fracturas ¿Cuál de los siguientes dispositivos no es de inmovilización externa?

Seleccione una:

- ☐ a. Férulas
- ☐ b. Enyesados
- ☒ c. Vástagos
- ☐ d. Ortesis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vástagos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El collarín ideal para inmovilizaciones cervicales en politraumatizados tendría las características siguientes. Señale cual se ellas son incorrectas

Seleccione una:

- ☐ a. Collarín rígido
- ☐ b. Tener apoyo mentoniano
- ☐ c. Tener un orificio anterior
- ☒ d. Collarín blando

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Collarín blando

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las mayores complicaciones que puede presentarse en la fractura en especial la de las extremidades se encuentra:

Seleccione una:

- ☒ a. Síndrome compartimental
- ☐ b. Edema pulmonar
- ☐ c. Hemorragia
- ☐ d. Dolor leve

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome compartimental

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué se asocia el signo de Battle?

Seleccione una:

- ☐ a. Fractura de huesos propios de la nariz
- ☒ b. Fractura de la base del cráneo
- ☐ c. Fractura de fémur
- ☐ d. Fractura de escafoides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fractura de la base del cráneo

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al sistema esquelético

Seleccione una:

- ☐ a. Sostén a los tejidos blandos
- ☐ b. Producción de células sanguíneas
- ☐ c. Almacenamiento de triglicéridos
- ☒ d. Síntesis de vitamina D

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síntesis de vitamina D

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de un paciente con fractura múltiple en extremidad inferior y gran contusión por aplastamiento, las primeras manifestaciones clínicas que aparecen en el síndrome compartimental son:

Seleccione una:

- ☒ a. Dolor y parestesia
- ☐ b. Petequias
- ☐ c. Lesiones cutáneas
- ☐ d. Acrocianosis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor y parestesia

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las fracturas de tipo I que tratamiento antibiótico se debe iniciar lo antes posible:

Seleccione una:

- ☒ a. cefalosporina de primera generación (cefazolina), 1 g cada 8 h, 3 dosis.
- ☐ b. dosis inicial de 2 g de cefazolina
- ☐ c. Penicilina 4.000.000 UI cada 4 h
- ☐ d. Levofloxacino 500 mg/ 8 Horas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: cefalosporina de primera generación (cefazolina), 1 g cada 8 h, 3 dosis.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se produce una fractura que separa el hueso y otros tejidos de su punto de inserción se denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. fractura por avulsión
- ☐ b. Fractura con minuta
- ☐ c. Fractura espiroidea
- ☐ d. Fractura en rodete

Retroalimentación

La respuesta correcta es: fractura por avulsión

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una fractura es básicamente es:

Seleccione una:

- ☒ a. Una interrupción de la continuidad de un hueso
- ☐ b. Una interrupción en la continuidad de la piel
- ☐ c. Una disminución en el grosor del hueso
- ☐ d. Una falta de remineralización del hueso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una interrupción de la continuidad de un hueso

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes huesos fracturado puede producir mayor pérdida de sangre:
(Identifica la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Tibia-peroné
- ☐ b. Costillas
- ☐ c. Húmero
- ☒ d. Pelvis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pelvis

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica las complicaciones relacionadas con las fracturas cerradas

Seleccione una:

- ☐ a. Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda.
- ☐ b. Embolia grasa, especialmente en fracturas cerradas de huesos largos.
- ☐ c. Síndrome compartimental
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la fractura más frecuente en pacientes con osteoporosis?

Seleccione una:

- ☒ a. Cuerpos vertebrales
- ☐ b. Radio
- ☐ c. cúbito
- ☐ d. Costillas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuerpos vertebrales

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes dispositivos hay uno que no se utiliza para inmovilizar a los pacientes politraumatizados. Señale cuál de ellos es:

Seleccione una:

- ☐ a. Dispositivo de Kendrick
- ☐ b. Camilla cuchara
- ☒ c. Capnógrafo
- ☐ d. Férulas neumáticas hinchables

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capnógrafo