

## modulo 1

¿Cuál es el objetivo del triaje pediátrico?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Tomar los datos del niño para su identificación.
- c. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- d. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las razones para realizar un traslado intrahospitalario pueden ser todas excepto:

Seleccione una:

- a. Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior
- b. Para la realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas que no se encuentran dentro de la unidad de urgencias, (RNM, Rx, TAC...).
- c. Para llevarlo a quirófano para la realización de una intervención urgente.
- d. Para su ingreso en una planta de hospitalización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- a. El procedimiento a realizar.
- b. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- c. La identificación del paciente.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Informar a admisión de su traslado.
- b. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.
- c. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- d. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:

Seleccione una:

- a. El material adecuado para el traslado.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Comunicación y coordinación previa.
- d. El personal adecuado para el acompañamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- a. PETAS.
- b. MAT.
- c. CTAS.
- d. ESI.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un objetivo del triaje:

Seleccione una:

- a. Mejorar la calidad de atención del servicio.
- b. Asignar el área más adecuada para la atención del paciente.
- c. Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.
- d. Diferenciar los casos urgentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso?

Seleccione una:

- a. Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.
- b. No conectarlo a la red.
- c. No revisar el estado del paciente.
- d. No apuntar las constantes a la llegada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acciones no debemos llevar a cabo en la urgencia pediátrica para asegurar la seguridad de paciente?

Seleccione una:

- a. Vigilancia de las úlceras por presión.
- b. Identificación del paciente.
- c. Prevención de la infección.
- d. Prevención de accidentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilancia de las úlceras por presión.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué consideración hay que tener en cuenta con las balas de oxígeno antes de realizar el traslado?

Seleccione una:

- a. Su autonomía.
- b. Su tamaño.
- c. Su peso.
- d. Su capacidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su autonomía.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente?

Seleccione una:

- a. Verificar que tiene batería suficiente.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.
- d. Verificar su correcto funcionamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué debemos considerar a la hora de realizar un transporte interhospitalario según el medio de transporte?

Seleccione una:

- a. La distancia a recorrer.
- b. La comodidad del paciente.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. La dotación del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La distancia a recorrer.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué dotación de enfermería debe tener el servicio de urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores son correctas.

- b. La relación enfermera-auxiliar deberá ser 2/1.
- c. Un auxiliar por cada 40-50 visitas diarias y uno en observación por cada seis pacientes.
- d. Un enfermero por cada 30-40 visitas diarias y un enfermero de triaje.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico?

Seleccione una:

- a. El riesgo vital.
- b. El diagnóstico.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. El tratamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo vital.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué no se debe tener en cuenta en el diseño de las áreas del servicio de urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- a. Puertas con materiales transparentes.
- b. El tamaño del hospital.

- c. La iluminación natural.
- d. El nivel acústico adecuado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tamaño del hospital.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué se evalúa en el triángulo de evaluación pediátrica?

Seleccione una:

- a. La circulación.
- b. La respiración.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. La apariencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tiempo se considera recomendable de experiencia para trabajar en las urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- a. No es necesaria una experiencia previa.
- b. 3 años para enfermería y 2 para médicos.
- c. Al menos 3 años tanto para médicos como para enfermería.



d. 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de check list debíamos de realizar previo al traslado de un paciente?

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. Las cosas a verificar a la recepción del paciente de nuevo en las urgencias.
- c. Comprobaciones a realizar previas al mismo.
- d. Acciones a realizar antes del traslado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala canadiense, el paciente en situación no urgente que generalmente no requiere ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica, corresponde al nivel:

Seleccione una:

- a. III.
- b. I.
- c. IV
- d. V.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: V.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la situación vital del paciente para el traslado interhospitalario, el transporte puede ser (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Transporte demorable.
- b. Transporte de emergencia.
- c. Transporte urgente.
- d. Transporte normal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte normal.

## modulo 2

¿Cuál es la velocidad de las compresiones torácicas en un niño?

Seleccione una:

- a. 90 - 100 lpm.
- b. 110-120 lpm.
- c. 70 - 90 lpm.
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 110-120 lpm.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

MarcadasDesmarcar

Enunciado de la pregunta

Si un niños está inconsciente, ¿qué es lo primero que debemos verificar?:

Seleccione una:

- a. La ausencia de respiración.
- b. La presencia de pulso.
- c. La permeabilidad de la vía aérea.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La permeabilidad de la vía aérea.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:

- a. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.
- b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- c. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.
- d. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Vía intraósea.
- c. Vía venosa central.
- d. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:

- a. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.
- b. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- c. Son completamente distintas.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- a. 5 J/Kg.
- b. 4 J/kg.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. 9 J/Kg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera acción a realizar?

Seleccione una:

- a. Comprobar si late el corazón.
- b. Verificar el estado de consciencia.
- c. Asegurar la seguridad del niño.
- d. Comprobar si respira.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar la seguridad del niño.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada?

Seleccione una:

- a. Cánula orofaríngea.
- b. Mascarilla laríngea.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Intubación traqueal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación traqueal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los principios básicos de la ética? Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Independencia.
- b. Autonomía.
- c. Beneficencia.
- d. No maleficencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo no finalizaremos maniobras de RCP?

Seleccione una:

- a. Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos.
- b. Cuando haya por escrito una orden de no reanimar y se compruebe su existencia.
- c. Cuando el reanimador esté exhausto o en grave peligro.
- d. Cuando haya signos evidentes de muerte biológica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo mejora los resultados de la RCP?

Seleccione una:

- a. Cuando se inicia la RCP básica en menos de 8 minutos.
- b. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. En la zona abdominal superior.
- c. En la base de las costillas.
- d. Un través de dedo por encima del apéndice xifoides.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un través de dedo por encima del apéndice xifoides.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué características no debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica?

Seleccione una:

- a. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización.
- b. El material debe estar fácilmente visible y ordenado.
- c. El carro se debe mover fácilmente, debe tener cajones y carteles bien visibles y de fácil utilización.
- d. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta



¿Qué es la reanimación cardiopulmonary?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores no es correcta.
- b. Un conjunto de técnicas y maniobras.
- c. Es un procedimiento médico de trabajo.
- d. Es un consenso internacional.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de técnicas y maniobras.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración?

Seleccione una:

- a. Lo colocaremos en posición de seguridad.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.
- d. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medicación de las siguientes es obligatoria en un carro de parada?

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Nolotil.
- c. Adrenalina.
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. No es necesario que la orden esté por escrito.
- c. Debe ser revisable.
- d. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tenemos que hacer si tras estimular el niño no responde?

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. Gritar pidiendo ayuda.
- c. Mover al niño con cuidado y colocarlo en decúbito supino.
- d. Abrir la vía aérea del niño extendiendo su cabeza y elevando su mandíbula.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, ¿qué maniobra realizaremos?

Seleccione una:

- a. Repetiremos la misma maniobra.
- b. No intentaremos abrir la vía aérea.
- c. Realizaremos la tracción mandibular.
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si sospechamos de obstrucción en la vía aérea para conseguir una ventilación eficaz deberemos:

Seleccione una:

- a. Hacer un barrido a ciegas con el dedo.

- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción.
- d. Seguir con las ventilaciones más intensamente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción.

### **modulo 3**

Para elegir el adecuado tamaño de la cánula orofaríngea mediremos:

Seleccione una:

- a. No hace falta medir nada.
- b. Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.
- c. Desde la comisura del labio al parte posterior de la oreja.
- d. El calibre va en función de la edad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.

#### **Pregunta 2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué se utiliza para abrir la vía aérea?

Seleccione una:

- a. Siempre tracción mandibular.
- b. Siempre la maniobra frente-mentón.
- c. Siempre subluxación de mandíbula.
- d. Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- a. Intoxicación por AAS
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Intoxicación por antitérmicos.
- d. Intoxicación por anticonvulsivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- a. Gastritis aguda.
- b. Hipotermia.
- c. Depresión del SNC.
- d. Hiperglucemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Accidentes de tráfico.
- c. Heridas.
- d. Ahogamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Lund y Browder.
- c. PIPP.

d. Glasgow.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Segundo grado profunda.
- c. Tercer grado.
- d. Primer grado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segundo grado profunda.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de 1 a 3 años:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Tienen poca autonomía, no les gusta explorar.
- c. Los niños tienen conciencia de los peligros.

d. Tienden a llevarse todo a la boca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienden a llevarse todo a la boca.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita?

Seleccione una:

- a. De 6 a 12 meses.
- b. De 0 a 6 meses.
- c. De 1 a 3 años.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 0 a 6 meses.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi - ahogamiento?

Seleccione una:

- a. Para aislar la vía aérea.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Para descompresión y evacuación gástrica.

d. Para administrar alimento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para descompresión y evacuación gástrica.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa?

Seleccione una:

a. Paracetamol.

b. No precisa ninguna analgesia.

c. Ninguna de las opciones es correcta.

d. Sacarosa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol?

Seleccione una:

a. N - acetilcisteína.

b. Ninguna de las opciones es correcta.

c. Naloxona.

d. Flumacénilo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: N - acetilcisteína.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué características de las siguientes son propias de los adolescentes?

Seleccione una:

a. Tienen una gran estabilidad emocional.

b. Ninguna de las opciones es correcta.

c. Adquieren mayor protagonismo los familiares.

d. Adquieren mayor protagonismo los amigos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquieren mayor protagonismo los amigos.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

MarcadasDesmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Qué no debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio?

Seleccione una:

- a. Estridor.
- b. Carbonización de vellos nasales.
- c. Frecuencia cardíaca.
- d. Mucosa oral y nasal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia?

Seleccione una:

- a. Aislar la vía aérea.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Administrar oxígeno.
- d. Colocar al paciente en decúbito lateral derecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislar la vía aérea.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo?

Seleccione una:

- a. Agua destilada.
- b. Suero fisiológico.
- c. Carbón activado.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué solución anestésica aplicaríamos en la piel del niño antes de realizar una anestesia local para hacer la sutura de una ceja?

Seleccione una:

- a. EMLA.
- b. GEL - LAT.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Lidocaína.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: GEL - LAT.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación, ¿qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Limpia - contaminada.
- c. Limpia.
- d. Contaminada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si llega al triaje un niño de 5 años con una cefalea intensa, ¿qué escala de dolor utilizaremos para valorarlo?

Seleccione una:

- a. La escala numérica.
- b. La escala CRIES.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. La escala de Wong Baker.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de Wong Baker.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño de tres años llega a la urgencia con contusiones y hematomas en diferentes estadios, con alopecia en diferentes zonas de su cabeza y que se muestra antisocial, debemos sospechar de:

Seleccione una:

- a. Abuso sexual.
- b. Maltrato físico.
- c. Maltrato por negligencia.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maltrato físico.

## **modulo4**

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- a. Intoxicaciones por productos del hogar.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Intoxicaciones por antitérmicos.
- d. Intoxicaciones por monóxido de carbono.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicaciones por antitérmicos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto tiempo comprobaremos la eficacia de las maniobras en una RCP?

Seleccione una:

- a. Cada 10 minutos.
- b. Cada 5 minutos.
- c. Cada minuto.
- d. No hace falta comprobar nada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada minuto.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.
- d. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- d. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- b. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.



d. Las opciones 1 y 2 son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.
- b. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Comprobar la correcta identificación del paciente.
- b. No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Limitar el número de personas extrañas durante el procedimiento. Centrarse primero en el procedimiento y luego en el niño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar la correcta identificación del paciente.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción?

Seleccione una:

- a. Con bolsa adhesiva perineal.
- b. Por micción espontánea.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Sondaje vesical.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la colocación de una férula, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Se procede a proteger la piel: Vendaje tubular: se realiza para evitar que el vello del miembro se quede pegado al yeso, facilitando la transpiración, elimina las asperezas de los extremos del yeso y facilita la retirada del mismo. La venda tubular se dobla sobre el yeso una vez colocado éste.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- c. Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.
- d. Opción 1: Se retirarán pulseras, anillos y otros enseres que puedan entorpecer la realización de la técnica y para prevenir la posible aparición de edema del miembro que se va a inmovilizar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica de aspiración de secreciones, indique lo correcto:

Seleccione una:

- a. Es una técnica no estéril.

- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Se puede realizar tras las comidas.
- d. Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ventilación con bolsa autohinchable, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.
- b. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.
- c. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.
- d. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa del desarrollo del niño, la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto?

Seleccione una:

- a. Niño pequeño.
- b. Lactante.
- c. Neonato.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neonato.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Administración de alimentación oral.
- c. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.
- d. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta de la administración de carbón activado:

Seleccione una:

- a. Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.
- b. Si se administra por vía oral, se puede dar solo o mezclar con agua, zumo, lácteos o bebidas carbonatadas.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. No se puede repetir la dosis si lo vomitan.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.
- c. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.
- d. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

#### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura central se toma en:

Seleccione una:

- a. La cavidad oral.
- b. El recto.
- c. La axila.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El recto.

#### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.
- b. Se colocará al paciente en Fowler o Semi-fowler.
- c. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.

d. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos o retirar la mascarilla o volver a administrar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué férula es la que va desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia?

Seleccione una:

- a. Férula isquiomaleolar.
- b. Férula posterior de tobillo o suropédica.
- c. Férula isquiopédica.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Férula posterior de tobillo o suropédica.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué material es necesario para colocar una férula de Zimmer?

Seleccione una:



- a. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- b. Opción 2: Venda de algodón y venda elástica.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Opción 1: Tiras de esparadrapo y férula de aluminio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tomamos la frecuencia cardíaca a través de un monitor. ¿Dónde se coloca el electrodo amarillo previa limpieza de la piel del paciente?

Seleccione una:

- a. Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. En el lado inferior izquierdo debajo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.
- d. Debajo de la clavícula, cerca del hombro derecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo

## **modulo 5**

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- a. Intoxicaciones por productos del hogar.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Intoxicaciones por antitérmicos.

d. Intoxicaciones por monóxido de carbono.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicaciones por antitérmicos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto tiempo comprobaremos la eficacia de las maniobras en una RCP?

Seleccione una:

- a. Cada 10 minutos.
- b. Cada 5 minutos.
- c. Cada minuto.
- d. No hace falta comprobar nada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada minuto.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.

c. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.

d. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- d. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- b. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Las opciones 1 y 2 son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.
- b. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.

d. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta 7

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Comprobar la correcta identificación del paciente.
- b. No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Limitar el número de personas extrañas durante el procedimiento. Centrarse primero en el procedimiento y luego en el niño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar la correcta identificación del paciente.

Pregunta 8

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción?

Seleccione una:

- a. Con bolsa adhesiva perineal.
- b. Por micción espontánea.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Sondaje vesical.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la colocación de una férula, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Se procede a proteger la piel: Vendaje tubular: se realiza para evitar que el vello del miembro se quede pegado al yeso, facilitando la transpiración, elimina las asperezas de los extremos del yeso y facilita la retirada del mismo. La venda tubular se dobla sobre el yeso una vez colocado éste.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- c. Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.
- d. Opción 1: Se retirarán pulseras, anillos y otros enseres que puedan entorpecer la realización de la técnica y para prevenir la posible aparición de edema del miembro que se va a inmovilizar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica de aspiración de secreciones, indique lo correcto:

Seleccione una:

- a. Es una técnica no estéril.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Se puede realizar tras las comidas.
- d. Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ventilación con bolsa autohinchable, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.
- b. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.

c. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.

d. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa del desarrollo del niño, la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto?

Seleccione una:

- a. Niño pequeño.
- b. Lactante.
- c. Neonato.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neonato.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta



Enunciado de la pregunta

Indique cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Administración de alimentación oral.
- c. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.
- d. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta de la administración de carbón activado:

Seleccione una:

- a. Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.
- b. Si se administra por vía oral, se puede dar solo o mezclar con agua, zumo, lácteos o bebidas carbonatadas.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. No se puede repetir la dosis si lo vomitan.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.
- c. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.
- d. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura central se toma en:

Seleccione una:

- a. La cavidad oral.
- b. El recto.
- c. La axila.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El recto.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.
- b. Se colocará al paciente en Fowler o Semi-fowler.
- c. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.
- d. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos retirar la mascarilla o volver a administrar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué férula es la que va desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia?

Seleccione una:

- a. Férula isquiomaleolar.
- b. Férula posterior de tobillo o suropédica.
- c. Férula isquiopédica.

d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Férula posterior de tobillo o suropédica.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué material es necesario para colocar una férula de Zimmer?

Seleccione una:

- a. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- b. Opción 2: Venda de algodón y venda elástica.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Opción 1: Tiras de esparadrapo y férula de aluminio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tomamos la frecuencia cardíaca a través de un monitor. ¿Dónde se coloca el electrodo amarillo previa limpieza de la piel del paciente?

Seleccione una:

- a. Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.

- c. En el lado inferior izquierdo debajo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.
- d. Debajo de la clavícula, cerca del hombro derecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.

## examen final

¿Cuál es el objetivo del triaje pediátrico?

Seleccione una:

- ☒ a. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- ☐ b. Tomar los datos del niño para su identificación.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Diagnosticar la enfermedad del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las razones para realizar un traslado intrahospitalario pueden ser todas excepto:

Seleccione una:


- ☐ a. Para llevarlo a quirófano para la realización de una intervención urgente.
- ☐ b. Para la realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas que no se encuentran dentro de la unidad de urgencias, (RNM, Rx, TAC...).
- ☐ c. Para su ingreso en una planta de hospitalización
- ☒ d. Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Pregunta **3**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:


Seleccione una:

- ☒ a. Todas las opciones son correctas.
- ☐ b. El procedimiento a realizar.
- ☐ c. La identificación del paciente.
- ☐ d. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 4  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.
- ☐ b. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.
- ☐ c. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- ☒ d. Informar a admisión de su traslado.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:

Seleccione una:

- ☐ a. El material adecuado para el traslado.
- ☐ b. Comunicación y coordinación previa.
- ☐ c. El personal adecuado para el acompañamiento.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- ☐ a. ESI.
- ☒ b. PETAS.
- ☐ c. MAT.
- ☐ d. CTAS.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la velocidad de las compresiones torácicas en un niño?

Seleccione una:

- ☒ a. 110-120 lpm.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. 70 - 90 lpm.
- ☐ d. 90 - 100 lpm.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 110-120 lpm.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si un niños está inconsciente, ¿qué es lo primero que debemos verificar?:

Seleccione una:

- ☐ a. La presencia de pulso.
- ☒ b. La permeabilidad de la vía aérea.
- ☐ c. La ausencia de respiración.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La permeabilidad de la vía aérea.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:

- ☒ a. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- ☐ b. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.
- ☐ c. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.
- ☐ d. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. Vía intraósea.
- ☐ b. Vía venosa central.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ d. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.
- ☐ c. Son completamente distintas.
- ☐ d. No hay diferencias fundamentales entre ambas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. 9 J/Kg.
- ☐ b. 5 J/Kg.
- ☒ c. 4 J/kg.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las opciones son incorrectas.
- ☐ b. Taquipnea.
- ☐ c. Polipnea.
- ☒ d. Bradipnea.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un niño no respira cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Sintamos su respiración al acercar la mejilla a su cara.
- ☒ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Su tórax se expande con regularidad.
- ☐ d. Oigamos su respiración.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?

Seleccione una:

- ☐ a. Otitis media aguda.
- ☐ b. Faringoamigdalitis.
- ☒ c. Mastoiditis.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ c. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☒ d. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Pregunta **17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. ¿Cuál de estos cuidados no debemos realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las opciones son correctas.
- ☐ b. Es importante mantener la temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.
- ☐ c. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.
- ☒ d. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta **18**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria?

Seleccione una:

- ☐ a. Deshidratación.
- ☐ b. Picor intenso.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Edad del paciente.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para elegir el adecuado tamaño de la cánula orofaríngea mediremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Desde la comisura del labio al parte posterior de la oreja.
- ☐ b. El calibre va en función de la edad.
- ☒ c. Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.
- ☐ d. No hace falta medir nada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué se utiliza para abrir la vía aérea?

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre tracción mandibular.
- ☐ b. Siempre subluxación de mandíbula.
- ☐ c. Siempre la maniobra frente-mentón.
- ☒ d. Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Intoxicación por AAS
- ☐ c. Intoxicación por anticonvulsivos
- ☒ d. Intoxicación por antitérmicos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotermia.
- ☒ b. Hiperglucemia.
- ☐ c. Depresión del SNC.
- ☐ d. Gastritis aguda.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta **23**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Accidentes de tráfico.
- ☐ b. Heridas.
- ☒ c. Ahogamiento.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?

Seleccione una:

- ☒ a. Lund y Browder.
- ☐ b. Glasgow.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. PIPP.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Intoxicaciones por productos del hogar.
- ☐ b. Intoxicaciones por monóxido de carbono.
- ☒ c. Intoxicaciones por antitérmicos.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicaciones por antitérmicos.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto tiempo comprobaremos la eficacia de las maniobras en una RCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Cada minuto.
- ☐ b. Cada 10 minutos.
- ☐ c. Cada 5 minutos.
- ☐ d. No hace falta comprobar nada.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada minuto.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.
- ☒ d. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.
- ☒ b. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- ☐ b. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Las opciones 1 y 2 son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.



d. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

## caso practico 1

Está trabajando como TCAE en una urgencia pediatria. En el Box 2 se encuentra un niño de 6 años que ha entrado por su pie y que ha acudido a urgencias por cuadro catarral y fiebre. Al acceder al box el niño esta inconsciente. Enumere las tres primeras acciones que llevaría a cabo. Indíquelas por orden de realización, y argumente de forma breve el por qué de cada una de ellas.

Lo primero que debemos hacer es pedir ayuda en voz alta al resto de personal sanitario que puedan encontrarse en nuestro entorno.

Después hemos de comprobar si el niño respira o no, abriendo la vía aérea y mirando si mueve el pecho y acercando nuestra cara a la suya para oír y sentir su respiración.

Si el niño respira hemos de colocarlo en posición lateral de seguridad. Para evitar que la lengua caiga hacia atrás y se asfixie. Además, evita que la saliva, las secreciones respiratorias o el vómito, si se produce, puedan aspirarse a los pulmones y complicar la situación.

Si por el contrario, vemos que no respira, hemos de colocarlo nuevamente boca arriba para valorarlo y, si no respira o lo hace de forma ruidosa y con dificultad, comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar.