

Comenzado el	lunes, 26 de julio de 2021, 16:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de julio de 2021, 16:52
Tiempo empleado	35 segundos
Puntos	4,00/20,00
Calificación	2,00 de 10,00 (20%)
Comentario -	No Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta sobre el pinzamiento tardío del cordón umbilical:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Se realiza a partir del segundo minuto o tras el cese del latido del cordón umbilical.
- ☐ Ob. No incrementa el riesgo de hemorragia postparto materna.
- ☐ Oc. Mejora los niveles de hierro en el neonato.
- ☐ Od. Se relaciona con policitemia patológica en el neonato.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptación a la vida extrauterina / Cambios hematopoyéticos.

La respuesta correcta es: Se relaciona con policitemia patológica en el neonato.

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo aparecen las heces amarillentas propias del lactante?

Seleccione una:

- ☐ Oa. En las primeras 24 horas de vida.
- ☐ Ob. A los 3-4 días de vida.
- ☐ Oc. Tras la primera semana de vida.
- ☐ Od. A los 10-15 días de vida.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptación a la vida extrauterina / Cambios digestivos.

La respuesta correcta es: A los 3-4 días de vida.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre el test de Silverman:

Seleccione una:

- ☐ a. Es aconsejable realizarlo mientras el neonato mama.
- ☐ b. A menor puntuación, mejor adaptación respiratoria del neonato.
- ☐ c. Mide 4 parámetros.
- ☐ d. La puntuación total va de 0 a 12.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Test de Silverman.

La respuesta correcta es: A menor puntuación, mejor adaptación respiratoria del neonato.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo desaparece el reflejo de succión?

Seleccione una:

- ☐ a. A los 4-6 meses.
- ☐ b. A los 8 meses.
- ☐ c. A los 10-12 meses.
- ☐ d. A los 2 años.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Periodo intrahospitalario / Valoración general.

La respuesta correcta es: A los 4-6 meses.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre el test de Apgar:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite identificar a los neonatos que necesitan reanimación inmediata.
- ☐ b. Predice la supervivencia en el período neonatal.
- ☐ c. Permite establecer el pronóstico del desarrollo neurológico.
- ☐ d. Valora 5 parámetros.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Test de Apgar.

La respuesta correcta es: Permite establecer el pronóstico del desarrollo neurológico.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, al nacer se administra sistemáticamente a todos los niños vitamina K intramuscular, ¿en qué dosis?

Seleccione una:

- ☐ a. 0,5 mg.
- ☐ b. 1 mg.
- ☐ c. 1,5 mg.
- ☐ d. 2 mg.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Actividades generales.

La respuesta correcta es: 1 mg.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La pérdida de calor en el neonato hacia los objetos sólidos cercanos al él que están más fríos que éste, se produce por:

Seleccione una:

- ☐ a. Transferencia.
- ☐ b. Convección.
- ☐ c. Radiación.
- ☐ d. Conducción.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Actividades generales.

La respuesta correcta es: Radiación.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se suele cerrar la fontanela anterior?

Seleccione una:

- ☐ a. A los 2 meses de vida.

- ☐ Ob. A los 6-8 meses de vida.
- ☐ Oc. A los 10-12 meses de vida.
- ☐ Od. A los 18 meses de vida.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Periodo intrahospitalario / Valoración general.

La respuesta correcta es: A los 18 meses de vida.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La boca está preparada para la succión y deglución, mediante una coordinación que está presente a partir de la semana:

Seleccione una:

- ☐ Oa. 32-33.
- ☐ Ob. 33-34.
- ☐ Oc. 34-35.
- ☐ Od. 35-36.

Retroalimentación


Epígrafe Adaptación a la vida extrauterina / Cambios digestivos.

La respuesta correcta es: 35-36.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo ha de realizarse el test de Apgar a todos los neonatos?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Únicamente cuando presenten signos de mala adaptación extrauterina.
- ☐ Ob. Al minuto y a los 5 minutos.
- ☐ Oc. Al minuto y a los 10 minutos.
- ☐ Od. Al minuto, a los 5 y a los 10 minutos.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Test de Apgar.

La respuesta correcta es: Al minuto y a los 5 minutos.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las enfermedades incluidas en los distintos programas de cribado las dos únicas para la que hay un consenso total respecto a su inclusión en los programas de cribado son:

Seleccione una:

- ☐ a. La fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito.
- ☐ b. El hipotiroidismo congénito y la galactosemia.
- ☐ c. La galactosemia y la fibrosis quística.
- ☐ d. La fibrosis quística y la fenilcetonuria.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Periodo intrahospitalario.

La respuesta correcta es: La fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A partir de cuándo una apnea en el neonato puede acompañarse de bradicardia?

Seleccione una:

- ☐ a. 5 segundos.
- ☐ b. 10 segundos.
- ☐ c. 15 segundos.
- ☐ d. 20 segundos.

Retroalimentación

Epígrafe Adaptación a la vida extrauterina / Cambios cardiorrespiratorios.

La respuesta correcta es: 20 segundos.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo tiene lugar la asistencia neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Desde el nacimiento hasta el mes de vida.
- ☐ b. Desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.
- ☐ c. Desde 2 horas tras el nacimiento hasta el mes de vida.
- ☐ d. Desde 2 horas tras el nacimiento hasta los 28 días de vida.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal.

La respuesta correcta es: Desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué puntuación ha de alcanzarse en el test de Apgar para considerar normal el estado del recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 8.
- ☐ c. 9.
- ☐ d. 10.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Test de Apgar.

La respuesta correcta es: 8.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre el test de Apgar:

Seleccione una:

- ☐ a. Una puntuación de 7-10 indica un estado intensamente deprimido.
- ☐ b. Una puntuación de 4-6 indica un estado moderadamente deprimido.
- ☐ c. Una puntuación de 0-3 indica un estado satisfactorio.
- ☐ d. Cada parámetro a evaluar puede recibir 0, 1 o 2 puntos.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Test de Apgar.

La respuesta correcta es: Cada parámetro a evaluar puede recibir 0, 1 o 2 puntos.

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el valor normal del perímetro craneal en el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. 28-30 cm.
- ☐ b. 33-35 cm.

☐c. 35-38 cm.

☐d. 40-42 cm.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Periodo intrahospitalario / Valoración general.

La respuesta correcta es: 33-35 cm.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué lugar desemboca la vena cava inferior en el feto?

Seleccione una:

☐a. En la aurícula derecha.

☐b. En el conducto venoso de Arancio.

☐c. En el hígado.

☐d. En el ventrículo izquierdo.

Retroalimentación


Epígrafe Adaptación a la vida extrauterina / Cambios cardiorrespiratorios.

La respuesta correcta es: En la aurícula derecha.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tumoración vascular y granular, rosada y húmeda, que aparece al caerse el cordón se denomina:

Seleccione una:

☐a. Granuloma umbilical.

☐b. Persistencia de uraco.

☐c. Onfalitis.

☐d. Gastrosquisis.

Retroalimentación


Epígrafe Atención neonatal / Periodo intrahospitalario / Valoración general.

La respuesta correcta es: Granuloma umbilical.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se consigue un ambiente térmico neutro cuando el neonato puede mantener una temperatura corporal de:

Seleccione una:

- ☐ a. 36°C.
- ☐ b. 36,5°C.
- ☐ c. 37°C.
- ☐ d. 37,5°C.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Sala de partos / Actividades generales.

La respuesta correcta es: 36,5°C.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ictericia fisiológica:

Seleccione una:

- ☐ a. Es la que aparece en las primeras 24 horas de vida.
- ☐ b. Tiñe de amarillo la piel, pero no las mucosas.
- ☐ c. Suele durar unas 4-5 semanas.
- ☐ d. Todas son incorrectas.

Retroalimentación

Epígrafe Atención neonatal / Periodo intrahospitalario / Valoración general.

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario