



CampusVirtual



☎ Teléfono: +34 983 377 999

✉ Correo electrónico: dptosoporte@fecyl.com

Página Principal ► Mis cursos ► FC_Ginecologia_ABRIL 2018 ► Prueba de Evaluación ► Evaluación del Curso

Comenzado el domingo, 29 de abril de 2018, 19:48
Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 29 de abril de 2018, 20:52
Tiempo empleado 1 hora 4 minutos
Puntos 34,0/40,0
Calificación **8,5** de 10,0 (**85%**)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Las lesiones vulvovaginales en la edad adulta producidas por accidentes se deben principalmente a:

Seleccione una:

- a. Accidentes de tráfico. ✓
- b. Accidentes químicos.
- c. Accidentes deportivos.
- d. Accidentes aéreos.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta correcta en relación con la enfermedad de Paget en la mama:

Seleccione una:

- a. El diagnóstico de la enfermedad de Paget con frecuencia se retrasa durante meses debido a su diagnóstico equivocado con una enfermedad dermatológica benigna del pezón. ✓
- b. En un 95% de los casos la sintomatología es ulceración, prurito, eccema y dolor.
- c. No es necesario realizar un estudio de imagen de la mama.
- d. Las lesiones suelen ser bilaterales.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En la exploración de una mujer que refiere un cuerpo extraño en vagina:

Seleccione una:

- a. La especuloscopia y el tacto vaginal son de utilidad.
- b. Ambos deben realizarse con sumo cuidado para no impactar más el objeto.
- c. La especuloscopia puede realizarse pero no se recomienda un tacto vaginal.
- d. a y b son correctas. ✓

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Con respecto a la adenomiosis:

Seleccione una:

- a. Es rara su asociación con la endometriosis externa, lo que sugiere una etiología distinta.
- b. Es más frecuente a partir de la cuarta década de la vida, cursando en gran parte de los casos asintómicamente.
- c. Es la presencia de tejido endometrial dentro de la capa muscular (miometrio) del útero.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Las principales causas de las masas tubáricas son:

Seleccione una:

- a. Gestación ectópica.
- b. Absceso tuboovárico.
- c. a y b son correctas. ✓
- d. a y b son falsas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Las siguientes complicaciones pueden aparecer en un hematoma vulvar, señale la INCORRECTA:

Seleccione una:

- a. Eversión de la vagina. ✓
- b. Retención urinaria.
- c. Inestabilidad hemodinámica.
- d. Infección.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Es un criterio de malignidad en la tumoración mamaria:

Seleccione una:

- a. Consistencia dura.
- b. Bordes irregulares de la tumoración.
- c. Todas son correctas. ✓
- d. Superficie rugosa.

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Respecto a la extracción de un cuerpo extraño alojado en vagina, señale la INCORRECTA:

Seleccione una:

- a. Si la extracción no es posible en urgencias se realiza en quirófano bajo anestesia.
- b. Se comprobará posteriormente la integridad de las paredes vaginales sin la retención del objeto ha cursado con sangrado.
- c. Se deben suturar los desgarros si estuvieran presentes. **✗**
- d. Las pinzas de disección o pinzas en anillo (pinzas de Foerster) pueden ser útiles.

Pregunta **9**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

En cuanto a la actitud de la pareja de una mujer que sufre agresiones sexuales por parte de éste pueden ser:

Seleccione una:

- a. La mujer busca continuamente la aprobación de la pareja.
- b. Todas son correctas. **✓**
- c. La pareja suele mostrarse muy controladora contestando siempre ante que la mujer.
- d. La pareja suele solicitar estar presente en toda la entrevista.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Es cierto que la anticoncepción de urgencia:

Seleccione una:

- a. El objetivo es producir el aborto espontáneo.
- b. Puede usarse como método anticonceptivo habitual.
- c. Todas son falsas. ✓
- d. No puede usarse durante la lactancia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Los principales agentes causales de la EIP son:

Seleccione una:

- a. Chlamydia trachomatis y N. gonorrhoeae. ✓
- b. Streptococcus β -hemolítico y E. Coli.
- c. Mycoplasma genitalium y Klebsiella.
- d. Corynebacterium y Prevotella.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Pueden ser causa de dolor pélvico agudo:

Seleccione una:

- a. Embarazo ectópico.
- b. Todas son correctas. ✓
- c. Aborto.
- d. Torsión ovárica.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Con respecto a la enfermedad de Zuska señale la respuesta falsa:

Seleccione una:

- a. Se refiere a la enfermedad de Paget del pezón.
- b. Es una mastitis sobreinfectada, debido a la acción del alcohol que produce una metaplasia escamosa.
- c. Se trata de una mastitis crónica de mujeres jóvenes y fumadoras.
- d. a y b son falsas. ✓

Pregunta **14**

Correcta

Puntuía 1,0 sobre 1,0

Señale la opción incorrecta respecto a la marsupialización:

Seleccione una:

- a. Una cirugía mediante la cual se abre el absceso de la glándula, se drena y limpia y se suturan los bordes evertiéndolos.
- b. Es un cirugía menor ambulatoria.
- c. Una cirugía mediante la cual se realiza un masupio justo bajo la glándula de Bartholino en la cual el pus se va acumulando. ✓
- d. Una alternativa a la misma es la inserción de un catéter de Word.

Pregunta **15**

Correcta

Puntuía 1,0 sobre 1,0

Los principales agentes causales de hemorragia uterina iatrogénica son:

Seleccione una:

- a. Los corticoides.
- b. Los AINEs.
- c. Los contrastes iodados.
- d. Las hormonas esteroideas. ✓

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la INCORRECTA respecto a las hemorragias uterinas disfuncionales:

Seleccione una:

- a. Se clasifican en cíclicas y acíclicas. ✓
- b. Se puede producir por causas endocrinas como alteración del eje hipotálamo-hipofisario o también por factores uterinos locales.
- c. El tratamiento principal es hormonal.
- d. Son aquellas de origen uterino en ausencia de patología orgánica y de gestación.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En la torsión de un anejo, debemos sospechar del infarto del mismo ante:

Seleccione una:

- a. Sangrado vaginal.
- b. Pérdida de conciencia.
- c. Leucocitosis y febrícula. ✓
- d. Desaparición del dolor abdominal.

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Señale la respuesta correcta respecto al uso del DIU como anticonceptivo postcoital:

Seleccione una:

- a. Se puede insertar hasta 120 horas (5 días) después del coito y hasta el día 20 del ciclo. ✗
- b. Se puede mantener como anticoncepción a largo plazo.
- c. Tiene efecto antiimplantatorio.
- d. Todas son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

La hemorragia uterina anormal:

Seleccione una:

- a. Se clasifican en orgánicas, iatrogénicas y subclínicas.
- b. Es posible que se presente con una enfermedad sistémica acompañante que pueda ser causa de hemorragia, o que se produzca de forma coincidente con la ingesta de fármacos. ✓
- c. Todas son correctas.
- d. Se define como aquella que difiere de lo normal en cantidad o duración, ocurriendo en la época fértil de la vida de la mujer.

Pregunta **20**

Correcta

Puntuía 1,0 sobre 1,0

La exploración mamaria de una paciente debe incluir (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Inspección.
- b. Ecografía mamaria. ✓
- c. Exploración de la axila.
- d. Palpación.

Pregunta **21**

Correcta

Puntuía 1,0 sobre 1,0

Con respecto a las urgencias mamarias no puerperales, señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Los motivos de consulta más frecuentes son el dolor mamario y las tumoraciones. ✓
- b. La exploración de las mamas incluye la realización de una ecografía urgente.
- c. Suponen el 80% de las consultas en urgencias ginecológicas.
- d. Todas son falsas.

Pregunta **22**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta en relación al dolor mamario:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. El dolor mamario puede ser cíclico o acíclico.
- c. El dolor mamario frecuentemente guarda relación con el ciclo menstrual.
- d. La mastodinia o mastalgia es el síntoma más frecuentemente consultado en patología mamaria. ✘

Pregunta **23**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Es un criterio de malignidad en una tumoración mamaria:

Seleccione una:

- a. Superficie rugosa. ✔
- b. Tumoración bien delimitada.
- c. Todas son falsas.
- d. Consistencia elástica.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta correcta respecto al hematometra:

Seleccione una:

- a. Puede producirse por una malformación genital (himen imperforado, tabique vaginal transversal o agenesia vaginal). ✓
- b. Algunos de los síntomas asociados son dolor crónico y dolor suprapúbico, aunque el tacto bimanual suele ser indoloro.
- c. También se denomina hematocolpos.
- d. Consiste en la acumulación de sangre en la cavidad vaginal.

Pregunta **25**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Debe realizarse con la mano extendida, palpando toda la superficie mamaria, siguiendo la dirección de las de las agujas del reloj sin olvidar ninguna zona.
- b. Si la sintomatología que refiere la paciente es unilateral, siempre se comenzará palpando primero la mama sintomática.
- c. Todas son correctas.
- d. La palpación de la mama se realiza con la paciente en decúbito supino, los brazos flexionados y las manos detrás de la cabeza. ✗

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Ante una paciente que refiere tener un cuerpo extraño en la vagina:

Seleccione una:

- a. Debemos realizar una anamnesis completa, preguntando la presencia de síntomas como dolor, sangrado, leucorrea, clínica miccional, etc., así como el tipo de objeto y el tiempo que lleva en la vagina.
- b. El tacto vaginal y/o la especuloscopia deben ser muy cuidadosas para no impactar más el objeto.
- c. La extracción debe hacerse bajo anestesia en quirófano en caso de no ser posible en el servicio de urgencias.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Respecto al dolor mamario es cierto que:

Seleccione una:

- a. La mastodinia o mastalgia es el síntoma más frecuentemente consultado en patología mamaria. ✓
- b. La mayoría de los casos se soluciona con un sujetador apretado.
- c. El dolor mamario nunca se correlaciona con la presencia de un carcinoma.
- d. El dolor siempre es cíclico en función de su relación con el ciclo menstrual.

Pregunta **28**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Con respecto a la tumoración mamaria es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es el motivo de consulta más frecuente en mujeres mayores de 40 años. ❌
- b. No es motivo de consulta urgente, sin embargo, la alarma y angustia que generan hacen que en muchos casos sean evaluadas en los servicios de urgencia.
- c. Tras la exploración mamaria, quedará definido el diagnóstico de la lesión.
- d. a y b son correctas.

Pregunta **29**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

La evacuación quirúrgica de un hematoma vulvar se realiza si...

Seleccione una:

- a. Aumenta rápidamente de tamaño.
- b. Se detiene el aumento de tamaño con hielo local.
- c. Se asocia a inestabilidad hemodinámica.
- d. a y c son correctas. ✔️

Pregunta **30**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

¿En cuál de los siguientes fallos en la anticoncepción estaría indicada la anticoncepción de urgencia?

Seleccione una:

- a. Expulsión o retirada temporal del anillo vaginal anticonceptivo > 3 horas.
- b. Todas son correctas. ✓
- c. Despegamiento del parche anticonceptivo > 24 horas.
- d. Olvido de la anticoncepción hormonal oral > 12 horas.

Pregunta **31**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Ante una hemorragia uterina anormal las primeras medidas a llevar a cabo serán (señale la INCORRECTA):

Seleccione una:

- a. Observación de la cantidad de sangrado.
- b. Realización de b-HCG en orina o sangre. ✗
- c. Realizar un tacto vaginal.
- d. Valoración de la afectación hemodinámica de la paciente, mediante observación y toma de constantes vitales.

Pregunta **32**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Es un criterio de benignidad en una tumoración mamaria:

Seleccione una:

- a. Superficie rugosa.
- b. Bordes irregulares.
- c. Todas son falsas.
- d. Consistencia elástica. ✓

Pregunta **33**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la endometriosis:

Seleccione una:

- a. El dolor es el síntoma más común.
- b. Hasta el momento sólo se sabe que es una enfermedad estrógeno-dependiente, por lo que suele afectar a mujeres en edad fértil.
- c. Su presentación es muy variable y hay una considerable superposición de síntomas con la apendicitis. ✓
- d. La incidencia de esterilidad en mujeres con endometriosis se estima en un 30%, mientras que para la población general es del 10%.

Pregunta **34**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

El motivo de consulta urgente en mayores de 40 años en relación con la patología mamaria es:

Seleccione una:

- a. Dolor mamario.
- b. Tumoración mamaria. ✓
- c. Secreción por el pezón.
- d. Mastitis no puerperal.

Pregunta **35**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Entre las lesiones típicas de una agresión sexual nos podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Lesiones en cara interna de antebrazos (defensivas).
- b. Lesiones en genitales en distinto estadio de curación.
- c. Rotura de tímpano.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **36**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En caso de agresión sexual si la paciente no desea denunciar, el procedimiento será (señale la opción falsa):

Seleccione una:

- a. Valorar anticoncepción de emergencia y derivar al ginecólogo de modo preferente para descartar enfermedades e ITS.
- b. Realizar el parte de lesiones.
- c. Ofrecer asistencia psicológica.
- d. Se le debe persuadir a la paciente para lograr que denuncie el hecho. ✓

Pregunta **37**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En cuanto a las complicaciones del SHO es cierto que:

Seleccione una:

- a. Fracaso renal agudo.
- b. Todas con correctas. ✓
- c. TVP.
- d. Hemorragia por rotura ovárica.

Pregunta **38**

Correcta

Puntuía 1,0 sobre 1,0

La bartholinitis se define como:

Seleccione una:

- a. La inflamación y/o infección de la glándula vestibular mayor o de Bartholino. ✓
- b. La fistulización de una glándula de Bartholino con la luz de la vagina.
- c. La inflamación y/o infección de la glándula vestibular menor o de Skene.
- d. La fistulización de una glándula de Bartholino con una glándula de Skene.

Pregunta **39**

Correcta

Puntuía 1,0 sobre 1,0

Las erosiones en el cérvix se dan en:

Seleccione una:

- a. En mujeres con prolapso genital total o de V grado, debido al rozamiento del cérvix con la piel de los genitales externos y la ropa interior.
- b. En mujeres con prolapso genital total o de VI grado, debido al rozamiento del cérvix con la piel de los genitales externos y la ropa interior.
- c. En mujeres con prolapso genital total o de IV grado, debido al rozamiento del cérvix con la piel de los genitales externos y la ropa interior. ✓
- d. En mujeres con prolapso genital total o de I grado, debido al rozamiento del cérvix con la piel de los genitales externos y la ropa interior.

Pregunta **40**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Es un criterio de benignidad en una tumoración mamaria:

Seleccione una:

- a. Consistencia elástica. ✓
- b. Superficie rugosa.
- c. Bordes irregulares.
- d. Todas son falsas.

CampusVirtual



Fundación de Enfermería en Castilla y León

Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León

Info

Info Formación on-line feCyL

WEB feCyL

WEB Consejo de Enfermería CyL

Secretaría Virtual feCyL

Soporte para el CapusVirtual

Soporte correo

Contacto

C/Alcalleres, 5 - 47001-Valladolid

 Teléfono : +34 983 377 999

 Correo electrónico: dptosoporte@fecyl.com

Todos los derechos reservados © 2017 - Fundación Enfermería en Castilla y León