

<b>Comenzado el</b>	martes, 20 de julio de 2021, 17:40
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 20 de julio de 2021, 17:41
<b>Tiempo empleado</b>	42 segundos
<b>Puntos</b>	10,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>5,00</b> de 10,00 (50%)
<b>Comentario -</b>	Apto

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué concentraciones de bupivacaína son utilizadas en bolo en el trabajo de parto?

Seleccione una:

- ☐ a. 0,2-0,3%.
- ☐ b. 1-2%.
- ☐ c. 10-10,5%.
- ☐ d. 50%.

#### Retroalimentación

Epígrafe Anestésicos locales.

La respuesta correcta es: 0,2-0,3%.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el calibre habitual de la aguja para el bloqueo epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. 18G.
- ☐ b. 20G.
- ☐ c. 22G.
- ☐ d. 24G.

#### Retroalimentación

Epígrafe Diferencias epidural-subaracnoideo.

La respuesta correcta es: 18G.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En cada contracción se expulsa del útero entre 300 y 500 ml de sangre, aumentando más el gasto cardíaco y la presión arterial, todo esto potenciado por la liberación de:

Seleccione una:

- ☐ a. Catecolaminas por el dolor.
- ☐ b. Oxitocina placentaria.
- ☐ c. Noradrenalina suprarrenal.
- ☐ d. Insulina pancreática.

### Retroalimentación

Epígrafe Fisiología del dolor en el parto.

La respuesta correcta es: Catecolaminas por el dolor.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la manifestación más relevante del bloqueo autonómico tras la administración de un anestésico en el espacio epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. Vasodilatación e hipotensión.
- ☐ b. Hipotensión y escalofríos.
- ☐ c. Escalofríos y parestesias.
- ☐ d. Parestesias y vasoconstricción.

### Retroalimentación

Epígrafe Resumen.

La respuesta correcta es: Vasodilatación e hipotensión.

### Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Tras la punción lumbar para realizar un bloque central durante el parto, de producirse una punción accidental con fuga de LCR, ¿cuándo aparecería cefalea post-punción?

Seleccione una:

- ☐ a. De manera inmediata.
- ☐ b. A las 2-4 horas.
- ☐ c. A las 6-10 horas.
- ☐ d. A las 12-24 horas.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Complicaciones de los bloqueos centrales / Cefalea post-punción.

La respuesta correcta es: A las 12-24 horas.

### **Pregunta 6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Durante el trabajo de parto, el dolor:

Seleccione una:

- ☐ a. Permanece estable.
- ☐ b. Evolucionan en localización, pero no en intensidad.
- ☐ c. Evolucionan en intensidad, pero no en localización.
- ☐ d. Evolucionan en intensidad y en localización.

### **Retroalimentación**

Epígrafe El dolor en el trabajo del parto y cesárea.

La respuesta correcta es: Evolucionan en intensidad y en localización.

### **Pregunta 7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuándo desaparecen los temblores secundarios a la epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. Espontáneamente a los 40-50 minutos.
- ☐ b. Al retirar la anestesia epidural.
- ☐ c. Solo desaparecen si se tratan con anticolinérgicos.
- ☐ d. Al administrar naloxona.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Complicaciones de los bloqueos centrales / Temblores.

La respuesta correcta es: Espontáneamente a los 40-50 minutos.

### **Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

El dolor en el parto puede causar una hiperventilación, que produce en primer lugar:

Seleccione una:

- ☐ a. Una acidosis metabólica.

- ☐ Ob. Una acidosis respiratoria.
- ☐ Oc. Una alcalosis metabólica.
- ☐ Od. Una alcalosis respiratoria.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Fisiología del dolor en el parto.

La respuesta correcta es: Una alcalosis respiratoria.

### **Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Tras la realización del bloqueo se deben seguir unas medidas de vigilancia, señala cuál de las siguientes forma parte de estas medidas:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Monitorización cardiotocográfica fetal.
- ☐ Ob. Vigilancia de las constantes maternas con control de la tensión arterial cada 15 minutos la primera hora.
- ☐ Oc. Realizar un electrocardiograma a la mujer.
- ☐ Od. Todas son correctas.

### **Retroalimentación**


Epígrafe Técnica del bloqueo central.

La respuesta correcta es: Monitorización cardiotocográfica fetal.

### **Pregunta 10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Las madres que reciben preparación al parto tienen hasta un:

Seleccione una:

- ☐ Oa. 10% menos de dolor.
- ☐ Ob. 10% más de dolor.
- ☐ Oc. 30% menos de dolor.
- ☐ Od. 30% más de dolor.

### **Retroalimentación**

Epígrafe El dolor en el trabajo del parto y cesárea.

La respuesta correcta es: 30% menos de dolor.

### **Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes complicaciones de los bloqueos centrales es más habitual?

Seleccione una:

- ☐ a. Fallo de la analgesia.
- ☐ b. Hipotensión arterial.
- ☐ c. Punción húmeda.
- ☐ d. Paso del anestésico al torrente sanguíneo.

### Retroalimentación

Epígrafe Complicaciones de los bloqueos centrales / Fallo de la analgesia.

La respuesta correcta es: Fallo de la analgesia.

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Las fibras nerviosas que conducen la sensibilidad dolorosa y térmica son:

Seleccione una:

- ☐ a. Delgadas y poco mielinizadas.
- ☐ b. Delgadas y abundantemente mielinizadas.
- ☐ c. Gruesas y poco mielinizadas.
- ☐ d. Gruesas y abundantemente mielinizadas.

### Retroalimentación

Epígrafe Fisiología del bloqueo central.

La respuesta correcta es: Delgadas y poco mielinizadas.

### Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En un bloqueo extenso tras un bloqueo central, ¿qué cabe esperar?

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión severa.
- ☐ b. Bradicardia.
- ☐ c. Hipoventilación.
- ☐ d. Todas son correctas.

### Retroalimentación

Epígrafe Complicaciones de los bloqueos centrales / Bloqueo extenso.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

### Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo?

Seleccione una:

- ☐ a. Entre la duramadre y la aracnoides, en el espacio subaracnoideo.
- ☐ b. Entre la duramadre y la aracnoides, en el espacio subdural.
- ☐ c. Entre la aracnoides y la piamadre, en el espacio subaracnoideo.
- ☐ d. Entre la aracnoides y la piamadre, en el espacio subdural.

#### Retroalimentación

Epígrafe Consideraciones anatómicas.

La respuesta correcta es: Entre la aracnoides y la piamadre, en el espacio subaracnoideo.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El dolor materno en el parto:

Seleccione una:

- ☐ a. No influye en el pH fetal.
- ☐ b. Puede producir un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo y ocasionar acidosis fetal.
- ☐ c. Puede producir una depresión de la actividad del sistema nervioso autónomo y ocasionar acidosis fetal.
- ☐ d. Actúa directamente sobre la liberación de la gastrina, inhibiéndola, y provocando una acidosis fetal.

#### Retroalimentación

Epígrafe Fisiología del dolor en el parto.

La respuesta correcta es: Puede producir un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo y ocasionar acidosis fetal.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta sobre los factores que influyen en la percepción del dolor de parto por parte de la parturienta:

Seleccione una:

- ☐ a. Las parturientas de mayor edad suelen sentir más dolor que las jóvenes
- ☐ b. Las multíparas sienten menos dolor durante el trabajo de parto.
- ☐ c. Las presentaciones distócicas se asocian con un aumento del dolor del trabajo de parto.
- ☐ d. La desproporción entre el tamaño del feto y de la pelvis materna se relaciona con un mayor dolor.

### Retroalimentación

Epígrafe El dolor en el trabajo del parto y cesárea.

La respuesta correcta es: Las parturientas de mayor edad suelen sentir más dolor que las jóvenes

### Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la aguja más utilizada para realizar el bloqueo epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. La de Gauge.
- ☐ b. La de Whitacre.
- ☐ c. La de Quincke.
- ☐ d. La de Tuohy.

### Retroalimentación

Epígrafe Diferencias epidural-subaracnoideo. Epígrafe Técnica del bloqueo central.

La respuesta correcta es: La de Tuohy.

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué fármaco se utiliza en el tratamiento de la hipotensión secundaria al bloqueo central?

Seleccione una:

- ☐ a. Efedrina.
- ☐ b. Atropina.
- ☐ c. Tractocile.
- ☐ d. Sulfato de magnesio.

### Retroalimentación

Epígrafe Complicaciones de los bloqueos centrales / Hipotensión.

La respuesta correcta es: Efedrina.

### **Pregunta 19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

La mejor analgesia en una fase de dilatación muy avanzada y un expulsivo inminente es:

Seleccione una:

- ☐ a. El acceso es independiente, únicamente dependerá del anestésico utilizado.
- ☐ b. El bloqueo subaracnoideo.
- ☐ c. El bloqueo epidural en bolo.
- ☐ d. El bloqueo epidural en perfusión continua.

#### **Retroalimentación**

Epígrafe Diferencias epidural-subaracnoideo.

La respuesta correcta es: El bloqueo subaracnoideo.

### **Pregunta 20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál de las siguientes forma parte de las medidas previas al bloqueo central?

Seleccione una:

- ☐ a. Monitorizar las constantes de la gestante y del feto.
- ☐ b. Comprobar la disponibilidad y funcionamiento del material de reanimación cardiopulmonar.
- ☐ c. Canalizar una vía venosa periférica con una cánula del 18G o mayor y que funcione sin problemas.
- ☐ d. Todas son correctas.

#### **Retroalimentación**

Epígrafe Técnica del bloqueo central.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

[Finalizar revisión](#)