

Qualificació 8,33 sobre 10,00 (83%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Assenyala les afirmacions correctes respecte a la infusió contínua subcutània. (Es permet més d'una resposta)

a.

És millor per a tractament prolongats.

Resposta correcta. La infusió contínua permet una concentració uniforme del fàrmac en plasma.

b.

Presenta una major necessitat de manipulació

c.

Permet administrar preparats de diversos fàrmacs simultàniament.

Resposta correcta.

d.

Possibilita l'administració de volums alts.

Resposta correcta.

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

En el cas d' un pacient afectat d'esclerosi lateral amiotròfica, amb disnea refractària, indica l'afirmació correcta:

a.

No es pot iniciar una sedació pal·liativa en no disposar de via endovenosa

b.

No es precisa del consens de l'equip per iniciar una sedació pal·liativa

c.

Afegir clorur mòrfic per fins a disminuir el nivell de consciència

d.

Després de l'obtenció del consentiment informat, de manera consensuada amb el seu equip habitual, s'afegeix tractament amb midazolam a dosis baixes per anar titulant, fins a obtenir el control de símptomes

Resposta correcta.

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Text de la pregunta

Un pacient amb una neoplàsia gàstrica metastàtica en suport i en tractament amb 30 mg de morfina d'alliberament sostingut cada 12 hores consulta per una crisi de dolor amb EVA de 8/10 amb important component emocional associat. Quina pauta de tractament li sembla més adequada?

- a. 5 mg de morfina d'alliberament normal (o ràpida) per via oral
- b. 10 mg de clorur mòrfic per via intravenosa
- c. 5 mg de clorur mòrfic per via intravenosa

Resposta correcta. La via intravenosa és la via d' elecció. Les dosis corresponen a 1/6 de la DEMD convertida a via intravenosa dividint entre 3

- d. Diazepam 5 mg sublingual i valorar resposta abans d' administrar un opioide

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **4**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Text de la pregunta

La disnea en un pacient a SUD és un símptoma que genera molta preocupació a la família. Per aquest motiu davant la presència de taquipnea i hipoxèmia és oportú:

- a. S'ha de posar ulleres nasals per a aportació d' oxigen i iniciar perfusió contínua de morfina.
- b. S'ha de fer una prova per descartar un tromboembolisme pulmonar.
- c. Preguntar al pacient si presenta disnea, en cas de resposta afirmativa intentar tractament causal adequat al nivell d' intervenció +/- oxigen per ulleres nasals i morfina a dosi 2.5mg si disnea.

Resposta correcta. S' han d' orientar els tractaments al confort del pacient, no a la preocupació de la família o dels professionals per paràmetres anormals en l' exploració física.

- d. Iniciar opioide, d'elecció la morfina a dosis de 2.5mg si disnea.

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Davant l'alta necessitat d'atenció que sorgeix a la SUD cal complir els següents objectius, EXCEPTE:

a.

Realitzar un pla terapèutic oportú a la situació del pacient, aconsellant el més oportú segons la causa desencadenant del deteriorament. Evitant des del punt de vista clínic deixar-se influenciar per les preferències del pacient i família.

Resposta correcta. Aquesta afirmació és errònia atès que la base fonamental de la realització del pla terapèutic és la planificació compartida de cures entre pacient/família i equip professional.

b.

Prevenir les crisis, sent molt probable que es presentin crisis de diferents símptomes és oportú identificar els riscos i planejar una actuació davant la presència.

c.

Identificar les preferències de l'atenció del pacient, la necessitat d'informació, així com el seu llindar d'assimilació d'aquesta, per parlar obertament davant la situació i planificar les cures.

d.

Promoure el confort, afavorint un adequat control de símptomes físics i un acompanyament i tractaments de símptomes emocionals.

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Assenyala l'etiologia més freqüent en casos de sedació pal·liativa

a.

Dolor

Resposta incorrecta.

b.

Delirium

c.

Malestar emocional

d.

Disnea

Retroacció

Respuesta incorrecta.

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Dels següents símptomes i signes, quins NO són habituals en un pacient en situació d'últims dies.

a.

Delirium hiperactiu, crisi de dolor, labilitat emocional, patiment existencial.

b.

Hiporèxia, disfàgia per a líquids, somnolència, astènia.

c.

Augment de pes i d'apetit, poliúria.

Resposta correcta. Aquests símptomes no son habituals en un pacient a SUD.

d.

Estertors, edemes, crisis de disnea, polsos febles, pal·lidesa mucocutània.

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **8**

Parcialment correcte

Puntuació 0,33 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Assenyala les afirmacions que consideris correctes en relació amb el pacient en situació de malaltia avançada i/o al final de la vida.

a.

La sedació pal·liativa no s'indica habitualment a urgències

b.

En cas de disnea seria suficient amb augmentar la dosi de morfina subcutània

Resposta incorrecta. S'hauria de mantenir la dosi de morfina i afegir midazolam.

c.

En cas de delirium el fàrmac a emprar és la levomepromacina

Resposta correcta

d.

En cas de disnea el fàrmac a emprar és el midazolam

Retroacció

Respuesta parcialmente correcta.

Heu seleccionat correctament 1.

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Assenyali la resposta correcta, quan el pacient necessiti substitució del catèter subcutani...

a.

L'aparició de dolor en el punt d' inserció és l' únic motiu de recanvi de via subcutània.

b.

No es tornarà a col·locar a la mateixa zona.

Resposta correcta. Es recomana rotar la zona de punció seguint el sentit de les agulles del rellotge per evitar lipodistròfies del teixit cel·lular subcutani.

c.

El catèter subcutani és un dispositiu permanent, no és necessària la seva substitució.

d.

S'haurà d'acudir a l'hospital o centre de salut.

Retroacció

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Respecte a les crisis de dolor que s'atenen a urgències, assenyala la correcta:

a.

Una complicació de la malaltia oncològica com una fractura o una perforació de víscera hui pot ser motiu de consulta per crisi de dolor

Resposta correcta. És una de les causes que justifica la realització d' exploracions complementàries

b.

El dolor irruptiu oncològic és una exacerbació del dolor sense dolor basal.

c.

La majoria de pacients precisen d'exploracions complementàries per millorar la precisió diagnòstica al final de la vida

d.

L'exacerbació de dolor només respon a canvis en l'estat físic del pacient

Retroacció

Respuesta correcta