

Supuesto practico 2

¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes para realizar una cesárea en vez de por vía natural? Cítame los tipos de anestesia.

La decisión de realizar una cesárea puede darse por multitud de indicaciones, las distinguiré según el momento de la toma de la decisión, es decir, indicaciones para realizar la cesárea antes del inicio del parto, indicaciones que llevan a tomar la decisión durante el trabajo de parto y las indicaciones urgentes.

Las indicaciones que llevan a realizar una cesárea antes del momento del parto o a su inicio pueden ser tanto por motivos maternos como fetales.

Las indicaciones maternas son: mujeres con dos o más cesáreas previas, cirugía previa sobre el musculo uterino, una cesaría previa y persiste la casusa por la que se indicó, como por ejemplo una deformidad de la pelvis, enfermedad materna grave (cáncer, cardiopatías, etc.), fístulas urinarias o intestinales graves, cáncer del cuello del útero, estrechez pélvica importante y evidente desproporción entre el tamaño de la pelvis y el tamaño del feto (cefalo-pélvica).

Las indicaciones fetales son: gestación múltiple, malformación del feto que dificulta el trabajo de parto, placenta previa oclusiva total, situación transversa u oblicua, feto de nalgas y/o prevención de infección fetal por infección del canal de parto (VIH, herpes, condilomas, etc.).

Tomar la decisión de realizar una cesárea puede darse también por indicaciones durante el trabajo de parto una vez se haya alcanzado una dilatación concreta con bolsa rota y al menos dos horas de contracciones uterinas adecuadas, estas indicaciones son: cabeza del bebé demasiado grande para pasar a través del canal del parto normal, la posición del bebe impide el paso normal por el útero, sufrimiento fetal, dilatación del útero insuficiente, no existe progresión del parto, placenta desprendida, cesáreas anteriores, que la madre tenga en el momento del parto un herpes genital, tumores en el canal del parto, nudos o vueltas en el cordón umbilical que puedan rodear el cuello del niño, embarazo múltiple y/o enfermedades maternas.

Por último, puede darse la situación de realizar una cesárea de urgencia donde no puede haber retraso entre la decisión de cesárea y su realización. Se realizará en caso de prolapso del cordón umbilical, desprendimiento prematuro de la placenta, sospecha de sufrimiento fetal, placenta previa con abundante sangrado y/o sospecha de rotura uterina.

La anestesia es el uso de medicamentos que se utilizan para evitar la sensación de dolor durante una cirugía o un procedimiento doloroso, en este caso, el parto. Existen distintos tipos de anestesia, pero todos tienen como finalidad bloquear los impulsos nerviosos y, por tanto, el dolor. A continuación citaremos los distintos tipos de anestesia que puede utilizarse en el mismo: anestesia epidural, raquídea, general o local.