

Tema 4. Atención enfermera del recién nacido en riesgo

Dentro de los cuidados enfermeros, el masaje vesical tiene como objetivo:

Seleccione una:

- ☐ a. Conseguir la incontinencia entre dos vaciamientos vesicales
- ☐ b. Aumentar la fuerza y el tono muscular del suelo pélvico
- ☒ **c. Conseguir el vaciamiento más completo de la vejiga ✓**
- ☐ d. Ninguna es correcta

Para realizar un lavado vesical, el líquido que se utiliza es:

Seleccione una:

- ☒ **a. Suero fisiológico al 0'9% ✓**
- ☐ b. Dextrosa al 5%
- ☐ c. Agua
- ☐ d. Ringer lactato

¿Qué se debe sospechar ante un filtrado con sangre fresca?

Seleccione una:

- ☐ a. Herniación
- ☒ **b. Hemoperitoneo ✓**
- ☐ c. Neumoperitoneo
- ☐ d. Hiperglucemia

Cuando la vejiga es irrigada de forma manual a través de la sonda vesical conectada a una jeringa cargada con suero fisiológico, estamos hablando de:

Seleccione una:

- ☒ **a. Lavado vesical intermitente (sistema de irrigación abierto) ✓**
- ☐ b. Lavado vesical intermitente (sistema de irrigación cerrado)
- ☐ c. Lavado vesical continuo (sistema de irrigación cerrado)
- ☐ d. Ninguna es correcta

¿Cómo se denominan los dispositivos de recogida que poseen un clip de seguridad en el cierre de la anilla?

Seleccione una:

- ☐ a. Convexos
- ☒ **b. De tres piezas ✓**
- ☐ c. De dos piezas
- ☐ d. Abiertos

De las siguientes características, ¿cuál corresponde a una colostomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Ostomía protuída
- ☐ b. Flujo líquido o semi-líquido
- ☐ c. Intestino delgado
- ☒ **d. Flujo pastoso o semi-sólido ✓**

El lavado gástrico está indicado en los siguientes casos:

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragias digestivas altas
- ☐ b. Eliminación de sustancias tóxicas
- ☐ c. Análisis de muestras estomacales
- ☒ **d. Todos son ciertos ✓**

De las siguientes complicaciones, ¿cuáles se caracterizan por ser inmediatas en las ostomías intestinales?

Seleccione una:

- ☐ a. Estenosis
- ☐ b. Dermatitis
- ☒ **c. Dehiscencia ✓**
- ☐ d. Retracción

¿Qué signos nos alertarán de una posible infección urinaria?

Seleccione una:

- ☐ a. Excesivo movimiento del neonato
- ☐ b. Fiebre y dolor en el flanco suprapúbico
- ☐ c. Orina turbia y maloliente
- ☒ **d. B y c son correctas ✓**

Las válvulas intracraneales son:

Seleccione una:

- ☐ a. Válvulas bidireccionales para drenar LCR ✗
- ☒ **b. Pueden ser ventrículo peritoneales**
- ☐ c. Sólo pueden drenar a un reservorio externo
- ☐ d. Tratamiento de primera elección para disminuir la PIC

En un niño con derivación ventricular, ¿qué tipo de infección se puede producir?

Seleccione una:

- ☐ a. Meningitis
- ☐ b. Peritonitis
- ☐ c. En zona de inserción de la válvula
- ☒ **d. Todas son ciertas ✓**

Contraindicaciones de la diálisis peritoneal:

Seleccione una:

- ☐ a. Neonato en cuidados intensivos
- ☐ b. Insuficiencia respiratoria
- ☐ c. Cirugía abdominal
- ☒ **d. B y c son correctas ✓**

Se denomina colostomía ascendente:

Seleccione una:

- ☒ **a. Ostomía en la parte derecha del abdomen ✓**
- ☐ b. Ostomía en la parte izquierda
- ☐ c. Ostomía indistintamente en la parte derecha o izquierda
- ☐ d. Ninguna es correcta

¿Qué comprobaría para detectar que una sonda gástrica se encuentra en el lugar deseado?

Seleccione una:

- ☐ a. Obtención de contenido gástrico por aspiración con una jeringa
- ☐ b. Ausencia de reflujo gástrico espontáneo
- ☐ c. Ruido característico detectable por colocación de fonendoscopio en epigastrio e introducción de aire en embolado
- ☒ **d. A y c son correctas ✓**

Para la colocación de una SNG/SOG, ¿cómo colocaríamos al neonato?

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito prono
- ☐ b. En Trendelenburg
- ☒ **c. Decúbito supino semiincorporado ✓**
- ☐ d. Decúbito lateral

Antes de iniciar la diálisis peritoneal se debe:

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer un pase corto para verificar que no hay hemorragias
- ☒ **b. Verificar la localización del catéter por medio de una radiografía ✓**
- ☐ c. Insuflar aire por el catéter mientras se ausculta la cavidad peritoneal
- ☐ d. Intubar al neonato

Son cuidados enfermeros ante neonatos con SV:

Seleccione una:

- ☒ **a. Higiene estricta al manipular sistemas urinarios ✓**
- ☐ b. Reintroducir la misma sonda si se ha salido
- ☐ c. Si rebosa orina por meato es que ya se puede retirar la sonda
- ☐ d. Una vez retirada la sonda, ya tiene un buen patrón eliminación urinaria

Si se desconecta el sistema de drenaje torácico:

Seleccione una:

- ☐ a. Lo primero avisar al pediatra
- ☒ **b. Pinzaremos el catéter lo más cerca del tórax posible ✓**
- ☐ c. Ejerceremos oclusión en el punto de punción
- ☐ d. Cerraremos el sistema de drenaje

¿En qué posición colocaremos al neonato al realizar diálisis peritoneal?

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito prono
- ☐ b. Decúbito lateral derecho
- ☐ c. En trendelenburg
- ☒ **d. En antitrendelenburg ✓**

Si con un catéter torácico el niño empeora con edema y secreción en el punto de punción, sospechamos:

Seleccione una:

- ☐ a. Se ha salido el catéter **X**
- ☒ **b. Posible infección**
- ☐ c. El aspirador no funciona
- ☐ d. Administrar analgesia

Complicaciones de la punción torácica:

Seleccione una:

- ☐ a. Neumotórax **X**
- ☐ b. Hemotórax
- ☐ c. Edema pulmonar
- ☒ **d. Todas son ciertas**

El sondaje vesical:

Seleccione una:

- ☐ a. No produce infección
- ☐ b. Permite la micción espontánea **X**
- ☐ c. Es una técnica de E de primera elección si el paciente no puede orinar
- ☒ **d. Todas son falsas**

El sondaje rectal está indicado en los siguientes casos:

Seleccione una:

- ☐ a. Alivio de la distensión abdominal
- ☐ b. Obstrucción del intestino grueso
- ☐ c. Administración de enemas
- ☒ **d. A y c son correctas** ✓

¿Qué información nos aporta la localización de un drenaje quirúrgico?

Seleccione una:

- ☐ a. La zona de intervención
- ☒ **b. El tipo de sustancia que va a drenar y sus características** ✓
- ☐ c. El tiempo de cicatrización de la sutura quirúrgica
- ☐ d. Los parámetros a monitorizar en el postoperatorio

Indicaciones de la diálisis peritoneal:

Seleccione una:

- ☐ a. Insuficiencia renal
- ☐ b. Sobrecarga de volumen
- ☐ c. Alteraciones electrolíticas
- ☒ **d. Todas son correctas ✓**

Si un niño que lleva una derivación ventricular, se encuentra aletargado, irritable, con vómitos y depresión en la fontanela, sospecharemos:

Seleccione una:

- ☒ **a. De una disminución rápida de LCR ✓**
- ☐ b. No funciona el drenaje
- ☐ c. Infección
- ☐ d. Ninguna es cierta

El drenaje gástrico está contraindicado en:

Seleccione una:

- ☐ a. Enterocolitis necrotizante
- ☐ b. Obstrucción intestinal
- ☒ **c. Estenosis y atresia esofágica ✓**
- ☐ d. Hemorragia gastrointestinal

¿Qué controles son básicos en la diálisis peritoneal?

Seleccione una:

- ☐ a. El peso del neonato
- ☐ b. El balance de líquidos
- ☐ c. La glucemia
- ☒ **d. Todas son correctas ✓**

La posición que debemos poner al neonato para el sondaje vesical se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Posición de Sims
- ☐ b. Decúbito lateral derecho
- ☐ c. Fowler completo
- ☒ **d. Decúbito supino ✓**

Para realizar un sondaje gástrico se necesita:

Seleccione una:

- ☐ a. Guantes no estériles
- ☐ b. Lubricante hidrosoluble
- ☐ c. Jeringas de 2, 5 ó 10 ml
- ☒ d. Todos ✓