

**Pregunta 1**

No es un cuidado post-parada:

- ☒ d. Retirar capnografía. ✓

**Pregunta 2**

En el test de APGAR la puntuación mínima será:

- ☒ a. 0. ✓

**Pregunta 3**

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte subita, implica:

- ☒ a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓

**Pregunta 4**

En RCP-A ¿A partir de que descarga se administra la Amiodarona?

- ☒ c. 3. ✓

**Pregunta 5**

En RCP pediátrica la relación compresiones torácicas - ventilaciones es

- ☒ c. 15:2 ✓

**Pregunta 6**

Los valores normales de Frecuencia Cardíaca (FC) de un recién nacido de entre 3 a 4 Kg de peso, son:

- ☒ c. 120-180 lpm. ✓

**Pregunta 7**

Puede un desfibrilador semiautomático tipo DESA/DEA causar daño a un paciente:

- ☒ b. No, sólo descargará energía si el paciente en PCR tiene el ritmo adecuado. ✓

**Pregunta 8**

Cual es el valor de APGAR del niño sano:

- ☒ a. Entre 7 a 10. ✓

**Pregunta 9**

Correcta

A que potencia se dan las descargas en un desfibrilador manual monofásico en caso de PCR por TVSP y/o FV:

- ☒ a. 360 julios. ✓

**Pregunta 10**

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el aviso:

- ☒ a. Informar al centro coordinador o central. ✓

**Pregunta 11**

En qué momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:

- ☒ c. Tras la 3ª descarga. ✓

**Pregunta 12**

Cual es el tiempo máximo en el que debe poder llegar un paciente al hospital, para poder considerarlo donante, desde que se inició la PCR:

☒ c. 120 minutos. ✓

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde la de la piscina, antes de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):

☒ b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓

#### Pregunta 14

Los valores normales de Frecuencia Respiratoria (FR) de un niño de 3 a 6 años son:

☒ b. 15-20 rpm. ✓

#### Pregunta 15

Marcar pregunta

El gasping es:

☒ b. Respiraciones agónicas. ✓

#### Pregunta 16

No se considera donación en asistolia controlada:

☒ c. Pacientes con resucitación extrahospitalaria infructuosa. ✓

#### Pregunta 17

La relación de compresiones torácicas -ventilaciones en una RCP de adulto, es:

Seleccione una:

☒ a. 30:2. ✓

#### Pregunta 18

Las cinco "H" que definen las PCR reversibles son:

☒ c. 1)Hipovolemia 2)Hipoxia 3)Hidrogeniones (acidosis) 4)Hipo e Hiper potasemia 5)Hipotermia. ✓

#### Pregunta 19

Una vez aislada la vía aérea en una RCP-A cual es la relación compresiones torácicas - ventilaciones a seguir:

Seleccione una:

☐ a. 30:2.

☐ b. 15:2.

☐ c. Una vez aislada la vía aérea la relación de masajes torácicos y insuflaciones boca a boca son 30:1.

☒ d. Una vez aislada la vía aérea se procurarán 100 compresiones torácicas sin pausa o interrupción. ✓

#### Pregunta 20

En el caso de que aparezcan signos evidentes de isquemia en el ECG de un paciente en fase post-parada, deberemos:

☒ b. Hacer una angiografía coronaria urgente. ✓