

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que no haremos ante una PCR intrahospitalaria:

Seleccione una:

- a. Llamar al equipo de reanimación/parada.
- b. Iniciar RCP cuanto antes.
- c. Buscar un DESA/DEA o desfibrilador manual y un carro de parada.
- d. Llamar al 112. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP-A ¿A partir de que descarga se administra la Amiodarona?

Seleccione una:

- a. 15.
- b. 30.
- c. 3. ✓
- d. 5.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el test de APGAR la puntuación mínima será:

Seleccione una:

a. 0. ✓

b. 3 como en la escala de coma de glasgow, no puede existir la puntuación 0.

c. 2.

d. 1.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la primera opción de permeabilidad de vía aerea en RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

a. La Frova.

b. Canula orofaríngea.

c. La maniobra frente-menton. ✗

d. El combitube.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una vez aislada la vía aérea en una RCP-A cual es la relación compresiones torácicas - ventilaciones a seguir:

Seleccione una:

a. 30:2.

b. 15:2.

c. Una vez aislada la vía aérea la relación de masajes torácicos y insuflaciones boca a boca son 30:1.

d. Una vez aislada la vía aérea se procurarán 100 compresiones torácicas sin pausa o interrupción. ✓

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?

Seleccione una:

- a. De 1 a 2 minutos.
- b. De 3 a 5 minutos. ✓
- c. Cada 10 minutos.
- d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Sistólica (TAS) de un niño recién nacido medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- a. 50-75 mmHg. ✓
- b. 60-80 mmHg.
- c. 120 mmHg.
- d. 40-50 mmHg.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A que potencia se dan las descargas en un desfibrilador manual monofásico en caso de PCR por TVSP y/o FV:

Seleccione una:

- a. 360 julios. ✓
- b. 120 julios.
- c. 150 julios.

d. 200 julios.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante una OVACE, indica lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Animaremos a toser, cuando la tos no sea efectiva, daremos 5 golpes interescapulares y de no desobstruirse, en el suelo, realizaremos 5 compresiones abdominales tipo Heimlich. ✓
- b. Iniciar RCP directamente si queda inconsciente en el suelo.
- c. No dar golpes interescapulares si la tos es efectiva.
- d. Ante tos no efectiva, paciente consciente y colaborador, tras los 5 golpes interescapulares, realizar maniobra de heimlich.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al mejor indicador de la eficiencia de la RCP-A es:

Seleccione una:

- a. La capnometría/capnografía. ✓
- b. La pulsioximetría.
- c. Un electrocardiograma.
- d. Una gasometria arterial basal.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:

Seleccione una:

- a. Tras la 2ª descarga.
- b. Tras la 3ª adrenalina.
- c. Tras la 3ª descarga. ✓
- d. Tras la 4ª descarga con desfibriladores monofásicos y la 5ª en bifásicos.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde de la de la piscina, antes de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):

Seleccione una:

- a. Llamar al socorrista acuático.
- b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓
- c. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, deteniendo si es preciso la RCP básica.
- d. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, SIN detener la RCP básica.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "T" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- a. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Pulmonar 5)Trombosis Coronaria. ✓
- b. 1)HemoneumoTórax abierto 2)Talasemia 3)Tóxicos 4)Trauma 5)Torniquete.
- c. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Venosa Profunda 5)Trombosis Coronaria.
- d. 1)Timo 2)Talamo 3)Tiroides 4)Talio 5)Temperatura

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la dosis de Amioradona que se administra tras la 5ª descarga en PCR-A:

Seleccione una:

- a. 300 mg.
- b. 120 mg.
- c. 150 mg. ✓
- d. 200 mg.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el ciclo correcto de desfibrilación con un equipo bifásico en caso de PCR desfibrilable:

Seleccione una:

- a. Entre 150-360 julios la primera y las sucesivas entre 120-200 julios.
- b. Entre 120-200 julios la primera y las sucesivas entre 150-360 julios. ✓
- c. 360 julios.
- d. 200 julios.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No se considera donación en asistolia controlada:

Seleccione una:

- a. Pacientes a la espera del paro cardiaco.
- b. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica en hospital.
- c. Pacientes con resucitación extrahospitalaria infructuosa. ✓
- d. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica antes de quirófano.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "H" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- a. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hiperpotasemia.
- b. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hipertermia.
- c. 1)Hipovolemia 2)Hipoxia 3)Hidrogeniones (acidosis) 4)Hipo e Hiper potasemia 5)Hipotermia. ✓
- d. Son sólo 4 "H": 1)Hipotermia 2)Hipotiroidismo 3)Hipopotasemia 4)Hiperpotasemia.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es efectivo realizar compresiones toracicas sin ventilaciones en RCP básica de personal NO sanitario

Seleccione una:

- a. Si. ✓
- b. No.
- c. Sin ventilaciones no es efectiva la RCP.
- d. Insuflar es más importante que el "masaje" cardiaco.

Pregunta 19

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:

Seleccione una:

- a. Ecografía. ✗

- b. Compresor torácico mecánico.
- c. RCP-ECMO Extracorporea.
- d. Hipertermia controlada.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Cardiana (FC) de un recién nacido de entre 3 a 4 Kg de peso, son:

Seleccione una:

- a. 100 lpm.
- b. 80-120 lpm.
- c. 120-180 lpm. ✓
- d. 100-200 lpm.