

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde la de la piscina, antes de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):

Seleccione una:



a. Llamar al socorrista acuático.



b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓



c. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, deteniendo si es preciso la RCP básica.



d. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, SIN detener la RCP básica.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Respiratoria (FR) de un niño de 3 a 6 años son:

Seleccione una:



a. 15-30 rpm.



b. 15-20 rpm. ✓



c. 20-30 rpm.



d. 10-15 rpm.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el tiempo máximo en el que debe poder llegar un paciente al hospital, para poder considerarlo donante, desde que se inicio la PCR:

Seleccione una:



a. 60 minutos.

- ☐ b. 240 minutos.
- ☒ c. 120 minutos. ✓
- ☐ d. De 100 a 120 minutos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP-A ¿A partir de que descarga se administra la Amiodarona?
Seleccione una:

- ☐ a. 15.
- ☐ b. 30.
- ☒ c. 3. ✓
- ☐ d. 5.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un cuidado post-parada:
Seleccione una:

- ☐ a. Vía aérea avanzada.
- ☐ b. Control de temperatura.
- ☐ c. Mantener oxigenación.
- ☒ d. Retirar capnografía. ✓

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte subita, implica:
Seleccione una:



a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓



b. Posible donación en asistolia controlada.



c. Una PCR refractaria que precisara E-RPC (ECMO).



d. Posible donante, sólo si porta el carné que lo identifique como tal.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?

Seleccione una:



a. De 1 a 2 minutos.



b. De 3 a 5 minutos. ✓



c. Cada 10 minutos.



d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "H" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:



a. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hiperpotasemia.



b. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hipertermia.



c. 1)Hipovolemia 2)Hipoxia 3)Hidrogeniones (acidosis) 4)Hipo e Hiper potasemia 5)Hipotermia. ✓



d. Son sólo 4 "H": 1)Hipotermia 2)Hipotiroidismo 3)Hipopotasemia 4)Hiperpotasemia.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:
Seleccione una:

- ☒ a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. ✓
- ☐ b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.
- ☐ c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.
- ☐ d. El golpe precordial.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de que aparezcan signos evidentes de isquemia en el ECG de un paciente en fase post-parada, deberemos:
Seleccione una:

- ☐ a. Ignorarlos, es secundario a la RCP.
- ☒ b. Hacer una angiografía coronaria urgente. ✓
- ☐ c. Inducir una hipotermia severa.
- ☐ d. Tratar las tiritonas que causan los cambios en el ECG.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el valor de APGAR del niño sano:
Seleccione una:

- ☒ a. Entre 7 a 10. ✓
- ☐ b. De 3 a 5.
- ☐ c. De 10 a 12.
- ☐ d. 8.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el aviso:
Seleccione una:

- ☒ a. Informar al centro coordinador o central. ✓
- ☐ b. Pedir un DESA/DEA.
- ☐ c. Solicitar servicio de bomberos de apoyo.
- ☐ d. Llamar al 061.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La relación de compresiones torácicas -ventilaciones en una RCP de adulto, es:
Seleccione una:

- ☒ a. 30:2. ✓
- ☐ b. 15:1.
- ☐ c. 15:2.
- ☐ d. 30:1.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Cardiana (FC) de un recién nacido de entre 3 a 4 Kg de peso, son:
Seleccione una:

- ☐ a. 100 lpm.
- ☐ b. 80-120 lpm.
- ☒ c. 120-180 lpm. ✓
- ☐ d. 100-200 lpm.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una vez aislada la vía aérea en una RCP-A cual es la relación compresiones torácicas - ventilaciones a seguir:

Seleccione una:

- ☐ a. 30:2.
- ☐ b. 15:2.
- ☐ c. Una vez aislada la vía aérea la relación de masajes torácicos y insuflaciones boca a boca son 30:1.
- ☒ d. Una vez aislada la vía aérea se procurarán 100 compresiones torácicas sin pausa o interrupción. ✓

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño con un macarrón, alimento hueco o que presenta un espacio abierto o hueco en su centro, se consideran:

Seleccione una:

- ☐ a. Una OVACE especialmente sencilla de resolver, ya que por ese hueco circulará el aire de reserva de pulmones y abdomen, y tanto la tos, como los golpes interescapulares, las maniobras de heimlich y las compresiones torácicas serán más efectivas para movilizar el cuerpo extraño gracias al efecto venturi, además de permitir el paso de aire y una mejor ventilación del paciente durante todo el episodio.
- ☒ b. Una OVACE normal. ✓
- ☐ c. Una OVACE especialmente compleja, ya que por ese hueco circulará el aire de reserva de pulmones y abdomen, y tanto la tos, como los golpes interescapulares, las maniobras de heimlich y las compresiones torácicas serán menos efectivas para movilizar el cuerpo extraño.
- ☐ d. No se considera OVACE, aunque genere los mismos signos y síntomas, se trata de una sensación subjetiva con componente psicossomático, ya que se puede vivir con un macarrón alojado en la vía aérea, si este está correctamente alineado y orientado.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:
Seleccione una:

- ☐ a. Ecografía.
- ☐ b. Compresor torácico mecánico.
- ☐ c. RCP-ECMO Extracorporea.
- ☒ d. Hipertermia controlada. ✓

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:
Seleccione una:

- ☐ a. Tras la 2ª descarga.
- ☐ b. Tras la 3ª adrenalina.
- ☒ c. Tras la 3ª descarga. ✓
- ☐ d. Tras la 4ª descarga con desfibriladores monofásicos y la 5ª en bifásicos.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Puede un desfibrilador semiautomático tipo DESA/DEA causar daño a un paciente:
Seleccione una:

- ☐ a. Si, de no estar en PCR.
- ☒ b. No, sólo descargará energía si el paciente en PCR tiene el ritmo adecuado. ✓
- ☐ c. Si, si tiene un ritmo de PCR NO desfibrilable.
- ☐ d. Si, si se invierte la colocación de los parches adhesivos en un DESA/DEA monofasico sin toma de tierra.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el test de APGAR la puntuación mínima será:
Seleccione una:



a. 0. ✓



b. 3 como en la escala de coma de glasgow, no puede existir la puntuación 0.



c. 2.



d. 1.