

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una acidosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph. ✓
- b. Hipotensión - Bradicardia - Bradipsiquia.
- c. Aumento del Ph.
- d. Triplicar la PCO₂.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son contraindicaciones para usar sueros glucosados:

Seleccione una:

- a. TCE e hipertensión intracraneal. ✓
- b. Hipoglucemia y ansiedad.
- c. Ansiedad e hipoglucemia.
- d. Hipertensión e hipoglucemia.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El omeprazol es:

Seleccione una:

- a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓
- b. Un inhibidor de la bomba de electrones.
- c. Un antiemético.
- d. Un emetizante.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:

- a. Un patrón Electrocardiografico.
- b. Respiratorio. ✓
- c. Diabético.
- d. Urinario.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. Valorar ABCD. ✓
- b. Hacer glucemia capilar.

- c. Buscar cuerpos cetónicos.
- d. Administrar dextrosa/glucosa.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que es el estado postcritico de un paciente:

Seleccione una:

- a. Periodo limitado de desorientación, badripsiquia y otros deficit neurologicos, tras un crisis convulsiva. ✓
- b. Momento tras la resolución de una reclamación de un paciente.
- c. Momento exacto en el que el paciente deja de estar critico.
- d. Denominación del síndrome de estancia en unidad de cuidados intensivos.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual no es por si sólo, un criterio de exclusión del código ICTUS:

Seleccione una:

- a. Convulsiones.
- b. GCS de 8.
- c. Ranking de 4.
- d. 87 años de edad. ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las últimas recomendaciones de tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, la saturación de oxígeno del paciente deberá estar:

Seleccione una:

- a. Entre 95% y 100%.
- b. Entre 90% y 95%. ✓
- c. En 90%.
- d. En 100%.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de las siguientes medicaciones antihipertensivas no se recomienda se administre en perfusión continua:

Seleccione una:

- a. Labetalol.
- b. Urapidilo.
- c. Nitroglicerina.
- d. Hidralacina. ✓

Pregunta 10

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un Electro Cardiograma con elevación del ST en las derivaciones V1 y V2, sospecharemos:

Seleccione una:

- a. Infarto inferior.
- b. Angina estable.
- c. Angina inestable.
- d. Infarto septal. 

Pregunta 11

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El principal riesgo de una crisis asmática que no cede, es:

Seleccione una:

- a. Los vomitos.
- b. El agotamiento. 
- c. La infección.
- d. El mareo.

Pregunta 12

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis inicial de insulina en bolo IV ante una cetoacidosis diabetica será de:

Seleccione una:

- a. 15 U.I.
- b. 10 U.I. de insulina regular/rápida. 
- c. 10 U.I de insulina NPH.
- d. 12 U.I de insulina rápida/regular.

Pregunta 13

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El uso de SNG en pacientes con sangrado digestivo alto activo, esta contraindicado en caso de:

Seleccione una:

- a. VHC +.
- b. Varices esofágicas. 
- c. INR mayor que 7.
- d. Pacientes diabéticos.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que tipo de shock aparece una piel caliente y sonrojada en el paciente:

Seleccione una:

- a. Shock hipovolémico.
- b. Shock séptico. ✓
- c. Shock cardiogénico.
- d. Shock neurogénico.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes opciones, cual es la diferencia entre el shock séptico y los demás tipo:

Seleccione una:

- a. No precisa reposición de volumen aún con hipotensión.
- b. No causa taquicardia (salvo en paciente betabloqueados).
- c. La necesidad de recoger hemocultivos y urocultivo. ✓
- d. Nunca se modifica la función respiratoria.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NISHH, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:

- a. 1. ✓
- b. 0.
- c. 3.
- d. 2.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. El Ph.
- b. K+.
- c. Edema cerebral.
- d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph.
- b. Aumento del Ph. ✓
- c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- d. Descenso del la PIC.

Pregunta 19

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tirotóxica:

Seleccione una:

- a. Penicilinas.
- b. Gluten.
- c. Yodo. 
- d. Polen.

Pregunta 20

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Por muchos coloides y cristaloides que perfundamos a un paciente en shock, tenemos que tener claro que a diferencia de los hemoderivados, la citada sueroterapia no aporta:

Seleccione una:

- a. Volumen.
- b. Aumento de tensión arterial.
- c. Capacidad de transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. 
- d. Lavado gástrico.