

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿En qué casos está indicada la IAH?

Seleccione una:

- ☐ a. En los casos de parejas con esterilidad o infertilidad de origen desconocido.
- ☐ b. En mujeres con trastornos de ovulación.
- ☐ c. Cuando el REM es superior a 3 millones.

☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Qué datos de la donante se pueden desvelar a los pacientes receptores de ovocitos?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los que soliciten
- ☐ b. Ninguno, la ley no lo permite
- ☐ c. Gestaciones previas de la donante

☒ d. Grupo sanguíneo, Rh y edad de la donante para un correcto seguimiento del posterior embarazo. ✓

La respuesta correcta es: Grupo sanguíneo, Rh y edad de la donante para un correcto seguimiento del posterior embarazo.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuándo está indicada la recepción de ovocitos?

Seleccione una:

- ☐ a. Mujeres con fallo ovárico (primario ó prematuro), sin menstruaciones espontáneas por menopausia y cirugía ovárica.
- ☐ b. Mujeres con función ovárica que no pueden utilizar sus propios ovocitos, bien por calidad de los mismos, por enfermedades hereditarias transmisibles a la descendencia que no pueden ser detectadas en el DGP.
- ☐ c. Mujeres mayores de 40 años que tiene disminuidas sus posibilidades de gestación y de embarazo a término con sus propios ovocitos, además de que aumenta la incidencia de síndrome de Down y otras trisomías.

☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuándo está indicada la utilización de semen de donante?

Seleccione una:

- ☐ a. Parejas heterosexuales con ausencia de espermatozoides tanto en el eyaculado como directamente en el testículo y/o epidídimo.
- ☐ b. Ante la posibilidad de transmisión de trastornos genéticos o enfermedades congénitas con el semen conyugal.
- ☐ c. Enfermedades inmunitarias documentadas y mujeres sin pareja masculina u homosexuales.

☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuándo se considera que la paciente está preparada para la extracción de ovocitos?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando los ovarios están aumentados de tamaño
- ☐ b. En el día catorce del ciclo de la paciente
- ☐ c. Cuando los folículos han alcanzado un diámetro entre 17 y 18 milímetros

☒ d. Cuando los folículos han alcanzado un diámetro entre 17 y 18 milímetros y la concentración de estradiol es la adecuada ✓

La respuesta correcta es: Cuando los folículos han alcanzado un diámetro entre 17 y 18 milímetros y la concentración de estradiol es la adecuada