

TEST 1.

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía de administración de fármacos parenteral contempla todas menos:

Seleccione una:

- ☐ a. Vía intramuscular.
- ☒ b. Vía sublingual.
- ☐ c. Vía intravenosa.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía intraósea (IO), está indicada en:

Seleccione una:

- ☒ a. Ambas son correctas.
- ☐ b. PCR y Shock.
- ☐ c. Paciente politraumatizado.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la atención extrahospitalaria. ¿Qué es lo que se considera más importante?

Seleccione una:

- ☒ a. Se cobra gran importancia la organización y la comunicación.
- ☐ b. Se cobra gran importancia el medio donde se está llevando a cabo la actuación.
- ☐ c. Se cobra gran importancia el saber diagnosticar a tiempo al paciente crítico.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la revisión del vehículo debemos comprobar la operatividad de:

Seleccione una:

- ☒ a. Material del soporte vital.
- ☐ b. Ambas son correctas.
- ☐ c. Aparataje electrodoméstico sin comprobar el estado de las baterías nunca se gastan.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la asistencia al paciente, ¿qué cuidados específicos son aplicados según la patología?

Seleccione una:

- ☐ a. Solo se administrarán fármacos a su llegada al hospital.
- ☒ b. Valorar el nivel de conciencia del paciente. Escala de Glasgow.
- ☐ c. No se controla la diuresis ni la temperatura corporal hasta no llegar al hospital.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la asistencia al paciente...

Seleccione una:

- ☐ a. No hay que llevar control de la diuresis.
- ☐ b. No hay que controlar las pertenencias del paciente.
- ☒ c. Hay que evitar punciones y contagios accidentales.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El registro en la hoja de enfermería debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Claro.
- ☐ b. Preciso.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes datos debe constar en el registro de enfermería?

Seleccione una:

- ☐ a. Datos del paciente.



b. Valoración de constantes.



c. Ambas son ciertas.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué es tan importante la función investigadora para enfermería?

Seleccione una:



a. Aumentar los conocimientos existentes e introducir cambios que mejoren nuestro ejercicio profesional.



b. No facilita la toma de decisiones ni la evaluación de las mismas.



c. Disminuye la mejora en el coste-efectividad del servicio.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Fluidoterapia es:

Seleccione una:



a. La FDT es una de las medidas terapéuticas más importante y más frecuentemente utilizada en la Medicina de urgencias, emergencias e intensivos.



b. Ambas son correctas.



c. La Fluidoterapia, es la parte de la terapia encargada de mantener o restaurar el volumen y composición de los líquidos corporales en el organismo utilizando la vía intravenosa.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué se entiende por carro de parada?

Seleccione una:

- ☐ a. Es el conjunto de material sanitario destinado para el uso diario.
- ☐ b. Toda la medicación que hay en planta destinada para la utilización en casos de emergencia.
- ☒ c. Es el conjunto de material sanitario y medicación que deben ser destinados para su utilización en casos de emergencia vital.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas derivaciones puede registrar el monitor desfibrilador del carro de parada?

Seleccione una:

- ☒ a. Contar con la posibilidad de registrar al menos 3 derivaciones.
- ☐ b. Contar con la posibilidad de registrar al menos 6 derivaciones.
- ☐ c. Contar con la posibilidad de registrar al menos 8 derivaciones.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Lidocaína, antiarrítmico utilizado en la medicación del carro de parada ¿Qué % se utiliza?
¿Las ampollas de cuantos ml son?

Seleccione una:

- ☐ a. Lidocaína al 10%, con ampollas de 2 ml.
- ☒ b. Lidocaína al 5%, con ampollas de 10ml.
- ☐ c. Lidocaína al 8%, con ampollas de 5 ml.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la fluidoterapia es:

Seleccione una:

- ☐ a. Reponer pérdidas de líquidos, recuperación y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, aportar necesidades mínimas diarias de agua, administrar fármacos y hemoderivados y realizar nutrición adecuada para evitar el anabolismo.
- ☐ b. Reponer pérdidas de electrolitos, recuperación mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, aportar necesidades de electrolitos que se eliminan a través de la piel, pulmones, aparato digestivo y excreta urinaria, administrar hemoderiva665 dos y realizar nutrición adecuada para evitar el catabolismo.
- ☒ c. Reponer pérdidas de líquidos y electrolitos, recuperación y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico alterado, aportar necesidades mínimas diarias de agua y electrolitos que se eliminan a través de la piel, pulmones, aparato digestivo y excreta urinaria, administrar fármacos y hemoderivados y realizar nutrición adecuada para evitar el catabolismo.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El equipo para soporte circulatorio y complementario consta de:

Seleccione una:

- ☐ a. Fonendoscopio, gasas estériles, material de sutura.



b. Llaves de paso de 3 vías (10U), guantes estériles de diferentes tamaños, jeringas de 5ml, 10ml, 20ml, 50ml.



c. Ambas son correctas.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los antídotos más utilizados en la medicación de carro de parada?

Seleccione una:



a. Ambas son correctas.



b. Los antídotos son el flumacénilo y la naloxona.



c. No se utiliza ningún antídoto.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Otro medicamento a utilizar en el carro de parada es la glucosa. ¿A qué porcentaje se utiliza? ¿De cuántos ml?

Seleccione una:



a. Glucosa al 5%, con ampollas de 2ml.



b. Glucosa al 33%, con ampollas de 10ml.



c. Glucosa al 20%, con ampollas de 5ml.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué soluciones coloides son utilizadas en el carro de parada?

Seleccione una:



a. Gelatinas, almidones, dextranos.



b. Suero glucosado al 5%.



c. Solución salina, ringer lactato.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El maletín del médico de Atención Primaria. ¿Cada cuanto tiempo debe revisarse?

Seleccione una:



a. Se debe realizar una revisión periódica, sobre todo la medicación.



b. Se debe realizar una revisión cada 2 semanas.



c. Se debe realizar una revisión 1 vez al mes.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La bolsa caliente sueros. ¿Qué temperaturas pueden alcanzar?

Seleccione una:



a. Entre 35 y 37°C.



b. Entre 36 y 38°C.



c. Entre 38 y 40°C.

TEST 2.

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El material para el transporte ¿Dónde debe ir guardado?

Seleccione una:



a. El material debe ir guardado en maletas que impidan que el contenido se rompa, debe ir bien ordenado para su posterior revisión y reposición.



b. El material debe ir guardado en maletas no metálicas.



c. El material debe ir guardado en mochilas, sin rotular y sin ordenar.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todas son indicaciones de la fluidoterapia excepto:

Seleccione una:



a. Shock hipovolémico, depleción de fluido extracelular, coma hiperosmolar.



b. Depleción de fluido intracelular, dieta restringida.



c. Depleción salina, dieta absoluta, IRA.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el Shock hipovolémico secundario a deshidratación aguda:

Seleccione una:

- ☐ a. Se requiere Fluidoterapia agresiva con cristaloides y coloides.
- ☐ b. Se requiere Fluidoterapia agresiva con coloides.
- ☒ c. Se requiere Fluidoterapia agresiva con cristaloides.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el Shock hipovolémico de origen hemorrágico:

Seleccione una:

- ☒ a. Hay que conseguir hemostasia ya sea de forma quirúrgica, mecánica, farmacológica, etc; y reanimación con líquidos.
- ☐ b. Hay que conseguir hemostasia ya sea de forma quirúrgica, mecánica, farmacológica, etc;
- ☐ c. Se requiere Fluidoterapia agresiva con coloides.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Complicaciones de la Fluidoterapia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Insuficiencia cardiaca, edema intestinal, edema cutáneo, defectos de coagulación, alteración de la oxigenación tisular e hipoproteinemia.
- ☒ b. Insuficiencia cardiaca, edema pulmonar, edema cerebral, edema intestinal, edema cutáneo, defectos de coagulación, alteración de la oxigenación tisular e hipoproteinemia.
- ☐ c. Insuficiencia cardiaca, edema pulmonar, edema cerebral, edema intestinal, edema cutáneo.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La adrenalina se utiliza en estas patologías excepto en:

Seleccione una:

- ☐ a. Parada cardiaca, anafilaxia, broncoespasmo, shock cardiogénico y salida de bomba en circulación extracorpórea.
- ☐ b. Parada cardiaca, anafilaxia grave, broncoespasmo y shock cardiogénico.
- ☒ c. Parada cardiaca, anafilaxia, broncoespasmo, shock cardiogénico, salida de bomba en circulación extracorpórea e intoxicación por drogas intravenosas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La amiodarona es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Produce bradicardia, bloqueo AV, hipotensión, no dar con betabloqueantes ni con verapamilo.
- ☒ b. Ambas son correctas.
- ☐ c. Contraindicado en disfunción nodo sinusal, bradicardia sinusal, bloqueos 2º-3º grado y precaución ante insuficiencia cardíaca y QT largo.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atropina:

Seleccione una:

- ☐ a. Todo es falso.
- ☒ b. Puede causar taquicardia ventricular que puede llegar a ser perjudicial en pacientes con isquemia miocárdica, ACxFA, aumento del consumo de oxígeno, delirio, visión borrosa, coma y sofocos.
- ☐ c. Puede causar bradicardia ventricular que puede llegar a ser perjudicial en pacientes con isquemia miocárdica, ACxFA, aumento del consumo de oxígeno, delirio, visión borrosa, coma y sofocos.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. En urgencias la vía oral es muy útil.
- ☒ b. La vía rectal es útil en urgencias para el tratamiento inicial de crisis convulsivas.



c. La vía oral tiene eficacia porque no depende de la absorción gastrointestinal individual.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de estos relajantes musculares es despolarizante?

Seleccione una:



a. Suxametonio.



b. Mivacurio.



c. Atracurio.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el ciclo de RCP debe procederse a la optimización del SVA:

Seleccione una:



a. Corrección de posibles causas reversibles o factores agravantes como alteraciones electrolíticas, hipotermia, drogas o intoxicaciones que precisen tratamiento específico.



b. La cadencia compresiones ventilaciones de 15/2 en adulto.



c. Ambas son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Durante las maniobras de RCP de cada bucle se puede intentar el acceso venoso, vía de elección para la administración de fármacos durante el SVA.
- ☒ b. Las recomendaciones actuales del ERC con respecto a las compresiones torácicas en la RCP sitúan la frecuencia de las mismas muy rápidas pero efectivas a 80 por minuto.
- ☐ c. La utilización de la adrenalina en el SVA permanece sin cambios. Se continúa recomendando la dosis de 1 mgr cada 3-5 minutos.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realizar un electrocardiograma basal se colocan electrodos en las extremidades y en el torax, el cable verde de las extremidades se coloca en:

Seleccione una:

- ☐ a. Brazo izquierdo.
- ☐ b. Pierna derecha.
- ☒ c. Pierna izquierda.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el electrocardiograma convencional de registran diferentes derivaciones o lugares desde donde se analiza el corazon, el numero de estas son:

Seleccione una:

- ☐ a. Seis derivaciones monopolares y seis precordiales.
- ☐ b. Seis derivaciones precordiales.
- ☒ c. Cuatro derivaciones de miembros y seis precordiales.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El papel convencional donde se registra el ECG es una cuadrícula milimetrada, habitualmente se registra a 25 mm/sg, cada cuadro pequeño serán:

Seleccione una:

- ☐ a. 0,2 segundos.
- ☒ b. 0,04 segundos.
- ☐ c. 0,02 segundos.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el ECG normal el QRS registra la despolarización ventricular, siempre la primera onda es:

Seleccione una:

- ☒ a. Dependera de la derivada.
- ☐ b. Negativa.



c. Positiva.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para medir la frecuencia cardiaca podemos medir calculando el numero de cuadros grandes que hay entre dos complejos QRS consecutivos (distancia R-R), si hay 5 cuadros grandes, de 5 mm), el corazon irá a:

Seleccione una:



a. 60 latidos por minuto.



b. 70 latidos por minuto.



c. 90 latidos por minuto.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para ver si hay ritmo sinusal observaremos:

Seleccione una:



a. Si el QRS es estrecho (menor de 0.12 sg).



b. Sin hay P delante de cada QRS



c. Si la distancia entre los QRS es la misma.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El intervalo PR:

Seleccione una:

- ☒ a. Nos informa de la existencia de alteraciones de la conducción entre la aurícula y ventrículo.
- ☐ b. Habitualmente es mayor de 0,20 sg.
- ☐ c. Se calcula desde el final de la P hasta el inicio del QRS.

Pregunta **20**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía enteral:

Seleccione una:

- ☒ a. En Urgencias la utilizaremos para la realización de lavados gástricos con sondas gástricas.
- ☐ b. En Urgencias no es útil.
- ☐ c. En Urgencias la utilizaremos para la realización de lavados gástricos con cateter IV.

TEST 3.

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cálculo del eje eléctrico nos informa de:

Seleccione una:

- ☐ a. La existencia de bloqueos de rama.
- ☒ b. Todo lo anterior.
- ☐ c. La presencia de hipertrofia cardíaca.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el crecimiento auricular izquierdo, la onda P es:

Seleccione una:

- ☐ a. Alta y picuda.
- ☒ b. Ancha y bimodal (en joroba).
- ☐ c. Alta y ancha, (mas de 2.5 mm y de 0,10 sg.).

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sospecharemos hipertrofia ventricular izquierda si vemos:

Seleccione una:



a. El eje electrico derecho y S profunda en V1 y V2.



b. El eje electrico derecho y R altas en V1 y V2.



c. El eje electrico izquierdo y ondas R altas en V5 y V6.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Confirmaremos la hipertrofia ventricular izquierda con los indices de voltaje de Lewis o Sokoloff:

Seleccione una:



a. Lewis superior a 15 mm y Sokoloff superior a 35 mm.



b. Lewis inferior a -15 mm y Sokoloff inferior a 30 mm.



c. Lewis superior a 35 mm y Sokoloff superior a 15 mm.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En ECG ritmico a 80 lpm, con P positiva en DII , V1 y V2, intervalo PR menor de 0.12 sg (acortado) y QRS alterado con el inicio abombado pensaremos en:

Seleccione una:



a. Síndrome de preexcitación, tipo Wolf-Parkinson-Whyte.



b. Ritmo de la union auriculoventricular ó nodal.



c. Síndrome de preexcitación tipo Long-Ganon-Levine

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si observamos el intervalo PR mayor de 0.25 sg (alargado), con ondas P seguidas siempre de QRS y con frecuencia cardiaca menor de 30 latido por minuto pensaremos que es:

Seleccione una:



a. Bloqueo AV de segundo grado tipo II (avanzado).



b. Bloqueo AV de tercer grado.



c. Bloqueo AV de primer grado muy bradicardico.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un ECG rítmico a 120 lpm, con P, PR normal, eje izquierdo, QRS ensanchado con RSR' en DI y V6 y ST y T contraria a QRS. Pensaremos en:

Seleccione una:

- ☒ a. Taquicardia sinusal con bloqueo de rama izquierda.
- ☐ b. Taquicardia nodal.
- ☐ c. Taquicardia ventricular.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un ECG con presencia de la primera onda del QRS negativa en las derivadas DI, aVL, V5 y V6 y presencia del segmento ST ligeramente descendido (0.5 mm) y onda T negativa en las mismas derivadas pensaremos en:

Seleccione una:

- ☐ a. Angina inestable (SCASEST) con territorio en riesgo en cara lateral.
- ☒ b. Infarto antiguo de miocardio de cara lateral.
- ☐ c. Infarto agudo de miocardio de cara lateral.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En ECG ritmico a 160 lpm, con P negativa en DII, V1 y V2, intervalo PR menor de 0.12 sg (acortado) y QRS estrecho pensaremos en:

Seleccione una:



a. Taquicardia ventricular con conducción auricular retrógrada.



b. Taquicardia de la union auriculoventricular ó nodal.



c. Taquicardia sinusal con Síndrome de preexcitacion, tipo Long-Ganon- Levine.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es falso:

Seleccione una:



a. Se entiende por arritmia, cualquier ritmo cardíaco diferente al ritmo sinusal normal, independientemente de su regularidad.



b. Clínica de bajo gasto cardiaco, se traduce en taquicardia y nerviosismo.



c. Se define ritmo sinusal aquel cuyas Ondas P positivas en II, III y aVF, negativa en aVR, con morfología constante.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la vía respiratoria es:

Seleccione una:

- ☒ a. Conseguir que el agente terapéutico alcance el tracto respiratorio y, en el caso de la nebulización también ayudará a humidificar las secreciones pulmonares acumuladas.
- ☐ b. Un nivel de conciencia disminuido facilita el uso de esta vía.
- ☐ c. Estará indicada para el tratamiento de la hemoptisis en urgencias.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Fallo de bomba cardíaca es:

Seleccione una:

- ☐ a. Ambas son correctas.
- ☒ b. La reducción del flujo coronario conlleva la aparición de arritmias que disminuyen la función del corazón. Se puede presentar en forma de Insuficiencia cardíaca izquierda o derecha.
- ☐ c. Dependiendo del paciente, la frecuencia cardíaca puede ser mal tolerada incluso por debajo de 60 latidos por minuto, aunque lo habitual es presentar síntomas por debajo de 40.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El marcapasos externo está indicado en:

Seleccione una:



a. Ambas son correctas.



b. Bradicardias hemodinámicamente inestables.



c. BAV de 3º grado, en relación con el IAM.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la energía de cardioversión:

Seleccione una:



a. Todas son correctas.



b. En Taquicardia de complejo ancho: Se comienza con 200J monofásicos ó 120 – 150 J bifásicos. Si falla se aumenta la dosis escalonadamente.



c. Fibrilación auricular: Se comienza con 200J monofásicos ó 120 – 150 J bifásicos. Si falla se aumenta la dosis escalonadamente.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor torácico:

Seleccione una:



a. El dolor de origen psicógeno suele acompañarse de hiperventilación y parestesias.



b. El dolor torácico de perfil esofágico no incluye alteraciones inespecíficas de la repolarización.



c. Ambas son correctas.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las medidas generales en el manejo del SCA, No incluimos:

Seleccione una:



a. Administración de diuréticos de asa descendente.



b. Canalización vía venosa periférica.



c. Extracción de muestras sanguíneas.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Consideramos contraindicaciones en el uso NTG, todas menos una:

Seleccione una:

- ☐ a. Estenosis mitral o aorticas severas.
- ☒ b. TAS > de 90 mmHg.
- ☐ c. Miocardipatía Hipertrofica Obstructiva.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. En el IAM de V. Derecho puede aparecer hipotensión y aumento de la presión venosa central.
- ☐ b. En los IAM de cara anterior son frecuentes los Bloqueos de rama.
- ☒ c. Todas son ciertas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las contraindicaciones de la fibrinólisis, cual de ellas No corresponde a una contraindicación absoluta:

Seleccione una:



a. Hemorragia activa.



b. Bajo peso.



c. Sospecha de rotura cardiaca.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta Incorrecta:

Seleccione una:



a. En un primer momento basta con la historia clínica, exploración y ECG 12 derivaciones para empezar a actuar.



b. El dolor de una angina inestable puede ser imposible de distinguir del de un IAM.



c. Son imprescindibles las determinaciones enzimáticas para hacer una estrategia del riesgo y comenzar el tratamiento adecuado.

TEST 4.

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento del ahogamiento, ¿cual de las siguientes aseveraciones es FALSA?

Seleccione una:

- ☐ a. En el caso de requerir ventilación mecánica, se recomienda utilizar PEEP.
- ☒ b. Es necesario eliminar el agua aspirada con la maniobra de Heimlich.
- ☐ c. La inmovilización cervical constituye una prioridad.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente en edad pediátrica:

Seleccione una:

- ☒ a. La vía de elección primero es una venosa periférica.
- ☐ b. La vía de elección es la Intraósea.



c. La vía de elección es la umbilical, seguida de la venosa central.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de la hipotermia, señala cual de estas afirmaciones no es correcta.

Seleccione una:



a. El calentamiento central activo no es el tratamiento de elección en la hipotermia grave.



b. En caso de F.V., en hipotermia grave, el numero de choques se limita a un máximo de tres.



c. Los fármacos administrados se acumulan y pueden provocar toxicidad.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la electrocución, ¿cuál de los factores citados esta más directamente relacionado con la P.C.R.?

Seleccione una:



a. Tipo de corriente.



b. La duración del contacto.



c. La edad del paciente.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la electrocución, señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:



a. La fibrilación ventricular es más frecuente con corriente continua.



b. En caso de múltiples víctimas se realiza Triage inverso.



c. Puede ocurrir parada respiratoria central o periférica.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En referencia al S.V.A. en la embarazada, señala la opción correcta:

Seleccione una:



a. Los traumatismos son una causa frecuente de P.C.R. en la embarazada.



b. Todas las anteriores son correctas.



c. Entre la 24-26 semanas de gestación se debe considerar viable al feto.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una modificación fisiológica del embarazo?

Seleccione una:



a. Reducción del gasto cardiaco en decúbito-supino.



b. Aumento de la frecuencia cardiaca.



c. Descenso de la frecuencia respiratoria.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una embarazada que presenta una Taquicardia Ventricular sin pulso, señale la opción correcta:

Seleccione una:



a. Solamente realizaremos ventilación y masaje cardiaco.



b. Se realizara S.V.A y desfibrilación igual que si no estuviera embarazada.



c. No se debe desfibrilar a las embarazadas, el tratamiento es farmacológico.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anafilaxia se define como reacciones de hipersensibilidad mediadas por:

Seleccione una:

☐ a. Ig G.

☒ b. Ig E.

☐ c. Ig D.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La P.C.R. en la anafilaxia:

Seleccione una:

☐ a. Se recomienda rápida expansión de volumen con cristaloides.

☒ b. Todas las anteriores son correctas.

☐ c. Se produce generalmente en Asistolia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente ahogado, con hipotermia leve y sin respiración espontánea, ¿cuál es el primer paso a realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Calentamiento central activo.
- ☐ b. Activar el SEM y eliminar el agua aspirada.
- ☒ c. Ventilación boca-boca.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados post-reanimación:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realiza cuando el paciente está fuera de peligro.
- ☒ b. Incluyen los cuidados necesarios durante el período entre la recuperación de la circulación espontánea y el ingreso del paciente en una U.C.I.
- ☐ c. Incluye toda la monitorización externa del paciente.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con el objeto de reducir las complicaciones asociadas al manejo de una vía venosa y conseguir el mayor beneficio terapéutico hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. La terapia intravenosa, no necesita la observación estricta de cuidados; es muy segura.
- ☒ b. La terapia intravenosa implica la correcta administración de soluciones o fármacos prescritos por el médico y, permite la reposición de volumen en breves espacios de tiempo si es necesario.
- ☐ c. Para administrar cualquier tipo de tratamiento intravenoso, es necesario puncionar una vena, mediante aguja, en cualquier parte del organismo.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el S.V.A. Post-Resucitación y dentro de los cuidados cerebrales específicos, cuál de estas afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay que conseguir una T.A.M. aproximada de 90 mmHg.
- ☐ b. El edema cerebral se reduce con la elevación de la cabecera a 30°.



c. El tratamiento con corticoides y barbitúricos mejora el daño neuronal anóxico post-parada.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una posible lesión originada por la RCP?

Seleccione una:



a. Fractura costal.



b. Neumotórax.



c. Coma.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes tejidos es el más lábil del cuerpo humano a la isquemia?

Seleccione una:



a. Hueso.



b. Músculo esquelético.



c. Cerebro.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Fórmula para determinar la velocidad de gotas de solución intravenosa en sistemas de 20 gotas por ml.:

Seleccione una:



a. Gotas/minutofivol. en ml x 10 / tiempo en horas.



b. Gotas/minutofivol. en cc x 20 / tiempo en minutos en 1 hora.



c. Gotas/minutofivol. en ml x 20 / tiempo en minutos en 24 horas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se denominan vías venosas centrales a las venas de grueso calibre tributarias directas de la vena cava, entre ellas tenemos:

Seleccione una:



a. Vena subclavia, femoral, yugular interna y externa.



b. Vena yugular interna y externa.



c. Vena femoral y yugular interna.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los profesionales en Enfermería Clínica Avanzada en Urgencias y Emergencias proporcionan cuidados a:

Seleccione una:



a. Personas con problemas de salud en situación crítica de alto riesgo o de fase terminal.



b. Personas con un buen estado de salud.



c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los profesionales en Enfermería Clínica Avanzada en Urgencias y Emergencias serán competentes para:

Seleccione una:



a. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.

- ☐ b. Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, sin asesorar al equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área.
- ☐ c. No deben de asesorar en el marco sanitario global y en todos los niveles de toma de decisiones.

TEST 5.

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las competencias enfermeras en urgencias y emergencias?

Seleccione una:

- ☒ a. Realizar la recogida y análisis de datos de salud o enfermedad de la persona, familia o comunidad, de forma continua y sistemática.
- ☐ b. No deben utilizar los medios terapéuticos.
- ☐ c. No someter nunca a triaje a los pacientes a los cuales se les presta cuidados en situaciones de emergencias y catástrofes.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía umbilical:

Seleccione una:



a. Ambas son correctas.



b. El cateterismo de la arteria umbilical está indicado cuando se requieren determinaciones frecuentes de los gases en sangre arterial, este procedimiento también se utiliza para la monitorización continua de la presión arterial y para realizar exanguinotransfusión.



c. Los vasos umbilicales son la vía de elección para el neonato críticamente enfermo.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el box de reanimación:

Seleccione una:



a. Cada 2 turnos se revisará las bombas de perfusión aspiradores, respirador y bala de oxígeno.



b. Cada turno se revisará el material, medicación funcionamiento adecuado de monitores.



c. Una vez a la semana se revisará todo el material.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando los pacientes llegan al servicio de urgencias:

Seleccione una:



a. Voluntariamente (con volante).



b. Acompañados por sanitarios y/o no sanitarios.



c. Derivados sólo por el médico de Atención Primaria.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermera de control en el medio intrahospitalario realizará:

Seleccione una:



a. Informar a los familiares y acompañantes del paciente el lugar donde deben esperar mientras es atendido.



b. Disponer de los celadores en las distintas necesidades.



c. No se necesita firma de autorización de los familiares, para solicitar habitación al servicio de admisión para los pacientes.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una intervención sanitaria el objetivo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Ambas son correctas.
- ☐ b. Proporcionar al paciente solo y exclusivamente los cuidados que le sean más imprescindibles.
- ☒ c. Proporcionar al paciente atención inmediata y precisa y aplicar los cuidados de enfermería con las precauciones universales a todos los pacientes.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el recibimiento del box, el paciente en camilla:

Seleccione una:

- ☐ a. El personal auxiliar a desvestir al paciente, colocar ropa hospitalaria y ubicación adecuada en el box.
- ☐ b. Con ayuda del celador y auxiliar trasladarlo a la camilla, desnudar y colocar la ropa hospitalaria adecuada.
- ☒ c. Se pasará al paciente con ayuda del celador, auxiliar y enfermera que vigilará sondas catéteres durante el manejo del enfermo.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente es traslado a su domicilio. ¿Qué debemos de comprobar?

Seleccione una:



a. Comprobar que el paciente y los familiares han sido informados adecuadamente.



b. Los menores de edad: al alta pueden ir acompañados por cualquier persona ya sea mayor o menor de edad.



c. No resolver ninguna duda si la hubiera, todo había sido explicado antes.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando un paciente fallece en urgencias. ¿Qué debemos de realizar?

Seleccione una:



a. Procurar aislarlo del resto de los pacientes e intentar actuar con la mayor discreción posible.



b. No es necesario apuntar la hora del exitus.



c. Amortajar al paciente, poniendo solo una etiqueta con su nombre.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante el exitus de un paciente. ¿Qué atención daremos a la familia?

Seleccione una:



a. No dejar ver al difunto.



b. Facilitar el servicio religioso del hospital.



c. Comentar a la familia que el hospital no se encarga de trasladar al paciente al tanatorio.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El espacio donde se presta atención in situ suele ser:

Seleccione una:



a. Ambas son correctas.



b. Suele ser en un medio hostil: la vía pública, dentro de un coche.



c. En la orilla de un río, en el domicilio, y en un vehículo (una ambulancia).

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué grupos se dividen las funciones enfermeras?

Seleccione una:



a. Función administrativa, asistencial, docente e investigadora.



b. Solo en la función asistencial.



c. Sus funciones son dos: asistencial e investigadora.