

Comenzado el	sábado, 14 de abril de 2018, 18:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 14 de abril de 2018, 18:12
Tiempo empleado	7 minutos 30 segundos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (87%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un sangrado femoral o hematoma, las medidas a seguir son. Señale la verdadera

Seleccione una:

☐ a. No aplicar compresivo

☐ b. Reposo en cama 5 horas

☒ c. Rotular en el apósito el perímetro del hematoma ✓

☐ d. Analgesia IV

La respuesta correcta es: Rotular en el apósito el perímetro del hematoma

Pregunta 2  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La endartectomía o eversión radial se da

Seleccione una:

☐ a. A y B son ciertas

☐ b. Ninguna de ellas es cierta

☒ c. Se describe en casos extremos de espasmo radial con intento de extracción formada del introductor ✓

☐ d. Suele aparecer al intentar atravesar zonas espasmódicas o tortuosas. Se detecta por aparecer hematoma lejos del punto de punción

La respuesta correcta es: Se describe en casos extremos de espasmo radial con intento de extracción formada del introductor

Pregunta 3  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se indica la arteria braquial en los siguientes casos, salvo

Seleccione una:

☐ a. Elongación y tortuosidad extremas de las arteria ilíacas y aorta abdominal

☐ b. Ausencia de pulso radial

☒ c. Enfermedad periférica severa en las arterias de los miembros superiores ✓

☐ d. Bypass bifemoral previo

La respuesta correcta es: Enfermedad periférica severa en las arterias de los miembros superiores

Pregunta 4  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la hemostasia en el acceso braquial es falso que

Seleccione una:

☐ a. El vendaje se alargará a 8 horas si durante el procedimiento se administró ReoPro

☒ b. Se debe retirar el introductor sin aspirarlo ✓

☐ c. La compresión manual tras la retirada del introductor se llevará a cabo durante 10 minutos

☐ d. Se aplicará un vendaje compresivo que llevará el paciente durante 6 horas

La respuesta correcta es: Se debe retirar el introductor sin aspirarlo

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Cuál es la cantidad y temperatura ideal al realizar la medición del gasto cardíaco

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☒ b. 10 ml entre 0 y 5 grados celsius ✓
- ☐ c. 5 ml entre 0 y 5 grados celsius
- ☐ d. 8 ml entre 5 y 10 grados celsius

La respuesta correcta es: 10 ml entre 0 y 5 grados celsius

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

No es un componente de un sistema hemodinámico

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema presurizado con suero salino fisiológico.
- ☐ b. Un transductor o cabeza de presiones.
- ☒ c. Un catéter extravascular. ✓
- ☐ d. Un monitor conectado al transductor.

La respuesta correcta es: Un catéter extravascular.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Qué complicaciones pueden aparecer en la monitorización hemodinámica

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
- ☐ b. Infección.
- ☐ c. Hemorragia.
- ☒ d. Infección y hemorragia. ✓

La respuesta correcta es: Infección y hemorragia.

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Qué parámetro no informa sobre la precarga

Seleccione una:

- ☐ a. Volumen de sangres intratorácica.
- ☐ b. Variación de presión de pulso.
- ☐ c. Volumen global al final de la diástole.
- ☒ d. Resistencias vasculares sistémicas. ✓

La respuesta correcta es: Resistencias vasculares sistémicas.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En relación a los riesgos estocásticos, señale la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. Su incidencia es a medio-largo plazo
- ☐ b. Todas son falsas
- ☐ c. Afectan al ADN celular pudiendo originar mutaciones
- ☒ d. Tienen relación directa con la dosis recibida ✓

La respuesta correcta es: Tienen relación directa con la dosis recibida

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Entre las indicaciones de la coronariografía diagnóstica está:

Seleccione una:

- ☐ a. Enfermedad coronaria y enfermedad valvular
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Enfermedades congénitas del corazón y enfermedades del músculo cardíaco
- ☐ d. Hipertensión pulmonar primaria

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las partes del equipo de Rx son:

Seleccione una:

- ☐ a. Detector de imagen
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Arco en C
- ☐ d. Filtración y colimadores

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Nos llega un paciente a nuestro centro de salud. Su ECG presenta un SCASEST y tiene un alto riesgo de isquemia asociado a arritmias ventriculares malignas e inestabilidad hemodinámica. La estrategia invasiva de indicación de un ICP debe ser urgente, es decir, se debe realizar en

Seleccione una:

- ☐ a. En menos de 72 horas
- ☐ b. Al no haber elevación del ST, se puede dejar ingresado con medicación y hacerlo cuando se pueda
- ☐ c. En menos de 24 h
- ☒ d. En menos de 2 h ✓

La respuesta correcta es: En menos de 2 h

## Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En cuanto a los fármacos bloqueadores de los canales de calcio. Señala la errónea

Seleccione una:

- ☐ a. Existen tres grupos, Fenilalquilaminas, Dihidropiridinas y benzotiazepínicos
- ☒ b. Aumentan la conducción del impulso eléctrico a través del nodo AV ✓
- ☐ c. Todas son falsas
- ☐ d. El más usado es el Verapamilo

La respuesta correcta es: Aumentan la conducción del impulso eléctrico a través del nodo AV

## Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La atropina debe usarse en

Seleccione una:

- ☐ a. hipotermia e hipertrofia prostática
- ☒ b. Todas son falsas ✓
- ☐ c. Glaucoma
- ☐ d. Además de lo anterior en bradicardias sintomáticas

La respuesta correcta es: Todas son falsas

## Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La nitroglicerina está contraindicada en los siguientes casos, salvo

Seleccione una:

- ☐ a. Anemia grave
- ☐ b. Hipersensibilidad
- ☐ c. PIC elevadas
- ☒ d. Control rápido de la HTA en procedimientos quirúrgicos (25 mcg/min, incrementando a 25 mcg/min a intervalos de 5 min hasta la presión deseada) ✓

La respuesta correcta es: Control rápido de la HTA en procedimientos quirúrgicos (25 mcg/min, incrementando a 25 mcg/min a intervalos de 5 min hasta la presión deseada)

## Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los test de Ergonovina y acetilcolina. Señale lo correcto

Seleccione una:

- ☐ a. A. Prácticamente están en desuso
- ☒ b. A y C son correctas ✓
- ☐ c. B. Son test para valorar la hipertensión pulmonar
- ☐ d. C. Se utilizan en la valoración del SCA presuntamente ocasionado por vasoespasmo coronario

La respuesta correcta es: A y C son correctas

## Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

El resultado de una ergometría se interpreta gracias a una fórmula denominada índice de Duke y clasifica a los pacientes en tres categorías. Señale la errónea

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son ciertas
- ☐ b. Medio riesgo (1-3 por ciento)
- ☐ c. Alto riesgo (mayor del 3 por ciento)
- ☒ d. Bajo riesgo (mayor del 1 por ciento) ✓

La respuesta correcta es: Bajo riesgo (mayor del 1 por ciento)

## Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Entre las características del RIVA, señala la errónea

Seleccione una:

- ☐ a. QRS ancho (mayor de 120 ms) con morfología de bloqueo de rama
- ☐ b. No se trata de una arritmia paroxística
- ☒ c. Frecuencia ventricular de 150-500 lpm ✓
- ☐ d. Con frecuencia se capturan fusiones ventriculares

La respuesta correcta es: Frecuencia ventricular de 150-500 lpm

## Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La FV es muy comúnmente inducida en la sala de hemodinámica cuando al tratar de sondar la CD, metemos contraste en

Seleccione una:

- ☐ a. La Primera diagonal, (arteria que da la CD)
- ☐ b. La arteria del nodo auriculoventricular, (arteria que da la CD)
- ☒ c. La arteria del cono, (arteria que da la CD) ✓
- ☐ d. Todas suelen inducir FV al inyectar contraste en ellas

La respuesta correcta es: La arteria del cono, (arteria que da la CD)

## Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las ondas Q patológicas en un ECG indicant

Seleccione una:

- ☐ a. Necrosis
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. La presencia de ondas Q en cara anterior o anterolateral indican disfunción ventricular
- ☐ d. Es el último evento que se produce en un SCA

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Cuál de las arterias se denomina la arteria eléctrica del corazón

Seleccione una:

- ☐ a. La coronaria derecha, que da la arteria del nodo auriculoventricular que en caso de isquemia produce trastornos de conducción
- ☒ b. La Circunfleja ✗
- ☐ c. La Obtusa marginal
- ☐ d. La descendente anterior

La respuesta correcta es: La coronaria derecha, que da la arteria del nodo auriculoventricular que en caso de isquemia produce trastornos de conducción

## Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En cuánto al sistema de autorregulación de la circulación coronaria. Señale la correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son falsas ✓
- ☐ b. Valores por debajo de 60 mmHg representa un rango de reserva vasodilatadora coronaria dentro de los límites normales
- ☐ c. La relación flujo-presión se mantiene entre los 40-120 mmHg.
- ☐ d. Es un mecanismo pasivo

La respuesta correcta es: Todas son falsas

## Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La innervación del pericardio es llevada a cabo por

Seleccione una:

- ☐ a. nervios simpáticos
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. X par craneal
- ☐ d. Nervio frénico

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los factores de riesgo modificables son

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 3 son correctas ✓
- ☐ b. Opción 3: hiperlipemia y sedentarismo
- ☐ c. Opción 2: Todos los factores de riesgo son modificables
- ☐ d. Opción1: Tabaco, HTA y diabetes

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 3 son correctas

## Pregunta 25

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Según la clasificación funcional de los grandes vasos sanguíneos las grandes arterias son vasos de

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ b. De conducción
- ☐ c. De resistencia
- ☒ d. De conducción y de volumen o retorno ✗

La respuesta correcta es: De conducción

## Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Son factores dependientes de la vitamina K, todos except

Seleccione una:

- ☐ a. Factor titular y trombomodulina
- ☐ b. Factor de coagulación VI
- ☒ c. Ninguno es dependiente de la vitamina K ✓
- ☐ d. FC V y VIII

La respuesta correcta es: Ninguno es dependiente de la vitamina K

## Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Son contraindicaciones del acceso radial todas, salvo

Seleccione una:

- ☐ a. Raynaud
- ☐ b. Todas son contraindicaciones
- ☒ c. Bypass aortobifemoral ✓
- ☐ d. Linfedema

La respuesta correcta es: Bypass aortobifemoral

**Pregunta 28**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Tras el procedimiento del cateterismo coronario, se recomienda retirar el introductor de la arteria femoral

Seleccione una:

- ☐ a. Tras 12 horas
- ☐ b. Tras 3-4 horas, hasta alcanzar un ACT de 100-15 segundos
- ☒ c. Siempre hay que retirar el introductor tras finalizar el procedimiento, se administre o no heparina ✖
- ☐ d. Todas son falsas

La respuesta correcta es: Todas son falsas

**Pregunta 29**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Tras el procedimiento del cateterismo coronario, se recomienda retirar el introductor de la arteria femoral

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son falsas
- ☐ b. Tras 12 horas
- ☒ c. Siempre hay que retirar el introductor tras finalizar el procedimiento, se administre o no heparina ✖
- ☐ d. Tras 3-4 horas, hasta alcanzar un ACT de 100-15 segundos

La respuesta correcta es: Todas son falsas

**Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Tras un acceso arteria radial, el paciente presenta <10 cm. aparece dolor y inflamación. Nos encontramos ante

Seleccione una:

- ☒ a. Hematoma Grado II ✔
- ☐ b. Hematoma Grado III
- ☐ c. Síndrome compartimental
- ☐ d. Hematoma Grado I

La respuesta correcta es: Hematoma Grado II