

https://www.aulaeconcol... Recibidos (352) - rociog... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... Ventilación con presión...

00:11:40

Página de inicio del curso

96%

1.11 CASO 1 ✓
1.12 CASO 1 ✓
2.1 CASO 2 ✓
2.2 CASO 2 ✓
2.3 CASO 2 ✓
2.4 CASO 2 ✓
2.5 CASO 2 ✓
2.6 CASO 2 ✓
2.7 CASO 2 ✓
2.8 CASO 2 ✓
3. Fin de la presentación ✓

Test Módulo 10: Casos clínicos pacientes tratados de forma ambulatoria

1. Paciente de 60 años, HTA y DM. Cuadro tos seca con expectoración de 5 días de evolución, no disnea. Su hijo, con el que convive, ha sido diagnosticado de COVID-19. Contacta desde domicilio telefónicamente:

- Es obligatorio realizar PCR a SARS-Cov-2, tiene factores de riesgo.
- Por la clínica y los antecedentes epidemiológicos, puede catalogarse como caso confirmado.
- Precisa ingreso en planta de encame por sus factores de riesgo.
- Es un caso posible y no precisa determinación de PCR a SARS-Cov-2.
- No es un cuadro compatible con COVID-19, por lo que no precisa seguimiento.

Siguiente pregunta

oxigenotrepia_INF...pdf

Mostrar todo

8:26 29/07/2020

https://www.aulaeconcol... Recibidos (352) - rociog... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... Ventilación con presión...

00:11:06

Página de inicio del curso

96%

1.11 CASO 1 ✓
1.12 CASO 1 ✓
2.1 CASO 2 ✓
2.2 CASO 2 ✓
2.3 CASO 2 ✓
2.4 CASO 2 ✓
2.5 CASO 2 ✓
2.6 CASO 2 ✓
2.7 CASO 2 ✓
2.8 CASO 2 ✓
3. Fin de la presentación ✓

Test Módulo 10: Casos clínicos pacientes tratados de forma ambulatoria

2. Ante un paciente de 45 años que acude a Urgencias con buen estado general, sin factores de riesgo ni medicación concomitante y con clínica de infección respiratoria de 3 días de evolución con radiografía normal: Ante un paciente de 45 años que acude a Urgencias con buen estado general, sin factores de riesgo ni medicación concomitante y con clínica de infección respiratoria de 3 días de evolución con radiografía normal:

- Ingreso, puede progresar a neumonía grave.
- Alta y observación domiciliaria con tratamiento sintomático.
- Alta y observación domiciliaria con lopinavir/ritonavir.
- Alta y observación domiciliaria con hidroxcloroquina.
- Alta y observación domiciliaria con hidroxcloroquina + azitromicina.

Pregunta anterior Siguiente pregunta

oxigenotrepia_INF...pdf

Mostrar todo

8:27 29/07/2020

https://www.aulaencol... Recibidos (352) - rocio.g... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... Ventilación con presión...

00:10:21

Página de inicio del curso

96%

1.11 CASO 1 ✓
1.12 CASO 1 ✓
2.1 CASO 2 ✓
2.2 CASO 2 ✓
2.3 CASO 2 ✓
2.4 CASO 2 ✓
2.5 CASO 2 ✓
2.6 CASO 2 ✓
2.7 CASO 2 ✓
2.8 CASO 2 ✓
3. Fin de la presentación ✓

Test Módulo 10: Casos clínicos pacientes tratados de forma ambulatoria

3. Paciente que acude a Urgencias siendo diagnosticado de posible infección por SARS-CoV-2; en su domicilio, para poder ser alta de Urgencias

- Debe tener teléfono.
- Si convive con más personas, debe tener la posibilidad de autoaislamiento en habitación propia.
- Si existe una persona inmunodeprimida en su casa, no debe aislarse en dicho domicilio.
- Debe tener un centro de atención primaria asequible.
- Todas son ciertas.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

oxigenotrofia_INF...pdf

Mostrar todo

8:28
29/07/2020

https://www.aulaencol... Recibidos (352) - rocio.g... Curso: Aspectos clínicos... Manejo de la infección p... SEPAR Contenidos - SEP... Ventilación con presión...

00:08:59

Página de inicio del curso

96%

1.11 CASO 1 ✓
1.12 CASO 1 ✓
2.1 CASO 2 ✓
2.2 CASO 2 ✓
2.3 CASO 2 ✓
2.4 CASO 2 ✓
2.5 CASO 2 ✓
2.6 CASO 2 ✓
2.7 CASO 2 ✓
2.8 CASO 2 ✓
3. Fin de la presentación ✓

Test Módulo 10: Casos clínicos pacientes tratados de forma ambulatoria

4. Una de estas medidas es FALSA en caso de un paciente en aislamiento domiciliario

- Lavar la ropa a más de 40 °C.
- Utilizar mascarilla cuando comparta espacio con otros convivientes.
- No compartir vasos o platos con otros convivientes.
- Para el manejo de residuos, se precisan 3 bolsas distintas.
- La persona encargada de la limpieza de la habitación debe protegerse con mascarilla y guantes.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

oxigenotrofia_INF...pdf

Mostrar todo

8:29
29/07/2020

PREGUNTA 5: LEVANTO AISLAMIENTO DIRECTAMENTE

Página de inicio del curso



100%

- 1.11 CASO 1 ✓
- 1.12 CASO 1 ✓
- 2.1 CASO 2 ✓
- 2.2 CASO 2 ✓
- 2.3 CASO 2 ✓
- 2.4 CASO 2 ✓
- 2.5 CASO 2 ✓
- 2.6 CASO 2 ✓
- 2.7 CASO 2 ✓
- 2.8 CASO 2 ✓
- 3. Fin de la presentación ✓

Test Módulo 10: Casos clínicos pacientes tratados de forma ambulatoria ✓

Test Módulo 10: Casos clínicos pacientes tratados de forma ambulatoria

Intentos 1 / 3

Iniciar la prueba

Intento	Fecha de inicio	Puntuación
1	29 de Julio 2020 a las 08:23 AM	80% (4 / 5)

oxigenotrepia_INF...pdf

Mostrar todo X