

MODULO 1 URGENCIAS

Pregunta 1

A que potencia se dan las descargas en un desfibrilador manual monofásico en caso de PCR por TVSP y/o FV:

Seleccione una:

- ☒ a. 360 julios. ✓
- ☐ b. 120 julios.
- ☐ c. 150 julios.
- ☐ d. 200 julios.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte subita, implica:

Seleccione una:

- ☒ a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓
- ☐ b. Posible donación en asistolia controlada.
- ☐ c. Una PCR refractaria que precisara E-RPC (ECMO).
- ☐ d. Posible donante, sólo si porta el carné que lo identifique como tal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Cardiana (FC) de un recién nacido de entre 3 a 4 Kg de peso, son:

Seleccione una:

- ☐ a. 100 lpm.
- ☐ b. 80-120 lpm.
- ☒ c. 120-180 lpm. ✓
- ☐ d. 100-200 lpm.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En una OVACE, con tos productiva y sospechando obstrucción parcial, NO es correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Incentivar y animar a toser.
- ☐ b. Prepararse para una mala evolución de la obstrucción.
- ☐ c. Vigilar la posible salida del cuerpo extraño de la o en la orofaringe.
- ☒ d. Realizar al paciente 5 compresiones abdominales, colocándolo para ello tumbado en el suelo. ✓

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:

Seleccione una:

- ☐ a. Ecografía.
- ☐ b. Compresor torácico mecánico.
- ☐ c. RCP-ECMO Extracorporea.
- ☒ d. Hipertermia controlada. ✓

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?

Seleccione una:

- ☐ a. De 1 a 2 minutos.



b. De 3 a 5 minutos. ✓



c. Cada 10 minutos.



d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el valor de APGAR del niño sano:

Seleccione una:



a. Entre 7 a 10. ✓



b. De 3 a 5.



c. De 10 a 12.



d. 8.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el ciclo correcto de desfibrilación con un equipo bifásico en caso de PCR desfibrilable:

Seleccione una:



a. Entre 150-360 julios la primera y las sucesivas entre 120-200 julios.



b. Entre 150-200 julios la primera y las sucesivas entre 150-360 julios. ✓



c. 360 julios.



d. 200 julios.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Diastólica (TAD) de un niño entre los 8 y 10 años medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- ☐ a. 60-80 mmHg.
- ☐ b. 95 mmHg.
- ☐ c. 50-80 mmHg.
- ☒ d. 55-90 mmHg. ✓

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "H" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- ☐ a. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hiperpotasemia.
- ☐ b. 1)Hipovolemia 2)Hipotermia 3)Hipotiroidismo 4)Hipopotasemia 5)Hipertermia.
- ☒ c. 1)Hipovolemia 2)Hipoxia 3)Hidrogeniones (acidosis) 4)Hipo e Hiper potasemia 5)Hipotermia. ✓
- ☐ d. Son sólo 4 "H": 1) Hipoxia. 2) Hipovolemia. 3) Hipo/Hipertermia. 4) Hipo/Hipermetabólicas.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La relación de compresiones torácicas -ventilaciones en una RCP de adulto, es:

Seleccione una:

- ☒ a. 30:2. ✓
- ☐ b. 15:1.
- ☐ c. 15:2.
- ☐ d. 30:1.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No se considera donación en asistolia controlada:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes a la espera del paro cardiaco.
- ☐ b. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica en hospital.
- ☒ c. Pacientes con resucitación extrahospitalaria infructuosa. ✓
- ☐ d. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica antes de quirófano.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el test de APGAR la puntuación mínima será:

Seleccione una:

- ☒ a. 0. ✓
- ☐ b. 3 como en la escala de coma de glasgow, no puede existir la puntuación 0.
- ☐ c. 2.
- ☐ d. 1.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP pediátrica la relación compresiones torácicas - ventilaciones es

Seleccione una:

- ☐ a. 10:1.
- ☐ b. 11:15.



c. 15:2 ✓



d. 5:2.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la primera opción de permeabilidad de vía aerea en RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:



a. La Frova.



b. Canula orofaringea. ✓



c. La maniobra frente-menton.



d. El combitube.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:

Seleccione una:



a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. ✓



b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.



c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.



d. El golpe precordial.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el aviso:

Seleccione una:

- ☒ a. Informar al centro coordinador o central. ✓
- ☐ b. Pedir un DESA/DEA.
- ☐ c. Solicitar servicio de bomberos de apoyo.
- ☐ d. Llamar al 061.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es motivo de exclusión del procedimiento de donante en asistolia:

Seleccione una:

- ☒ a. Neoplasias previas. ✓
- ☐ b. Más de 50 años de edad.
- ☐ c. Muerte no esperada.
- ☐ d. Accidente doméstico.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. El médico.
- ☐ b. El centro coordinador.
- ☒ c. El aspirador de secreciones. ✓
- ☐ d. El cardio-compresor.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP-A ¿A partir de que descarga se administra la Amiodarona?

Seleccione una:

- ☐ a. 15.
- ☐ b. 30.
- ☒ c. 3. ✓
- ☐ d. 5.

[Finalizar revisión](#)

CASO CLINICO

A nuestro servicio de urgencias hospitalarias, llega en un vehículo particular una mujer de unos 50 años de edad, que es pasada de inmediato por los celadores y personal de seguridad al cuarto de "parada" ya que dicen que NO respira, como primera enfermera asignada ese turno al cuarto de "parada" actuaremos:

Imagen 1: ECG/EKG

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Nuestra prioridad será:

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer el triaje.
- ☒ b. Valorar A-B-C-D. ✓
- ☐ c. Canalizar una vía venosa periférica de gran calibre.
- ☐ d. Avisar al médico adjunto responsable del cuarto de "parada".

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al valorar la "A" descubrimos que la vía aérea no esta permeable, cual no es una acción a tomar

Seleccione una:

- ☒ a. Poner oxígeno a alto flujo ✓
- ☐ b. Abrir vía aérea con maniobra frente menton si sabemos que no ha sufrido traumatismo alguno
- ☐ c. Abrir vía aérea con elevación mandibular ante la duda de posible traumatismo
- ☐ d. Colocar una canula orofaríngea

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una vez abierta la vía aérea y descartado el origen traumático de la situación, la paciente no respira, debemos entonces

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar 5 ventilaciones de rescate con la bolsa de reanimación
- ☐ b. Buscar el pulso carotídeo
- ☒ c. Iniciar RCP con compresiones torácicas - ventilaciones, relación 30:2 ✓
- ☐ d. Pedir un DESA/DEA

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un residente mayor de familia y comunitaria, curtido en mis batallas, ventila a la paciente con balón de reanimación con COF y aporte extra de oxígeno, mientras un celador realiza compresiones torácicas ¿Cuál es el siguiente paso a dar?

Seleccione una:

- ☒ a. Encender y colocar el monitor desfibrilador. ✓
- ☐ b. Coge la vía ya de una vez.
- ☐ c. Ir a buscar el cardiocompresor automático.
- ☐ d. Llamar al busca de UCI.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con el médico adjunto coordinando al equipo, la segunda enfermera del cuarto de "parada" canalizando hasta 2 vías venosas de grueso calibre, el celador con las compresiones torácicas y el residente mayor con la vía aérea y la ventilación, ¿Cuál es el siguiente punto de inflexión determinante para el resto de pasos a seguir?

Seleccione una:

- ☐ a. Obtener la muestra de sangre y cursar la analítica
- ☒ b. Determinar si estamos ante un ritmo desfibrilable o no ✓
- ☐ c. La intubación endotraqueal
- ☐ d. La lectura de capnometría

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El monitor (bifásico) identifica claramente una Fibrilación Ventricular, llegados a este punto

Seleccione una:

- ☒ a. Suspender las maniobras de RCP y cualquier otra manipulación de la paciente y desfibrilar a 200 Julios ✓
- ☐ b. Desfibrilar a 360 julios sin detener las compresiones torácicas
- ☐ c. Defibrilar a 50 julios
- ☐ d. Administrar adrenalina IV

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras el primer choque de 200 julios, aparece ritmo cardiaco de 70 lpm, tensión de 60/30 mmHg y respiración espontanea, pero con una SatO2 del 70%, que no nos plantearíamos

Seleccione una:

- ☐ a. Tomar medidas para mejorar la SatO2
- ☐ b. Actuar sobre la hipotensión
- ☒ c. Intubar de inmediato ✓
- ☐ d. Hacer un ECG/EKG de 12 derivaciones

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La oxigenación remonta con O2 adicional, la tensión se mantiene, pero la frecuencia cardiaca desciende a 40 lpm, en el ECG/EKG se ve esto (Imagen 1), el siguiente paso a seguir NO sería

Seleccione una:

- ☐ a. Prepararse para usar el marcapasos externo
- ☐ b. Preparar Atropina
- ☒ c. Administrar adrenalina IV en cualquier caso ✓
- ☐ d. Preparar sedoanalgesia, para IOT y uso marcapasos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La paciente despierta y al colocarle el marcapasos transcutaneo, su ritmo cardiaco se normaliza, oxigenación y tensión arterial, tambien mejoran. Es hora de

Seleccione una:

- ☐ a. Llamar a cardiologia



b. Pedir ingreso en UVI



c. Reevaluar el ABCDE y hacer la anamnesis de la paciente ✓



d. Apagar el marcapasos

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el ECG/EKG de control aparecen signos de isquemia cardiaca, por grupos de farmacos, cuales serían los indicados

Seleccione una:



a. Anticoagulantes, antiagregantes, vasodilatadores, analgesicos, protectores gastricos, antiemeticos y drogas vasoactivas (si precisa) ✓



b. "Antiagregantes", "nitricos", antiinflamatorios, antiemeticos y protectores gastricos



c. Anticoagulantes, vasoconstrictores y fluidos



d. Diureticos, antriagregantes-coagulantes, vasodilatadores, sedantes y emetizantes.

[Finalizar revisión](#)