

# Epidemiología y prevención de los cánceres de cabeza y cuello asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH)

<b>Comenzado el</b>	martes, 9 de febrero de 2021, 18:49
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 9 de febrero de 2021, 19:04
<b>Tiempo empleado</b>	15 minutos 28 segundos
<b>Puntos</b>	20,00/20,00
<b>Calificación</b>	10,00 de 10,00 (100%)

## Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

**Dentro de los cánceres de cabeza y cuello, los que están más fuertemente asociados al VPH son los de:**

Seleccione una:

- a. Las respuestas A y B son correctas
- b. Cavidad oral
- c. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 30%
- d. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 80%

### Retroalimentación

Respuesta correcta

## Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

**¿Si soy hombre o mujer que no se vacunó contra el VPH a la edad de vacunación sistemática, me puedo vacunar?**

Seleccione una:

- a. Las mujeres sí pero los hombres no
- b. Las mujeres no pero los hombres sí
- c. Sí, la vacuna está indicada tanto en hombres como mujeres
- d. No, la vacuna sólo está indicada en niñas de 9 a 14 años

### Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

**La evidencia de la eficacia y efectividad de la vacuna contra el VPH para prevenir la infección oral por VPH**

Seleccione una:

- a. Es limitada, con solo un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3%
- b. Es limitada, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- c. Es robusta, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

### Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**La estrategia de prevención primaria de los carcinomas de cabeza y cuello asociados al VPH se basa en**

Seleccione una:

- a. Actualmente aún no se dispone de ninguna estrategia efectiva de prevención primaria de los carcinomas de cabeza y cuello asociados al VPH
- b. La vacunación contra el VPH
- c. El uso del preservativo
- d. Las respuestas B y C son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **5**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**Cuál de las afirmaciones es correcta**

Seleccione una:

- a. Se está utilizando la detección de VPH-ADN en enjuague-gárgaras orales para la detección precoz del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- b. Se recomienda la detección de anticuerpos L1 o E6 frente al VPH16 para la detección precoz de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- c. Se recomienda la detección de anticuerpos E6 frente al VPH16 para la monitorización de pacientes diagnosticados de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- d. No existe en la actualidad ningún biomarcador viral (VPH) para el que se recomiende su uso como prevención secundaria y/o terciaria del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**El tipo de VPH que se haya con mayor frecuencia en la infección oral por VPH es**

Seleccione una:

- a. VPH 6
- b. VPHs 6 o 11
- c. VPH16
- d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**¿Se puede saber con certeza el momento exacto de la infección inicial por VPH oral?**

Seleccione una:

- a. No
- b. Sí, unos dos años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH
- c. Sí, unos diez años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH
- d. En algunos casos sí, en otros no

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**¿Qué porcentaje de la población general está infectada por VPH a nivel oral y qué porcentaje aclara/elimina la infección?**

Seleccione una:

- a. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- b. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- c. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- d. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**¿Qué posición ocupa el cáncer cabeza y cuello en cuanto a incidencia de nuevos casos de cáncer a nivel mundial?**

Seleccione una:

- a. La segunda
- b. La cuarta
- c. La sexta
- d. La décima

## Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**Los COFs asociados al VPH son más frecuentes en países**

Seleccione una:

- a. Del Sur de Europa como España
- b. Del Norte de Europa y Estados Unidos
- c. Las respuestas A y B son correctas
- d. De renta baja

## Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**¿Si tengo un cáncer de orofaringe causado por el VPH, implica que mi pareja también está infectada y tiene que realizar una visita extra al ginecólogo?**

Seleccione una:

- a. Tener una infección oral por VPH no implica necesariamente que tu pareja la tenga, pero sí debe realizar inmediatamente una visita con el ginecólogo para descartar
- b. Tener una infección oral por VPH no implica necesariamente que tu pareja la tenga ni que te haya sido infiel. No hay necesidad de realizar una visita extra al ginecólogo, pero es importante que realice las visitas regulares establecidas según el programa de cribado del cáncer de cuello uterino.
- c. Sí, seguramente su pareja esté infectada y debe pedir visita con el ginecólogo



d. Sí, seguramente su pareja esté infectada y probablemente te haya sido infiel

### Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

### En cuanto a las lesiones pre-malignas del área de cabeza y cuello

Seleccione una:



a. Las de la orofaringe asociadas al VPH son totalmente desconocidas



b. Se conocen las lesiones pre-neoplásicas de la orofaringe asociadas al VPH



c. Se desconocen las lesiones pre-malignas de la cavidad oral



d. Ninguna de las anteriores

### Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

### El rol del VPH en las lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral y en las displasias epiteliales orales

Seleccione una:



a. El VPH no juega ningún papel en las LPMMO y DEO



b. Todas las LPMMO y DEO son causadas por el VPH



c. Es controvertido, con prevalencias reportadas en la literatura en dichas lesiones entre el 0 y el 100%



d. Aproximadamente la mitad de las LPMMO y DEO son causadas por el VPH


### Retroalimentación

## Respuesta correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

**¿La PRR está causada por?**

Seleccione una:

- a. Por infección por VPH, tabaco o alcohol
- b. Por infección por VPH de tipo de alto riesgo oncogénico como el VPH16 o 18
- c. Por infección por VPHs 6 o 11
- d. Por exposición a tabaco y alcohol


## Retroalimentación

### Respuesta correcta

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

**Alguna de las lagunas de conocimiento en la historia natural de la infección oral por VPH y sus lesiones asociadas es**

Seleccione una:

- a. Establecer la relación causal entre el VPH y algunos carcinomas de cabeza y cuello
- b. Tener una idea de la prevalencia de gente sana con una infección oral por VPH
- c. Entender cómo y en qué países está aumentando la enfermedad de cabeza y cuello asociada al VPH
- d. No existen lagunas de conocimiento

## Retroalimentación

### Respuesta correcta

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**Que se debe tener en cuenta para plantear un programa de detección precoz de un cáncer**

Seleccione una:

- a. La incidencia de la enfermedad.
- b. Disponer de biomarcadores con sensibilidad y especificidad adecuada
- c. Que el programa reduzca la mortalidad y/o morbilidad
- d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**Los COFs asociados al VPH o al consumo de tabaco y alcohol...**

Seleccione una:

- a. Son tumores que se comportan de manera equivalente
- b. Representan tumores distintos a nivel clínico y molecular pero no epidemiológico
- c. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico pero no clínico y molecular
- d. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico, clínico y molecular

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**La incidencia (casos nuevos diagnosticados por 100,000 habitantes-año) de COFs asociados al VPH**

Seleccione una:

- a. Están en descenso
- b. Están en aumento en todo el mundo
- c. Están en aumento en algunos países del mundo
- d. Se mantienen estables

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **19**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**¿Cuáles son las principales lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral macroscópicamente reconocibles?**

Seleccione una:

- a. Los liquen planos orales
- b. Las leucoplaquias orales
- c. Las leucoplaquias orales y los liquen planos orales
- d. Las displasias orales epiteliales

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **20**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**Cuales son biomarcadores virales en estudio para la prevención secundaria y terciaria del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH**

Seleccione una:

- a. Sólo detección de VPH-ADN en sangre
- b. Sólo detección de anticuerpos E6 anti-VPH16 en sangre
- c. Detección de VPH-ADN en enjuagues-gárgaras orales, y detección de anticuerpos E6 anti-VPH16 en sangre
- d. Sólo detección de VPH-ADN en enjuagues-gárgaras orales

Retroalimentación

Respuesta correcta