

## MODULO IV

### Pregunta 1

Con respecto a la hipoglucemia neonatal todo lo siguientes es verdadero, excepto

- a. Nunca se debe interrumpir la lactancia materna
- b. Se diagnostica con niveles de glucemia inferiores a 45mg/dl
- c. El tratamiento es siempre intravenoso

### Pregunta 2

Con respecto a la pérdida de peso del recién nacido durante los primeros días de vida todo es cierto excepto una

- a. No deben darse suplementos con biberón
- b. Deben suplementarse siempre todas las tomas ante pérdida de peso de RN
- c. La administración de suplementos de forma esporádica está relacionada con intolerancia a las proteínas de la leche de vaca

### Pregunta 3

Con respecto a las características generales de las mastitis es falso que

- a. Se inician como consecuencia de retención de leche no resuelta
- b. Suelen presentarse en las primeras 12 semanas pero pueden ocurrir en cualquier momento de la lactancia
- c. Suelen ser bilaterales

### Pregunta 4

Con respecto al absceso mamario una respuesta NO es correcta

- a. Los síntomas son similares a los de la mastitis aunque el dolor es más intenso y se palpa una masa fluctuante
- b. Es una complicación de la lactancia a demanda
- c. Es una complicación de la mastitis

### Pregunta 5

Cuáles de las siguientes afirmaciones es más correcta

- a. La mastitis es generalmente bilateral y no se acompaña de síntomas sistémicos
- b. La mastitis es unilateral, el dolor y los signos inflamatorios son más intensos, los síntomas están más localizados y se acompaña de fiebre y malestar general
- c. La ingurgitación mamaria es unilateral, el dolor y los signos inflamatorios son más intensos, los síntomas están más localizados y se acompaña de fiebre y malestar general

#### Pregunta 6

Cual no es un factor predisponente de mastitis

- a. Presencia de grietas
- b. Uso de pezoneras
- c. Ingurgitación y obstrucción del conducto lácteo

#### Pregunta 7

Dentro de las complicaciones más frecuentes relacionadas con la madre durante la Lactancia Materna se encuentra

- a. Tamaño del pezón
- b. Dolor en pezones
- c. Frenillo

#### Pregunta 8

El tratamiento de la mastitis NO requiere

- a. Suspender la lactancia
- b. Iniciarse precozmente
- c. Antibióticos

#### Pregunta 9

El tratamiento del absceso mamario requiere todo lo siguiente, excepto una

- a. Antibióticos, analgésicos y vaciamiento frecuente de la mama
- b. Aspiración del contenido del absceso o cirugía
- c. Suspender la lactancia materna

#### Pregunta 10

El uso de pezoneras durante la Lactancia Materna

- a. Disminuye la estimulación del pezón
- b. Mejora el engancho
- c. Favorece la instauración de la Lactancia Materna

#### Pregunta 11

El uso de pezoneras es controvertido, ¿cuándo estaría indicado?

- a. Sólo utilizarlas con pezón plano
- b. No se deben utilizar con grietas
- c. Individualizar cada caso, y retirarlas lo antes posible

#### Pregunta 12

En la fisiología de la succión el ciclo adecuado para coordinar succión, deglución, respiración, sería

- a. Ambas respuestas son correctas
- b. 1/1/1
- c. 2/2/1

#### Pregunta 13

En relación a la prevención de la hipoglucemia del RN es verdadera

- a. Se deben suplementar todas las tomas hasta que la madre tenga la bajada de la leche
- b. Es necesario realizar control de glucemia en todos los recién nacidos a las 2 horas de vida
- c. Se debe vigilar la técnica de lactancia en todos los casos

#### Pregunta 14

Está aconsejado el uso de sacaleches para corregir la ingurgitación

- a. Siempre que la madre lo crea necesario **NO**
- b. En ningún caso se debe utilizar CORRECTA
- c. Sólo antes de la toma

#### Pregunta 15

Indica a través de qué acción podemos prevenir la aparición de mastitis

- a. Mantener una lactancia a demanda
- b. Podemos ayudar a la madre dejando al bebé en el nido durante la noche para favorecer el descanso
- c. Respetar la posición de amamantamiento aunque no sea adecuada

#### Pregunta 16

Indica cual no es una característica de ictericia neonatal

- a. Tiene progresión céfalo-caudal
- b. Es siempre patológica
- c. El diagnóstico es clínico

#### Pregunta 17

La Fiebre de Leche hace referencia a

- a. Ingurgitación mamaria
- b. Mastitis
- c. Obstrucción conducto mamario

#### Pregunta 18

Las causas de mastitis pueden ser

- a. Ambas son correctas
- b. Infecciosas
- c. No infecciosas

#### Pregunta 19

Las grietas en los pezones es una complicación que

- a. Su causa más frecuente es un mal enganche
- b. Mejoran con el uso de chupetes ya que corrigen la succión
- c. Son más frecuentes cuando ya se ha instaurado la Lactancia

#### Pregunta 20

Las recomendaciones de enfermería para el manejo de las grietas deben incluir

- a. Modificar la postura y adecuarla
- b. Empezar por el pecho sano, que no presente grietas
- c. Ambas son correctas

#### Pregunta 21

Se debe realizar controles de glucemia en todos los casos, excepto

- a. RN con síntomas de hipoglucemia (temblor, letargia, hipotonía, etc.)
- b. Peso al nacimiento menor de 2500gr o mayor de 4000gr
- c. Madre con hipotiroidismo

#### Pregunta 22

Si la madre presenta pezones invertidos utilizar la técnica de sándwich puede mejorar la Lactancia Materna

- a. La favorece
- b. Lo empeora
- c. Es indiferente

#### Pregunta 23

Todas son características de la ictericia fisiológica, excepto una

- a. Predominio de bilirrubina indirecta directa
- b. Polisintomática
- c. Presentación después de las primeras 24 horas de vida

#### Pregunta 24

Todas son complicaciones de la lactancia materna relacionadas con el recién nacido excepto una

- a. Pérdida de peso <10% en los primeros días de vida
- b. Disfunción motora
- c. Deshidratación hipernatremica

#### Pregunta 25

Una de estas afirmaciones respecto a la ictericia por leche materna es correcta

- a. Es una indicación de suspender la lactancia materna
- b. Es aparición tardía (segunda semana) y de duración prolongada (más de un mes)
- c. Se debe interrumpir la lactancia materna de forma transitoria para comprobarla