

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### *Enunciado de la pregunta*

Algunas de las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes que sufren una disección aórtica son:

Seleccione una:

- a. La mayoría son asintomáticas.
- b. Hipotensión arterial y mala perfusión periférica previa a la ruptura.
- c. Dolor torácico, siendo la manifestación mas común.
- d. Pulsos periféricos presentes, fuertes y simétricos

#### *Retroalimentación*

La respuesta correcta es: Dolor torácico, siendo la manifestación mas común.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### *Enunciado de la pregunta*

Algunos de los problemas de colaboración que pueden aparecer en pacientes con dolor torácico en urgencias, son:

Seleccione una:

- a. Retención urinaria, estreñimiento y aislamiento social.
- b. Insuficiencia cardiaca, arritmias y parada cardiorrespiratoria.
- c. Cansancio del rol de cuidador.
- d. Estrés por sobrecarga.

#### *Retroalimentación*

La respuesta correcta es: Insuficiencia cardiaca, arritmias y parada cardiorrespiratoria.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### *Enunciado de la pregunta*

De las relaciones expuestas a continuación en relación al tratamiento del SCACEST señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Estrategia de referfusión: ICP o fibrinólisis.
- b. Tratamiento antiisquémico: Nitroglicerina, calcioantagonistas.
- c. Tratamiento analgésico: morfina o meperidina
- d. Tratamiento antitrombótico: AAS + Clopidogrel

#### *Retroalimentación*

La respuesta correcta es: Tratamiento antiisquémico: Nitroglicerina, calcioantagonistas.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### *Enunciado de la pregunta*

Cuál de las siguientes NO es una característica del perfil del profesional que utiliza el SET

Seleccione una:

- a. Capacidad organizativa.
- b. Gestionar situaciones difíciles.
- c. Capacidad de tomar decisiones.
- d. Frialdad.

#### *Retroalimentación*

La respuesta correcta es: Frialdad.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál es el objetivo principal del triaje extrahospitalario en IMV

Seleccione una:

- a. Ninguna es correcta
- b. El triaje hospitalario prioriza al paciente menos grave.
- c. El triaje extrahospitalario prioriza al paciente que más recursos utiliza.
- d. El triaje extrahospitalario prioriza al paciente con más posibilidades de supervivencia que menos recursos requiere

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: El triaje extrahospitalario prioriza al paciente con más posibilidades de supervivencia que menos recursos requiere

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuándo el paciente al que estamos atendiendo presenta un problema de salud cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, estamos ante...

Seleccione una:

- a. Urgencia
- b. Emergencia Vital
- c. Desde un sistema de emergencias extrahospitalario no se atiende ese tipo de patologías.
- d. Catástrofe

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Urgencia

**Pregunta 7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Aquellos traslados en los que el paciente precisa asistencia técnico-sanitaria son:

Seleccione una:

- a. En todos los transportes sanitarios el paciente precisa asistencia técnico-sanitaria.
- b. Transporte No Asistido
- c. Transporte Asistido
- d. Ninguna de las anteriores son correctas.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Transporte Asistido

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Atendiendo al medio en el que se realiza el transporte sanitario se puede clasificar en:

Seleccione una:

- a. Transporte individual, colectivo, asistido y no asistido.
- b. Transporte individual, colectivo y No asistido
- c. Terrestre, Aéreo y Marítimo
- d. Transporte individual y Asistido

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Terrestre, Aéreo y Marítimo

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cuál sería el factor sobre el que habría que intervenir si el paciente manifiesta que no sabe qué hacer, cómo actuar...

Seleccione una:

- a. Incertidumbre
- b. Adaptación.
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. Desinformación

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Desinformación

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

A qué llamamos Servicio Integral de Urgencias y Emergencias

Seleccione una:

- a. Al conjunto de actividades complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos en el momento de la aparición del proceso.
- b. Conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.
- c. Al conjunto de actividades secuenciales dirigidas a optimizar la asistencia a pacientes no críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.
- d. Conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes no críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.

#### **Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Atendiendo a la clasificación clásica los modelos de atención de urgencias y emergencias son:

Seleccione una:

- a. Modelo angloamericano o modelo médico hospitalario y Modelo -alemán o modelo paramédico
- b. Modelo -alemán o modelo médico hospitalario
- c. Modelo angloamericano o modelo paramédico y Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario
- d. Modelo angloamericano o modelo paramédico

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Modelo angloamericano o modelo paramédico y Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

#### **Pregunta 12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Cuál es el modelo cuya premisa es evitar trasladar al paciente a los centros hospitalarios

Seleccione una:

- a. Las opciones 1 y 2 son correctas
- b. Opción 2: Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

c. Ninguna de las anteriores es correcta

d. Opción 1: Modelo angloamericano o modelo paramédico

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Opción 2: Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cómo se define la Calidad Asistencial en 1998 según el Consejo de Europa

Seleccione una:

a. Es el nivel de realización de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y de receptividad a las expectativas legítimas de la población.

b. Es el grado por el que lo servicios sanitarios asistenciales incrementan la posibilidad de resultados de salud deseados para individuos y poblaciones, en concordancia con el conocimiento profesional actual

c. Modelo de asistencia esperado para maximizar el nivel de bienestar del paciente una vez tenido en cuenta el balance de beneficios y pérdidas esperadas en todas las fases del proceso asistencial.

d. Grado por el que el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados y reduce las posibilidades de resultados indeseados considerando el estado de conocimientos actual.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Grado por el que el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados y reduce las posibilidades de resultados indeseados considerando el estado de conocimientos actual.

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál de las siguientes es una dificultad para que funcione el trabajo en equipo

Seleccione una:

- a. Algunos miembros presentan rigidez excesiva.
- b. Todas son dificultades.
- c. Falta de interés.
- d. Escasez de experiencia.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son dificultades.

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál de las siguientes no es una característica de la relación de ayuda empática

Seleccione una:

- a. Ayuda al otro.
- b. Que debe hacer en relación a que puede realizar
- c. Dirigido a la persona.
- d. Actitud directiva.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Actitud directiva.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Ante la sospecha de una OVACE grave en la que el paciente está inconsciente, cuál será su actuación

Seleccione una:

- a. Maniobra de Heimlich.
- b. Animarle a toser.
- c. Iniciaremos maniobras de RCP.
- d. Golpes interescapulares

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Iniciaremos maniobras de RCP.

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Ante un paciente inconsciente, en el que ha comprobado que no presenta pulso ni respiración, cuál será su primera actuación

Seleccione una:

- a. Confirmaremos que la escena es segura.
- b. Pedir ayuda al 112
- c. Buscar un DEA.
- d. Todas son incorrectas.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Confirmaremos que la escena es segura.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Ante una PCR cuando está indicado el uso de un DEA

Seleccione una:

- a. Siempre que disponga de un DEA.

- b. Ante PCR presenciadas.
- c. Ante PCR de adultos mayores de 25 años.
- d. Únicamente ante PCR con un ritmo desfibrilable

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Siempre que disponga de un DEA.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

A continuación aparecen una serie de fármacos que pueden usarse en el contexto de una arritmia en urgencias y emergencias junto a su indicación y la forma correcta de administrarlos. Seleccione la correcta.

Seleccione una:

- a. Adenosina - taquicardia- IV en bolo rápido/ Isoproterenol - Bradicardia - IV en perfusión.
- b. Adenosina - taquicardia- IV en perfusión / Isoproterenol - taquicardia - IV en perfusión.
- c. Adenosina - taquicardia- IV en bolo lento/ Isoproterenol - Bradicardia - IV en perfusión.
- d. Adenosina - taquicardia- IV en bolo lento/ Isoproterenol - taquicardia - IV en perfusión.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Adenosina - taquicardia- IV en bolo rápido/ Isoproterenol - Bradicardia - IV en perfusión.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Acude a urgencias un paciente pálido, sudoroso, hipotenso y aparentemente mal perfundido. Refiere dolor torácico y usted realiza un ECG en el que se aprecia una taquicardia regular a 190 latidos por minuto. Una vez aplicadas las medidas

generales (monitorización, oxigenoterapia, canalización de vía venosa periférica) cuál considera que sería el tratamiento de elección

Seleccione una:

- a. Si la taquicardia es de QRS estrecho realizaremos maniobras vagales.
- b. Adenosina IV, independientemente de cómo sea el QRS.
- c. Cardioversión eléctrica sincronizada, independientemente de cómo sea el QRS.
- d. Si la taquicardia es de QRS ancho realizaremos maniobras vagales.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Cardioversión eléctrica sincronizada, independientemente de cómo sea el QRS.

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Asegurar una monitorización continua del ECG, facilitar la realización de un ECG de 12 derivaciones, observar la frecuencia y la duración de la arritmia y monitorizar la respuesta hemodinámica a la arritmia son algunas de las actividades que se pueden encontrar dentro de la intervención:

Seleccione una:

- a. Autocontrol de la arritmia
- b. Manejo del riesgo cardiaco
- c. Disminución del gasto cardiaco.
- d. Manejo de la arritmia

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Manejo de la arritmia

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cuál de las siguientes no es una complicación potencial del edema agudo de pulmón

Seleccione una:

- a. Complicaciones tromboembólicas.
- b. Insuficiencia renal post renal por hipoperfusión periférica.
- c. Shock Cardiogénico. Se presenta en la etapa final de la disfunción ventricular izquierda.
- d. Infarto agudo de miocardio

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Insuficiencia renal post renal por hipoperfusión periférica.

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cuál de las siguientes no es una manifestación típica del edema agudo de pulmón

Seleccione una:

- a. Otorrrea, sibilancias y tos.
- b. Sudoración fría profusa y abundante.
- c. Inquietud, angustia y palidez cutánea.
- d. Disnea leve.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Disnea leve.

**Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no está indicada en el caso de un tromboembolismo pulmonary

Seleccione una:

- a. Coagulación con determinación del Dímero D
- b. Gammagrafía pulmonar
- c. Resonancia Magnética
- d. Eco Doppler

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Resonancia Magnética

**Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cuál de los siguientes fármacos no está indicado en el uso y manejo de una insuficiencia cardíaca aguda

Seleccione una:

- a. Vasodilatadores.
- b. Opiáceos
- c. Vasoconstrictores.
- d. Diuréticos.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Vasoconstrictores.

**Pregunta 26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál es el anticoagulante que necesita control estricto de INR para su administración

Seleccione una:

- a. Acenocumarol.
- b. Heparina no fraccionada.
- c. Ninguna es correcta.
- d. Heparina de bajo peso molecular.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Acenocumarol.

**Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

cuál es la fase de repolarización rápida, mediada por la salida rápida de potasio al exterior de la célula

Seleccione una:

- a. Fase 3
- b. Fase 1
- c. Fase 2
- d. Fase 0

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Fase 3

**Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Cuándo el estímulo eléctrico llega al nodo auriculoventricular, en el cual se produce un retraso fisiológico en la velocidad de conducción, esto corresponde en el ECG:

Seleccione una:

- a. complejo QRS
- b. Onda T
- c. Segmento PR
- d. onda P.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Segmento PR

**Pregunta 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

De qué profesionales y/o servicios están formados los Servicios Integrales de Urgencias y Emergencias

Seleccione una:

- a. Cuerpos de Rescate y Extinción de Incendios.
- b. Sistemas de Emergencias Sanitarias.
- c. Todos los anteriores.
- d. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

**Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Dentro de la Cartera de Servicios del SUMMA 112 podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Gestión del traslado convencional no medicalizado de pacientes.
- b. Coordinación y Traslado interhospitalario de pacientes críticos incluyendo el neonatal.
- c. Todas las anteriores.
- d. Regulación Médica y de Enfermería de las llamadas asistenciales.

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.