

Con qué término se corresponde la definición número de embarazos que presentarían 100 mujeres que utilizan un método anticonceptivo durante un año

Seleccione una:

- ☒ a. Eficiencia.
- ☐ b. Satisfacción.
- ☐ c. &IACUTE;ndice de Pearl.
- ☐ d. Prevalencia de embarazos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: &IACUTE;ndice de Pearl.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes se corresponde con un derecho fruto de la Declaración de los Derechos Sexuales promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual

Seleccione una:

- ☒ a. Derecho a la igualdad y a la discriminación por razones de raza.
- ☐ b. Derecho a información incomprensible.
- ☐ c. Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.
- ☐ d. Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo sin ser necesario el respeto a los derechos de los demás

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.

Pregunta **3**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el orden de las fases de la oogenesis

Seleccione una:

- ☒ a. Multiplicación, crecimiento y maduración.
- ☐ b. Crecimiento, multiplicación y maduración.
- ☐ c. Multiplicación, maduración y crecimiento.
- ☐ d. Crecimiento, maduración y multiplicación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Multiplicación, crecimiento y maduración.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la eficacia real de un método anticonceptivo

Seleccione una:

- ☐ a. La eficacia que presenta un método anticonceptivo utilizado en condiciones óptimas.
- ☒ b. Es en la que se tienen en cuenta los posibles errores de los usuarios.
- ☐ c. La eficacia real es igual a la teórica en todos los métodos anticonceptivos.
- ☐ d. La eficacia real se mide en situaciones de laboratorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es en la que se tienen en cuenta los posibles errores de los usuarios.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál no es función de las células sertoli

Seleccione una:

- ☒ a. Fagocitación de los espermatozoides.
- ☐ b. Controlar los movimientos de las células espermatogénicas.
- ☐ c. Secretan el líquido de transporte para los espermatozoides.
- ☐ d. Secretan inhibina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fagocitación de los espermatozoides.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las fases del ciclo menstrual a nivel de los ovarios

Seleccione una:

- ☒ a. Fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora.
- ☐ b. No existen fases a nivel de los ovarios, solo se a nivel del endometrio.
- ☐ c. Fase luteínica y fase menstrual.
- ☐ d. Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las glándulas sexuales accesorias del aparato reproductor masculino

Seleccione una:

- ☐ a. Glándula prostática, dos vesículas seminales, gónadas.
- ☐ b. Dos vesículas seminales, epidídimo, próstata.
- ☒ c. Dos vesículas seminales, próstata, glándulas de Cowper.
- ☐ d. Vesícula seminal, próstata, conducto deferente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dos vesículas seminales, próstata, glándulas de Cowper.

Pregunta **8**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dónde se encuentran las glándulas de Bartholino

Seleccione una:

- ☐ a. En el epidídimo.
- ☐ b. En el orificio uretral del varón.
- ☐ c. En el orificio uretral de la mujer.
- ☒ d. A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los beneficios contraceptivos y no contraceptivos de los métodos anticonceptivos, señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Evitan embarazos no deseados.
- ☐ b. Promueven el número de interrupciones voluntarias de embarazo.
- ☐ c. Las tasas de mortalidad en lactantes menores de un año aumentar debido a los intervalos intergenésicos amplios.
- ☐ d. Ningún método previene enfermedades de transmisión sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitan embarazos no deseados.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué año se publica la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Seleccione una:

- ☒ a. 2011
- ☐ b. 2010
- ☐ c. 2012
- ☐ d. 2013

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2011

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La planificación familiar

Seleccione una:

- ☐ a. Un Comité de Expertos de la OMS definió el término planificación familiar por primera vez en el año 1970.
- ☐ b. Se fundamenta en prácticas que ayudan a individuos o parejas a alcanzar determinados objetivos como pueden ser evitar nacimientos no deseados o regular los intervalos entre los embarazos.
- ☐ c. Actualmente la definición de planificación familiar queda integrada en el concepto de salud sexual y reproductiva.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es la capacitación espermática

Seleccione una:

- ☐ a. Es el primer proceso que sufre el espermatozoide, ocurre previo a la eyaculación.
- ☒ b. Es el último proceso que sufre el espermatozoide, ocurre tras la eyaculación, en el tracto genital femenino.
- ☐ c. Es el proceso de liberación del espermatozoide de las células sertoli.
- ☐ d. Produce una reconfiguración celular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el último proceso que sufre el espermatozoide, ocurre tras la eyaculación, en el tracto genital femenino.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué incluye la sexualidad

Seleccione una:



a. Identidad sexual.



b. Vinculación afectiva.



c. Género



d. La sexualidad abarca todo lo anterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sexualidad abarca todo lo anterior

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué temas no se deben abordar durante el consejo anticonceptivo

Seleccione una:



a. Variedad de métodos disponibles.



b. Como usar el método elegido.



c. Ventajas y desventajas de cada método.



d. Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. El uso de métodos anticonceptivos promueven el desarrollo de una sexualidad más libre, plena, satisfactoria y segura al no asociarse obligatoriamente relación sexual a reproducción.
- ☐ b. El uso de anticoncepción promueve la libre elección de maternidad/paternidad.
- ☒ c. El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto.
- ☐ d. Algunos anticonceptivos ayudan a la prevención de VIH/SIDA disminuyéndose así el contagio entre parejas serodiscordantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta respecto a la definición de Salud Sexual propuesta por la Asociación Mundial para la Salud Sexual

Seleccione una:

- ☒ a. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social.



b. Para lograr y mantener la salud sexual no es necesario respetar y proteger los derechos sexuales de todas las personas.



c. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad



d. Incluye la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para lograr y mantener la salud sexual no es necesario respetar y proteger los derechos sexuales de todas las personas.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en referencia al consejo anticonceptivo

Seleccione una:



a. Es una herramienta, internet, mediante el cual lo usuarios toman sus propias decisiones sobre salud reproductiva y planificación familiar.



b. Es una herramienta mediante la cual el clínico ayuda a los usuarios a tomar sus propias decisiones sobre salud reproductiva y planificación familiar



c. Debe ser un diálogo entre el clínico y el usuario



d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta respecto a los pasos durante el consejo anticonceptivo

Seleccione una:

- ☒ a. Generalmente consta de 6 pasos.
- ☐ b. El consejo anticonceptivo es un proceso, que consta de 6 pasos, y debe ser rígido para poder profundizar en la vida personal del usuario.
- ☐ c. Uno de los pasos es atender al usuario, prestándole atención solo en aquellos aspectos que sean de relevancia.
- ☐ d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Generalmente consta de 6 pasos.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación con las fases del ciclo menstrual a nivel del endometrio

Seleccione una:

- ☒ a. La fase menstrual surge como consecuencia de la disminución de la secreción hormonal ovárica.
- ☐ b. La fase proliferativa coincide con la fase luteínica del ovario.
- ☐ c. La fase secretora coincide con la fase folicular del ovario.
- ☐ d. Son dos fases: proliferativa y secretora

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fase menstrual surge como consecuencia de la disminución de la secreción hormonal ovárica.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según las últimas publicaciones, Cuál es el método anticonceptivo con el índice de Pearl más bajo y por tanto el método más eficaz

Seleccione una:

- ☒ a. Implante subdérmico.
- ☐ b. Esterilización tubárica.
- ☐ c. Essure.
- ☐ d. DIU medicado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Implante subdérmico.

MODULO II

Cuál de los siguientes es el método ideal para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en el adolescente

Seleccione una:

- ☒ a. Preservativo solo
- ☐ b. Anticoncepción hormonal sola
- ☐ c. Marcha atrás
- ☐ d. Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta en una mujer mayor de 40 años

Seleccione una:

- ☒ a. La fertilidad y las necesidades anticonceptivas.
- ☐ b. Los posibles riesgos ante un embarazo.
- ☐ c. La sintomatología en la perimenopausia.
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo puede iniciar la anticoncepción con DIU con levonorgestrel una madre que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☒ a. En las primeras 48 horas.
- ☐ b. Entre las 48 horas y las 4 semanas posparto es el momento más propicio.
- ☐ c. A partir de la cuarta semana.
- ☐ d. Está contraindicado el uso de DIU con levonorgestrel en una madre lactante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de la cuarta semana.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuánto tiempo debe esperar una mujer que da lactancia materna para poder usar anticonceptivos compuestos por estrógenos y progestágenos

Seleccione una:

- ☒ a. 6 meses.
- ☐ b. 6 semanas.
- ☐ c. No se establece ningún periodo de espera.
- ☐ d. Estas mujeres no pueden usar este tipo de anticonceptivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 meses.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo fundamental de la educación sexual en el adolescente es

Seleccione una:

- ☒ a. Fomentar la experimentación sexual si medidas de protección.
- ☐ b. Fomentar la intolerancia hacia toda relación distinta a la heterosexual.
- ☐ c. Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los métodos hormonales combinados en mujeres mayores de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. La vía de administración más común es la oral.
- ☐ b. Aunque no existen estudios que diferencien el índice de Pearl por grupos de edad, se cree que la eficacia de este tipo de anticoncepción es menor en mujeres perimenopáusicas.
- ☐ c. No existen estudios que indiquen que vía de administración es mejor para esta franja de edad.
- ☒ d. La respuesta a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta a y c son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al cese de anticonceptivos en las mujeres mayores de 40 años, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Si la usuaria consume anticonceptivos hormonales combinados o el inyectable compuesto solo por gestágenos, se recomienda su cese a los 50 años.
- ☐ b. De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve dos años de amenorrea si tiene más de 50 años.
- ☐ c. De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve un año de amenorrea si tiene más de 50 años.
- ☒ d. Las respuestas A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En referencia a la anticoncepción en mujeres mayores de 40 años, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Los metodos basados en el conocimiento de la fertilidad son los más aconsejados para esta etapa.
- ☐ b. El metodo mas utilizado en esta etapa es el coitus interruptus.
- ☒ c. Los metodos mas utilizados en esta etapa son los de barrera.
- ☐ d. Los anticonceptivos de barrera no interfieren en la sintomatología propia de la posmenopausia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los metodos mas utilizados en esta etapa son los de barrera.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conducta sexual del adolescente, por cuál de los siguientes factores está influenciada

Seleccione una:

- ☒ a. La discrepancia entre la madurez física y cognoscitiva
- ☐ b. La necesidad de dejar atrás su identidad de niño
- ☐ c. La percepción de invulnerabilidad
- ☐ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué aspecto debería tener el anticonceptivo ideal? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Debe tener elevada eficacia anticonceptiva.
- ☐ b. Debe carecer de efectos no deseados.
- ☒ c. No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia.
- ☐ d. No debe estar relacionado con el coito

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué métodos no se aconsejan iniciar en el posparto inmediato por la irregularidad de los ciclos menstruales

Seleccione una:

- ☐ a. Los preservativos.
- ☒ b. Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.
- ☐ c. El diafragma.
- ☐ d. El capuchón cervical

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe cumplir un anticonceptivo en una mujer que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☒ a. No debe alterar la cantidad ni la calidad de la leche materna.
- ☐ b. Puede tener algún efecto secundario en el recién nacido, pero debe ser leve.
- ☐ c. Debe mantener su eficacia anticonceptiva.
- ☒ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debes cumplir la anticoncepción en la adolescencia

Seleccione una:

- ☒ a. Debe ser un método eficaz en la prevención de embarazos.
- ☐ b. Debe ser reversible, el adolescente debe recuperar su fertilidad al suspender su uso.
- ☐ c. Debe ser un método seguro, es decir, que no represente un perjuicio para su salud
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que beneficios no anticonceptivos presenta la anticoncepción hormonal para el adolescente

Seleccione una:

- ☒ a. Mejor control del ciclo.
- ☐ b. Disminuye la dismenorrea.
- ☐ c. Mejora del acné y del hirsutismo.
- ☐ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la anticoncepción hormonal compuesta solo de gestágenos y a su uso en mujeres mayores de 40 años, señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.
- ☐ b. El DIU de levonorgestrel está indicado en aquellos casos en los que la mujer presenta disfunciones menstruales.
- ☐ c. Este tipo de anticoncepción se puede utilizar en mujeres con riesgo cardiovascular.



d. El DIU de levonorgestrel se puede usar para evitar cirugía mayor en mujeres con sangrados excesivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta

Seleccione una:



a. En la mayoría de las mujeres reaparece la menstruación entre los 45 y 64 días tras el parto.



b. La primera ovulación tras el parto se suele producir entre los 45 y 94 días.



c. Se han descrito casos de ovulación desde el día 25 tras el parto.



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en cuanto al uso de anticoncepción en mujeres mayores de 40 años

Seleccione una:



a. La eficacia de los DIU inertes disminuye a partir de los 40 años por el aumento del riesgo de expulsión.



b. Una mujer que decide utilizar un DIU inerte a partir de los 40 años no es necesario que se lo retire hasta la menopausia.



c. Si la menopausia se produce antes de los 50 años, el dispositivo debe retirarse tras un año de sangrado.



d. Si la menopausia se produce después de los 50 años, el dispositivo debe retirarse tras dos años de sangrado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una mujer que decide utilizar un DIU inerte a partir de los 40 años no es necesario que se lo retire hasta la menopausia.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta en cuanto al uso de la píldora postcoital por una mujer que está dando lactancia maternal

Seleccione una:



a. Es el método anticonceptivo de elección.



b. No lo puede usar.



c. La Organización Mundial de la Salud la clasifica en categoría 1.



d. La Organización Mundial de la salud la clasifica en categoría 2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Organización Mundial de la Salud la clasifica en categoría 1.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta

Seleccione una:



a. Los DIU-CU se pueden insertar en las primeras 48 horas tras el parto sin importar el tipo de alimentación del recién nacido.



b. Los espermicidas se pueden usar en cualquier momento tras el parto.



c. La ligadura de trompas se puede realizar a partir del séptimo día tras el parto.



d. Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia maternal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia maternal

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS entre que años está delimitada la PREADOLESCENCIA

Seleccione una:



a. De 25 a 30 años



b. De 7 a 9 años



c. De 10 a 14 años



d. De 18 a 22 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 10 a 14 años

Cuál de los siguientes es el método ideal para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en el adolescente

Seleccione una:

- ☐ a. Preservativo solo
- ☐ b. Anticoncepción hormonal sola
- ☐ c. Marcha atrás
- ☒ d. Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M)

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta en una mujer mayor de 40 años

Seleccione una:

- ☒ a. La fertilidad y las necesidades anticonceptivas.
- ☐ b. Los posibles riesgos ante un embarazo.
- ☐ c. La sintomatología en la perimenopausia.
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo puede iniciar la anticoncepción con DIU con levonorgestrel una madre que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras 48 horas.
- ☐ b. Entre las 48 horas y las 4 semanas posparto es el momento más propicio.
- ☒ c. A partir de la cuarta semana.
- ☐ d. Está contraindicado el uso de DIU con levonorgestrel en una madre lactante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de la cuarta semana.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuánto tiempo debe esperar una mujer que da lactancia materna para poder usar anticonceptivos compuestos por estrógenos y progestágenos

Seleccione una:

- ☒ a. 6 meses.
- ☐ b. 6 semanas.
- ☐ c. No se establece ningún periodo de espera.
- ☐ d. Estas mujeres no pueden usar este tipo de anticonceptivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 meses.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo fundamental de la educación sexual en el adolescente es

Seleccione una:

- ☐ a. Fomentar la experimentación sexual si medidas de protección.
- ☐ b. Fomentar la intolerancia hacia toda relación distinta a la heterosexual.
- ☐ c. Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los métodos hormonales combinados en mujeres mayores de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. La vía de administración más común es la oral.
- ☐ b. Aunque no existen estudios que diferencien el índice de Pearl por grupos de edad, se cree que la eficacia de este tipo de anticoncepción es menor en mujeres perimenopáusicas.
- ☐ c. No existen estudios que indiquen que vía de administración es mejor para esta franja de edad.
- ☒ d. La respuesta a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta a y c son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al cese de anticonceptivos en las mujeres mayores de 40 años, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Si la usuaria consume anticonceptivos hormonales combinados o el inyectable compuesto solo por gestágenos, se recomienda su cese a los 50 años.
- ☐ b. De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve dos años de amenorrea si tiene más de 50 años.
- ☐ c. De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve un año de amenorrea si tiene más de 50 años.
- ☒ d. Las respuestas A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En referencia a la anticoncepción en mujeres mayores de 40 años, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Los metodos basados en el conocimiento de la fertilidad son los más aconsejados para esta etapa.
- ☐ b. El metodo mas utilizado en esta etapa es el coitus interruptus.
- ☐ c. Los metodos mas utilizados en esta etapa son los de barrera.
- ☒ d. Los anticonceptivos de barrera no interfieren en la sintomatología propia de la posmenopausia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los metodos mas utilizados en esta etapa son los de barrera.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conducta sexual del adolescente, por cuál de los siguientes factores está influenciada

Seleccione una:

- ☐ a. La discrepancia entre la madurez física y cognoscitiva
- ☐ b. La necesidad de dejar atrás su identidad de niño
- ☐ c. La percepción de invulnerabilidad
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué aspecto debería tener el anticonceptivo ideal? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Debe tener elevada eficacia anticonceptiva.
- ☐ b. Debe carecer de efectos no deseados.
- ☒ c. No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia.
- ☐ d. No debe estar relacionado con el coito

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué métodos no se aconsejan iniciar en el posparto inmediato por la irregularidad de los ciclos menstruales

Seleccione una:

- ☐ a. Los preservativos.
- ☒ b. Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.
- ☐ c. El diafragma.
- ☐ d. El capuchón cervical

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe cumplir un anticonceptivo en una mujer que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☒ a. No debe alterar la cantidad ni la calidad de la leche materna.
- ☐ b. Puede tener algún efecto secundario en el recién nacido, pero debe ser leve.
- ☐ c. Debe mantener su eficacia anticonceptiva.
- ☐ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debes cumplir la anticoncepción en la adolescencia

Seleccione una:

- ☐ a. Debe ser un método eficaz en la prevención de embarazos.
- ☐ b. Debe ser reversible, el adolescente debe recuperar su fertilidad al suspender su uso.
- ☐ c. Debe ser un método seguro, es decir, que no represente un perjuicio para su salud
- ☐ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que beneficios no anticonceptivos presenta la anticoncepción hormonal para el adolescente

Seleccione una:

- ☐ a. Mejor control del ciclo.
- ☐ b. Disminuye la dismenorrea.
- ☐ c. Mejora del acné y del hirsutismo.



d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la anticoncepción hormonal compuesta solo de gestágenos y a su uso en mujeres mayores de 40 años, señale la incorrecta

Seleccione una:



a. Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.



b. El DIU de levonorgestrel está indicado en aquellos casos en los que la mujer presenta disfunciones menstruales.



c. Este tipo de anticoncepción se puede utilizar en mujeres con riesgo cardiovascular.



d. El DIU de levonorgestrel se puede usar para evitar cirugía mayor en mujeres con sangrados excesivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. En la mayoría de las mujeres reaparece la menstruación entre los 45 y 64 días tras el parto.
- ☐ b. La primera ovulación tras el parto se suele producir entre los 45 y 94 días.
- ☐ c. Se han descrito casos de ovulación desde el día 25 tras el parto.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en cuanto al uso de anticoncepción en mujeres mayores de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. La eficacia de los DIU inertes disminuye a partir de los 40 años por el aumento del riesgo de expulsión.
- ☒ b. Una mujer que decide utilizar un DIU inerte a partir de los 40 años no es necesario que se lo retire hasta la menopausia.
- ☐ c. Si la menopausia se produce antes de los 50 años, el dispositivo debe retirarse tras un año de sangrado.
- ☐ d. Si la menopausia se produce después de los 50 años, el dispositivo debe retirarse tras dos años de sangrado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una mujer que decide utilizar un DIU inerte a partir de los 40 años no es necesario que se lo retire hasta la menopausia.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta en cuanto al uso de la píldora postcoital por una mujer que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☐ a. Es el método anticonceptivo de elección.
- ☐ b. No lo puede usar.
- ☒ c. La Organización Mundial de la Salud la clasifica en categoría 1.
- ☐ d. La Organización Mundial de la salud la clasifica en categoría 2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Organización Mundial de la Salud la clasifica en categoría 1.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. Los DIU-CU se pueden insertar en las primeras 48 horas tras el parto sin importar el tipo de alimentación del recién nacido.
- ☐ b. Los espermicidas se pueden usar en cualquier momento tras el parto.
- ☐ c. La ligadura de trompas se puede realizar a partir del séptimo día tras el parto.
- ☐ d. Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia

materna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia materna

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS entre que años está delimitada la PREADOLESCENCIA

Seleccione una:

- ☐ a. De 25 a 30 años
- ☐ b. De 7 a 9 años
- ☒ c. De 10 a 14 años
- ☐ d. De 18 a 22 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 10 a 14 años

MODULO IV

En qué categoría clasifica la OMS a los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad

Seleccione una:

- ☒ a. Categoría 1
- ☐ b. Categoría 2
- ☐ c. Categoría 3
- ☐ d. Categoría 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Categoría 1

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con cáncer de cérvix el uso del DIU de cobre en qué categoría se clasifica según la OMS

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☒ d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con una enfermedad grave del hígado, cual de los siguientes anticonceptivos se recomendaría en primer lugar

Seleccione una:

- ☐ a. Parche transdérmico.
- ☒ b. DIU de Cobre
- ☐ c. Anticoncepción hormonal oral de solo progestágenos.
- ☐ d. Anillo vaginal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: DIU de Cobre

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una Mujer mayor de 35 años, fumadora de más de 15 cigarros al día, cual de los siguientes métodos anticonceptivos NO estaría indicado

Seleccione una:

- ☐ a. DIU de cobre
- ☐ b. Anticoncepción de solo progesterona
- ☒ c. Anticoncepción hormonal combinada.
- ☐ d. Preservativo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticoncepción hormonal combinada.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer nulípara, el uso de cualquier tipo de DIU en que categoría de recomendación se incluiría según la OMS

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer que padece migrañas con aura, cual de los siguientes anticonceptivos estaría contraindicado su uso

Seleccione una:

- ☒ a. Anillo vaginal
- ☐ b. Implante subcutáneo
- ☐ c. DIU de cobre
- ☐ d. DIU de Levonogestrel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anillo vaginal

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique en categoría 1 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☒ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☐ c. Se contraindica por completo su uso.
- ☐ d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 2 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☒ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☐ c. Se contraindica por completo su uso.
- ☐ d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe

haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 3 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☒ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☐ c. Se contraindica por completo su uso.



d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 4 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:



a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.



b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.



c. Se contraindica por completo su uso.



d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se contraindica por completo su uso.

CASO I

Ante la combinación de 3 riesgos: edad mayor de 35 años, uso de anticoncepción hormonal y fumadora, se le advierte del riesgo cardiovascular que presenta, Qué opciones le recomendarías

Seleccione una:



a. Dejar el hábito tabáquico.



b. Cambiar el método anticonceptivo.



c. Las dos son correctas



d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las dos son correctas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la consulta la mujer refiere estar cansada de tomar todos los días una pastilla y tener miedo a los olvidos, además, no sabe cuando buscará embarazo pero seguramente sea en un plazo inferior a dos años. Ante esta información, Cuál crees que será la vía de administración más adecuada para la usuaria

Seleccione una:



a. Inyección intramuscular trimestral.



b. Vía oral.



c. DIU de progesterona.



d. Implante subdérmico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inyección intramuscular trimestral.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la decisión de la mujer de usar anticoncepción hormonal sin estrógenos, y si no deseara quedarse embarazada en los próximos 5 años, que métodos recomendarías:

Seleccione una:



a. Píldora oral diaria.



b. Implante subdérmico.



c. Inyección intramuscular trimestral.



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué otros métodos podría utilizar esta usuaria sin aumentar los riesgos cardiovasculares y considerando que no se quiera quedar embarazada en un horizonte de 3-5 años?

Seleccione una:



a. Métodos de barrera.



b. Inyección mensual.



c. DIU de cobre.



d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si finalmente la mujer decide cambiar de método. De las siguientes opciones, Cuál le recomendarías

Seleccione una:



a. Uso del anillo vaginal.



b. Anticoncepción hormonal sin estrógenos.



c. Parche transdérmico.



d. Essure

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticoncepción hormonal sin estrógenos.

CASO II

A la usuaria, que se encuentra en la semana 3 posparto, se le explican todos los métodos recomendables en su caso y se decanta en un primer momento por el uso de dispositivos intrauterinos. Señale la correcta

Seleccione una:



a. Al estar en la tercera semana, los DIU deben ser descartado pues su inserción solo debe realizarse en las primeras 48 horas tras el nacimiento del bebé.



b. Debe esperar a la cuarta semana para proceder a la inserción del DIU.



c. Está totalmente contraindicado el uso de dispositivos intrauterinos en primíparas.



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe esperar a la cuarta semana para proceder a la inserción del DIU.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Después de explicarle los beneficios y efectos secundarios de estos contraceptivos y su duración de 5 años plantea que desea un nuevo embarazo y que esperar 5 años le parece excesivo. ¿Qué otras opciones tenemos?

Seleccione una:

- ☒ a. La píldora diaria compuesta por gestágenos.
- ☐ b. La inyección intramuscular trimestral.
- ☐ c. El implante subdérmico.
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué una mujer que está dando lactancia materna exclusiva no debería tomar anticoncepción hormonal combinada los primeros 6 meses tras el parto?

Seleccione una:

- ☐ a. No existe tal contraindicación.
- ☐ b. Los estrógenos disminuyen la producción de leche y la duración de la lactancia.
- ☐ c. Los progestágenos disminuyen la producción de leche y la duración de la lactancia.
- ☒ d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los estrógenos disminuyen la producción de leche y la duración de la lactancia.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué contraceptivos le podríamos recomendar

Seleccione una:

- ☐ a. Método basado en el conocimiento sobre la fertilidad (métodos naturales).
- ☐ b. Método MELA.
- ☐ c. Anillo vaginal.
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al implante subdérmico, señale la opción correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El comercializado en España actualmente dura 3 años y está compuesto por una sola varilla.
- ☐ b. Hay dos tipos de implantes, el que dura 3 años y el que dura 5 años. Ambos se comercializan en España.
- ☐ c. Una vez que se ponga el implante, la producción de leche materna se verá comprometida.
- ☐ d. Uno de los beneficios de este tipo de anticoncepción es que regula el ciclo menstrual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El comercializado en España actualmente dura 3 años y está compuesto por una sola varilla.

MODULO V

Contraindicaciones para la realización de interrupciones instrumentales de la gestación

Seleccione una:



a. Alteraciones anatómicas del útero.



b. Conización del cérvix



c. Patología tumorales del útero



d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes es una complicación mayor de una interrupción del embarazo

Seleccione una:



a. Adherencias cérvico-uterinas



b. Desgarro cervical



c. Enfermedad Inflamatoria pélvica



d. Perforación uterina no complicada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad Inflamatoria pélvica

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

cuál de los siguientes supuestos el aborto queda despenalizado según la Ley orgánica 9/1985 de reforma del aborto

Seleccione una:



a. Que exista un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, sin límite de tiempo en la gestación.



b. Que el embarazo sea como consecuencia de un delito de violación, hasta las 12 semanas de gestación y debe existir denuncia.



c. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas (hasta la semana 22 de gestación).



d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el método farmacológico más ampliamente utilizado en todo el mundo para la interrupción del embarazo

Seleccione una:



a. Metrotrexate + misoprostol



b. Mifepristona + misoprostol



c. Misoprostol solo



d. Estrógenos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Misoprostol solo

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál se considera el texto más antiguo en el que se habla de aborto

Seleccione una:

- ☐ a. Papiro de Ebers.
- ☐ b. Antiguo testamento.
- ☒ c. Código Hammurabi.
- ☐ d. Nuevo testament

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Código Hammurabi.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo delimita la Organización Mundial de la Salud la viabilidad del embrión

Seleccione una:

- ☐ a. Embrión o feto cuyo peso sea igual o menor a 500 gramos.
- ☐ b. Gestación inferior a 20 semanas.
- ☐ c. Todas falsas.
- ☒ d. Todas correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes es un método para realizar una interrupción del embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. Métodos farmacológicos
- ☐ b. Métodos instrumentales
- ☐ c. Métodos quirúrgicos
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es el método farmacológico más cómodo para la mujer en la interrupción del embarazo en el primer trimestre

Seleccione una:

- ☐ a. Metotrexate + misoprostol
- ☒ b. Mifepristona + misoprostol
- ☐ c. Misoprostol solo
- ☐ d. Oxitocina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mifepristona + misoprostol

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales son las complicaciones más frecuentes de un aborto

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia
- ☐ b. Esterilidad
- ☒ c. Infecciones
- ☐ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de interrupción farmacológica de las gestación nos referimos a

Seleccione una:

- ☐ a. La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino.
- ☐ b. Los que se llevan a cabo a través de la pared abdominal mediante incisión quirúrgica, como son la histerotomía o microcesárea.
- ☒ c. La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino.
- ☐ d. Todos los anteriores son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de métodos instrumentales en la realización de un IVE nos referimos a

Seleccione una:



a. La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino.



b. Los que se llevan a cabo a través de la pared abdominal mediante incisión quirúrgica, como son la histerotomía o microcesárea.



c. La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino.



d. Todos los anteriores son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El límite para la viabilidad de un feto o embrión que establece la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) es la misma que la que establece la Organización Mundial de la Salud

Seleccione una:



a. Si



b. La SEGO establece como límite la semana 22.



c. La SEGO establece como límite la semana 24



d. La SEGO establece como límite la semana 25

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La SEGO establece como límite la semana 22.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la interrupción farmacológica del embarazo del segundo trimestre, cuál de las siguientes es la dosis correcta de Misoprostol solo

Seleccione una:

- ☒ a. 800
- ☐ b. 600
- ☐ c. 400
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hasta que edad gestacional se podría practicar un aborto si existe riesgo para la salud de la embarazada, según la ley orgánica 2/2010 de SSR y de la interrupción voluntaria del embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. 14
- ☒ b. 22
- ☐ c. 10
- ☐ d. 5

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 22

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La elección del método para la realización de la interrupción del embarazo se basa en

Seleccione una:

- ☐ a. Las semanas de gestación
- ☐ b. Características de la mujer
- ☐ c. Características del embarazo
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Precauciones para la realización de interrupciones instrumentales de la gestación

Seleccione una:

- ☐ a. Precaución en el segundo trimestres si existe una cirugía previa uterina.
- ☒ b. Conización del cérvix.
- ☐ c. Existencia de IVE previo
- ☐ d. Edad mayor de 35 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Precaución en el segundo trimestres si existe una cirugía previa uterina.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué complicaciones menores puedes aparecer tras la realización de un aborto

Seleccione una:

- ☐ a. Adherencias cérvico-uterinas.
- ☐ b. Perforación uterina no complicada.
- ☐ c. Reintervención no urgente
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué se entiende por ley de supuestos

Seleccione una:

- ☐ a. Leyes que consideran que el aborto provocado es un delito, salvo en algunos supuestos recogidos en la Ley en los que estaría despenalizado.
- ☐ b. Leyes que consideran que el aborto provocado es un derecho de la mujer, salvo en algunos supuestos recogidos en la Ley en los que estaría despenalizado.
- ☐ c. Leyes las cuales se rigen por el principio de que el aborto es un derecho de la mujer, y el Estado debe garantizar la libertad de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva.
- ☐ d. las cuales se rigen por el principio de que el aborto es un delito, y el Estado debe garantizar la libertad de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Leyes que consideran que el aborto provocado es un delito, salvo en algunos supuestos recogidos en la Ley en los que estaría despenalizado.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta

Seleccione una:



a. La interrupción voluntaria de embarazo (IVE) se define como la terminación de la gestación sin esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto o aborto.



b. Las técnicas que se utilizan para la práctica del IVE siempre son las mimas.



c. Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística el grupo de edad que más frecuentemente se somete a IVE son las mujeres de 20 a 24 años.



d. La respuesta A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta A y C son correctas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la ley orgánica 2/2010 de SSR y de la interrupción voluntaria del embarazo, hasta que edad gestacional una mujer puede abortar libremente

Seleccione una:



a. 30



b. 10



c. 14



d. 28

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 14