

Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo Introdutorio](#)
5. [Pretest](#)

Comenzado el domingo, 21 de julio de 2019, 10:55

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 21 de julio de 2019, 11:16

Tiempo empleado 21 minutos 18 segundos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)


Esta prueba tiene por objetivo evaluar el conocimiento previo del alumno sobre la

Comentario - materia del curso. Puede continuar con el curso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la finalidad última del triaje?

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las anteriores.
- ☐ b. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- ☒ c. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- ☐ d. Tomar los datos del niño para su identificación.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño?

Seleccione una:

- ☐ a. Para su ingreso en planta o en la UCI.
- ☐ b. Para llevarlo a quirófano.
- ☐ c. Para la realización de técnicas diagnósticas.
- ☒ d. Para aumentar la comodidad del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño?

Seleccione una:

- ☐ a. 90 - 100 lpm.
- ☒ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. 70 - 90 lpm.
- ☐ d. 100 - 120 lpm.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, ¿qué debemos realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz.
- ☒ b. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las opciones son incorrectas
- ☒ b. Bradipnea
- ☐ c. Polipnea
- ☐ d. Taquipnea


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario, la actuación de enfermería es correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Dejar el niño en la sala de espera hasta que tengamos una muestra de orina.

- ☒ b. Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Si se considera oportuna canalizar una vía venosa de calibre normal.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbón?

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Al 50%.
- ☒ c. Al 100%.
- ☐ d. Al 21%, oxígeno ambiental.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100%.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo definimos el casi - ahogamiento?

Seleccione una:

- ☒ a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

- ☐ b. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h.
- ☐ c. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO₂ del 100% usando un flujo de entre 6-15 l/min?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Mascarilla Venturi.
- ☐ c. Mascarilla simple.
- ☒ d. Mascarilla con reservorio.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración de enemas, indique el correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.
- ☒ c. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- ☐ d. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE


1. [Área personal](#)
2. Mis cursos
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 1: Organización y estructura de la urgencia pediátrica](#)
5. [Examen Módulo 1](#)

Comenzado el	domingo, 21 de julio de 2019, 11:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 21 de julio de 2019, 11:51
Tiempo empleado	7 minutos 48 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la finalidad última del triaje?

Seleccione una:

- ☒ a. Tomar los datos del niño para su identificación.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores.
- ☒ c. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- ☐ d. Diagnosticar la enfermedad del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño?

Seleccione una:

- ☐ a. Para su ingreso en planta o en la UCI.
- ☐ b. Para la realización de técnicas diagnósticas.
- ☐ c. Para llevarlo a quirófano.
- ☒ d. Para aumentar la comodidad del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- ☐ a. La identificación del paciente.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- ☐ d. El procedimiento a realizar.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:
Seleccione una:

- ☐ a. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.
- ☐ b. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- ☒ c. Informar a admisión de su traslado.
- ☐ d. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:
Seleccione una:

- ☐ a. El personal adecuado para el acompañamiento.
- ☐ b. Comunicación y coordinación previa.
- ☒ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. El material adecuado para el traslado.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:
Seleccione una:

- ☐ a. CTAS.
- ☒ b. PETAS.
- ☐ c. MAT.
- ☐ d. ESI.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un objetivo del triaje:

Seleccione una:

- ☐ a. Mejorar la calidad de atención del servicio.
- ☐ b. Diferenciar los casos urgentes.
- ☐ c. Asignar el área más adecuada para la atención del paciente.
- ☒ d. Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso?

Seleccione una:

- ☐ a. No apuntar las constantes a la llegada.
- ☐ b. No conectarlo a la red.
- ☐ c. No revisar el estado del paciente.
- ☒ d. Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acciones no debemos llevar a cabo en la urgencia pediátrica para asegurar la seguridad de paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Vigilancia de las úlceras por presión.
- ☐ b. Prevención de la infección.
- ☐ c. Identificación del paciente.
- ☐ d. Prevención de accidentes.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilancia de las úlceras por presión.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué consideración hay que tener en cuenta con las balas de oxígeno antes de realizar el traslado?

Seleccione una:

- ☐ a. Su capacidad.
- ☒ b. Su autonomía.
- ☐ c. Su tamaño.
- ☐ d. Su peso.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su autonomía.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.
- ☐ b. Verificar que tiene batería suficiente.
- ☒ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. Verificar su correcto funcionamiento.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué debemos considerar a la hora de realizar un transporte interhospitalario según el medio de transporte?

Seleccione una:

- ☐ a. La comodidad del paciente.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. La distancia a recorrer.
- ☐ d. La dotación del hospital.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La distancia a recorrer.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué dotación de enfermería debe tener el servicio de urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- ☐ a. Un enfermero por cada 30-40 visitas diarias y un enfermero de triaje.
- ☒ b. Todas las anteriores son correctas.
- ☐ c. Un auxiliar por cada 40-50 visitas diarias y uno en observación por cada seis pacientes.
- ☐ d. La relación enfermera-auxiliar deberá ser 2/1.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico?

Seleccione una:

- ☐ a. El diagnóstico.
- ☒ b. El riesgo vital.
- ☐ c. El tratamiento.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo vital.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué no se debe tener en cuenta en el diseño de las áreas del servicio de urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- ☐ a. La iluminación natural.
- ☒ b. El tamaño del hospital.
- ☐ c. El nivel acústico adecuado.
- ☐ d. Puertas con materiales transparentes.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tamaño del hospital.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué se evalúa en el triángulo de evaluación pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. La respiración.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. La apariencia.
- ☐ d. La circulación.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tiempo se considera recomendable de experiencia para trabajar en las urgencias pediátricas?

Seleccione una:

- ☒ a. 2 años para enfermería y 3 para médicos.
- ☐ b. Al menos 3 años tanto para médicos como para enfermería.

- ☐ c. No es necesaria una experiencia previa.
- ☐ d. 3 años para enfermería y 2 para médicos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de check list debíamos de realizar previo al traslado de un paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Las cosas a verificar a la recepción del paciente de nuevo en las urgencias.
- ☐ b. Comprobaciones a realizar previas al mismo.
- ☐ c. Acciones a realizar antes del traslado.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala canadiense, el paciente en situación no urgente que generalmente no requiere ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica, corresponde al nivel:

Seleccione una:

- ☐ a. I.
- ☒ b. V.
- ☐ c. IV
- ☐ d. III.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: V.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la situación vital del paciente para el traslado interhospitalario, el transporte puede ser (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. Transporte demorable.
- ☒ b. Transporte normal.
- ☐ c. Transporte urgente.
- ☐ d. Transporte de emergencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte normal.

Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE


1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 2: Reanimación cardiopulmonar pediátrica](#)
5. [Examen Módulo 2](#)

Comenzado el	domingo, 21 de julio de 2019, 11:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 21 de julio de 2019, 12:01
Tiempo empleado	8 minutos 56 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño?

Seleccione una:

- ☐ a. 70 - 90 lpm.
- ☒ b. 100 - 120 lpm.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. 90 - 100 lpm.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, ¿qué debemos realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ b. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz.
- ☒ c. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.
- ☐ d. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:

- ☐ a. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.
- ☐ b. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.
- ☐ c. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.
- ☒ d. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. Vía intraósea.
- ☒ b. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Vía venosa central.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:

- ☐ a. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Son completamente distintas.
- ☒ d. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. 9 J/Kg.
- ☒ b. 4 J/kg.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. 5 J/Kg.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera acción a realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Comprobar si late el corazón.
- ☒ b. Asegurar la seguridad del niño.

- ☐ c. Comprobar si respira.
- ☐ d. Verificar el estado de consciencia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar la seguridad del niño.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla laríngea.
- ☐ b. Cánula orofaríngea.
- ☒ c. Intubación traqueal.
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación traqueal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los principios básicos de la ética? Señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Autonomía.
- ☐ b. No maleficencia.
- ☒ c. Independencia.
- ☐ d. Beneficencia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo no finalizaremos maniobras de RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando el reanimador esté exhausto o en grave peligro.
- ☒ b. Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos.
- ☐ c. Cuando haya signos evidentes de muerte biológica.
- ☐ d. Cuando haya por escrito una orden de no reanimar y se compruebe su existencia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo mejora los resultados de la RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada.
- ☐ b. Cuando se inicia la RCP básica en menos de 8 minutos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico?

Seleccione una:

- ☐ a. En la base de las costillas.
- ☒ b. Un través de dedo por encima del apéndice xifoides.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. En la zona abdominal superior.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un través de dedo por encima del apéndice xifoides.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué características no debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. El carro se debe mover fácilmente, debe tener cajones y carteles bien visibles y de fácil utilización.
- ☒ b. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización.
- ☐ c. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente.
- ☐ d. El material debe estar fácilmente visible y ordenado.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la reanimación cardiopulmonary?

Seleccione una:

- ☐ a. Es un procedimiento médico de trabajo.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores no es correcta.
- ☐ c. Es un consenso internacional.
- ☒ d. Un conjunto de técnicas y maniobras.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de técnicas y maniobras.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.
- ☐ c. Lo colocaremos en posición de seguridad.
- ☒ d. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medicación de las siguientes es obligatoria en un carro de parada?

Seleccione una:

- ☐ a. Paracetamol.
- ☒ b. Adrenalina.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Nolotil.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión.
- ☒ c. Debe ser revisable.
- ☐ d. No es necesario que la orden esté por escrito.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tenemos que hacer si tras estimular el niño no responde?

Seleccione una:

- ☒ a. Abrir la vía aérea del niño extendiendo su cabeza y elevando su mandíbula.
- ☐ b. Mover al niño con cuidado y colocarlo en decúbito supino.

☒ c. Todas las opciones son correctas.

☐ d. Gritar pidiendo ayuda.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, ¿qué maniobra realizaremos?
Seleccione una:

☐ a. Ninguna de las opciones son correctas.

☐ b. No intentaremos abrir la vía aérea.

☒ c. Realizaremos la tracción mandibular.

☐ d. Repetiremos la misma maniobra.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si sospechamos de obstrucción en la vía aérea para conseguir una ventilación eficaz deberemos:
Seleccione una:

☒ a. Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción.

☐ b. Seguir con las ventilaciones más intensamente.

☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.

☐ d. Hacer un barrido a ciegas con el dedo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción.

Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 3: Motivos de consulta más frecuente](#)
5. [Examen Módulo 3](#)

Comenzado el domingo, 21 de julio de 2019, 12:09

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 21 de julio de 2019, 12:25

Tiempo empleado 16 minutos 30 segundos

Puntos 15,00/20,00


Calificación **7,50** de 10,00 (**75%**)

Comentario - Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media final superior al 80% para superar el curso.

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las opciones son incorrectas
- ☐ b. Taquipnea
- ☐ c. Bradipnea
- ☒ d. Polipnea


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario, la actuación de enfermería es correcta: Seleccione una:

- ☐ a. Si se considera oportuna canalizar una vía venosa de calibre normal.
- ☐ b. Dejar el niño en la sala de espera hasta que tengamos una muestra de orina.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ d. Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?

Seleccione una:

- ☐ a. Otitis media aguda.
- ☒ b. Mastoiditis.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Faringoamigdalitis.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?

Seleccione una:

- ☒ a. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ b. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Pregunta 5

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. ¿Cuál de estos cuidados no debemos realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.
- ☐ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. Es importante mantener la temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.
- ☐ d. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria?

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Deshidratación.
- ☐ c. Picor intenso.
- ☐ d. Edad del paciente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el rango de edad en el que hay mayor incidencia de convulsión febril?

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 18 - 24 meses.
- ☐ b. Entre 5 - 6 meses.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Entre 0 - 6 meses.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 18 - 24 meses.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de cojera en la infancia?

Seleccione una:

- ☐ a. Infecciosa.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ c. Traumática.
- ☐ d. Inflamatoria.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Traumática.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de convulsión en la infancia?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Tumor cerebral.
- ☒ c. Fiebre.
- ☐ d. Epilepsia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fiebre.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de dysuria?

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome nefrótico.
- ☒ b. ITU.
- ☐ c. Síndrome nefrítico.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: ITU.

Pregunta 11

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lipotimia, ¿dentro de qué categoría de síncope la podemos englobar?

Seleccione una:

- ☐ a. Síncope no cardiogénico.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. Síncope cardiogénico.
- ☐ d. Síncope neurocardiogénico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síncope neurocardiogénico.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería en una bronquiolitis van encaminados fundamentalmente a:

Seleccione una:

- ☐ a. Que curemos la causa de la patología.
- ☐ b. Conseguir una disminución de la demanda de oxígeno.

- ☐ c. Aumentar la fluidez de las secreciones.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conseguir una disminución de la demanda de oxígeno.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fármacos más utilizados en pediatría para la fiebre son:

Seleccione una:

- ☐ a. Metamizol.
- ☒ b. Paracetamol e ibuprofeno.
- ☐ c. Salbutamol.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paracetamol e ibuprofeno.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué signos no nos indicarían gravedad al valorar a un niño en triaje que acude a urgencias por cefalea?

Seleccione una:

- ☐ a. Vómitos en escopeta.
- ☒ b. Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Somnolencia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor.

Pregunta 15

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de laringitis tiene su inicio de forma brusca y de predominio nocturno?

Seleccione una:

- ☐ a. Epiglotitis aguda.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.
- ☐ d. Laringitis aguda viral.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño llega a urgencias con diarrea, ¿qué signo de riesgo debemos tener en cuenta durante la valoración en triaje?

Seleccione una:

- ☐ a. Alteraciones neurológicas.
- ☐ b. Compromiso de la vía respiratoria.
- ☒ c. Deshidratación.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deshidratación.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un lactante llega a urgencia con un TCE tras una caída del cambiador, presenta una puntuación de 15 en la escala de Glasgow, ¿cuál sería nuestra actuación?, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Control de las constantes vitales.
- ☐ b. Comenzar tolerancia oral.
- ☒ c. Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante.
- ☐ d. Observación durante 6 - 12 horas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño de 5 años acude a urgencias con otalgia, ¿qué signos debemos valorar?, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Cefalea.
- ☐ b. Fiebre.
- ☐ c. Vértigos.
- ☐ d. Otorrea.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cefalea.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño de 5 años llega a urgencias con un dolor abdominal intenso, ¿qué actuaciones realizaríamos?
Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar tolerancia oral de forma progresiva.
- ☐ b. Control de la coloración de la piel.
- ☐ c. Valorar la frecuencia respiratoria.
- ☒ d. Control hemodinámico y valoración del dolor.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Control hemodinámico y valoración del dolor.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente de 2 años acude a urgencias y sus padres nos cuentan que ha convulsionado en casa durante un minuto, ¿cuál de las siguientes actuaciones no es prioritaria?

Seleccione una:

- ☒ a. Colaborar en la realización de una punción lumbar.
- ☐ b. Valoración del nivel de conciencia.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Valoración de la vía aérea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colaborar en la realización de una punción lumbar.

Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 4: Accidentes en la edad pediátrica](#)
5. [Examen Módulo 4](#)

Comenzado el
Estado


domingo, 21 de julio de 2019, 12:32
Finalizado

Finalizado en	domingo, 21 de julio de 2019, 12:35
Tiempo empleado	3 minutos 12 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbón?

Seleccione una:

- ☐ a. Al 21%, oxígeno ambiental.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Al 100%.
- ☐ d. Al 50%.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100%.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo definimos el casi - ahogamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h.
- ☒ c. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.
- ☐ d. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☒ a. Intoxicación por antitérmicos.
- ☐ b. Intoxicación por productos del hogar.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Intoxicación por monóxido de carbono.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotermia.
- ☐ b. Gastritis aguda.
- ☒ c. Hiperglucemia.
- ☐ d. Depresión del SNC.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?
Seleccione una:

- ☐ a. Accidentes de tráfico.
- ☐ b. Ahogamiento.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Heridas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?
Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Glasgow.
- ☒ c. Lund y Browder.
- ☐ d. PIPP.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina?

Seleccione una:

- ☐ a. Tercer grado.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Primer grado.
- ☒ d. Segundo grado profunda.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segundo grado profunda.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de 1 a 3 años:

Seleccione una:

- ☒ a. Tienden a llevarse todo a la boca.
- ☐ b. Los niños tienen conciencia de los peligros.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Tienen poca autonomía, no les gusta explorar.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienden a llevarse todo a la boca.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita?

Seleccione una:

- ☒ a. De 0 a 6 meses.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.

☐ c. De 6 a 12 meses.

☐ d. De 1 a 3 años.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 0 a 6 meses.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi - ahogamiento?

Seleccione una:

☐ a. Para administrar alimento.

☒ b. Para descompresión y evacuación gástrica.

☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.

☐ d. Para aislar la vía aérea.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para descompresión y evacuación gástrica.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa?

Seleccione una:

☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.

☒ b. Sacarosa.

☐ c. No precisa ninguna analgesia.

☐ d. Paracetamol.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol?

Seleccione una:

- ☐ a. Flumacenilo.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. N - acetilcisteína.
- ☐ d. Naloxona.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: N - acetilcisteína.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué características de las siguientes son propias de los adolescentes?

Seleccione una:

- ☒ a. Adquieren mayor protagonismo los familiares.
- ☐ b. Adquieren mayor protagonismo los amigos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Tienen una gran estabilidad emocional.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquieren mayor protagonismo los amigos.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué no debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio?

Seleccione una:

- ☐ a. Estridor.
- ☐ b. Carbonización de vellos nasales.
- ☐ c. Mucosa oral y nasal.
- ☒ d. Frecuencia cardíaca.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia?

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar oxígeno.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Colocar al paciente en decúbito lateral derecho.
- ☒ d. Aislar la vía aérea.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislar la vía aérea.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo?

Seleccione una:

- ☐ a. Agua destilada.
- ☒ b. Carbón activado.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Suero fisiológico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué solución anestésica aplicaríamos en la piel del niño antes de realizar una anestesia local para hacer la sutura de una ceja?

Seleccione una:

- ☐ a. Lidocaína.
- ☒ b. GEL - LAT.
- ☐ c. EMLA.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: GEL - LAT.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación, ¿qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Limpia.
- ☐ c. Contaminada.
- ☒ d. Limpia - contaminada.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si llega al triaje un niño de 5 años con una cefalea intensa, ¿qué escala de dolor utilizaremos para valorarlo?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. La escala CRIES.
- ☒ c. La escala de Wong Baker.
- ☐ d. La escala numérica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de Wong Baker.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño de tres años llega a la urgencia con contusiones y hematomas en diferentes estadios, con alopecia en diferentes zonas de su cabeza y que se muestra antisocial, debemos sospechar de:

Seleccione una:

- ☐ a. Maltrato por negligencia.
- ☒ b. Maltrato físico.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.

☒ d. Abuso sexual.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maltrato físico.


Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Módulo 5. Técnicas y procedimientos en urgencias de pediatría](#)
5. [Examen Módulo 5](#)

Comenzado el	domingo, 21 de julio de 2019, 12:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 21 de julio de 2019, 12:41
Tiempo empleado	4 minutos 45 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO₂ del 100% usando un flujo de entre 6-15 l/min?
Seleccione una:


- ☒ a. Mascarilla Venturi.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Mascarilla simple.
- ☐ d. Mascarilla con reservorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración de enemas, indique el correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.
- ☐ c. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.
- ☐ d. Las opciones 1 y 2 son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- ☐ c. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
- ☐ d. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.
- ☐ b. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.
- ☒ c. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- ☐ b. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- ☒ c. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- ☐ d. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Comprobar la correcta identificación del paciente.
- ☐ c. Limitar el número de personas extrañas durante el procedimiento. Centrarse primero en el procedimiento y luego en el niño.
- ☒ d. No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar la correcta identificación del paciente.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción?

Seleccione una:

- ☐ a. Por micción espontánea.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Sondaje vesical.
- ☒ d. Con bolsa adhesiva perineal.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la colocación de una férula, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Se procede a proteger la piel: Vendaje tubular: se realiza para evitar que el vello del miembro se quede pegado al yeso, facilitando la transpiración, elimina las asperezas de los extremos del yeso y facilita la retirada del mismo. La venda tubular se dobla sobre el yeso una vez colocado éste.
- ☒ b. Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.
- ☐ c. Opción 1: Se retirarán pulseras, anillos y otros enseres que puedan entorpecer la realización de la técnica y para prevenir la posible aparición de edema del miembro que se va a inmovilizar.
- ☐ d. Las opciones 1 y 2 son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica de aspiración de secreciones, indique lo correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.
- ☐ c. Es una técnica no estéril.
- ☐ d. Se puede realizar tras las comidas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ventilación con bolsa autohinchable, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO2 del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.
- ☐ b. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.
- ☐ c. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.
- ☐ d. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO2 del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa del desarrollo del niño, la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto?

Seleccione una:

- ☐ a. Lactante.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Niño pequeño.
- ☒ d. Neonato.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neonato.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.
- ☐ c. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.
- ☒ d. Administración de alimentación oral.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta de la administración de carbón activado:

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede repetir la dosis si lo vomitan.
- ☐ b. Si se administra por vía oral, se puede dar solo o mezclar con agua, zumo, lácteos o bebidas carbonatadas.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico:

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.
- ☒ d. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura central se toma en:

Seleccione una:

- ☐ a. La axila.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. La cavidad oral.
- ☒ d. El recto.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El recto.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- ☒ a. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos o retirar la mascarilla o volver a administrar.
- ☐ b. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.
- ☐ c. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.
- ☐ d. Se colocará al paciente en Fowler o Semi-fowler.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué férula es la que va desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia?

Seleccione una:

- ☐ a. Férula isquiomaleolar.
- ☐ b. Férula isquiopédica.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Férula posterior de tobillo o suropédica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Férula posterior de tobillo o suropédica.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué material es necesario para colocar una férula de Zimmer?

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Venda de algodón y venda elástica.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- ☐ d. Opción 1: Tiras de esparadrapo y férula de aluminio.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tomamos la frecuencia cardíaca a través de un monitor. ¿Dónde se coloca el electrodo amarillo previa limpieza de la piel del paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Debajo de la clavícula, cerca del hombro derecho.
- ☐ b. En el lado inferior izquierdo debajo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.
- ☒ c. Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

Curso online. Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE


1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GUP](#)
4. [Prueba Final del Curso](#)
5. [Examen final del curso](#)

Comenzado el	domingo, 21 de julio de 2019, 12:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 21 de julio de 2019, 12:52
Tiempo empleado	10 minutos 22 segundos
Puntos	24,00/30,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la finalidad última del triaje?

Seleccione una:

- ☐ a. Tomar los datos del niño para su identificación.
- ☒ b. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores.
- ☐ d. Diagnosticar la enfermedad del niño.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño?

Seleccione una:

- ☒ a. Para aumentar la comodidad del niño.
- ☐ b. Para llevarlo a quirófano.
- ☐ c. Para su ingreso en planta o en la UCI.
- ☐ d. Para la realización de técnicas diagnósticas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- ☐ a. La identificación del paciente.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. El procedimiento a realizar.


- ☐ d. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:
Seleccione una:

- ☐ a. Informar a admisión de su traslado.
- ☒ b. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- ☐ c. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.
- ☐ d. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:
Seleccione una:

- ☐ a. El personal adecuado para el acompañamiento.
- ☐ b. Comunicación y coordinación previa.
- ☐ c. El material adecuado para el traslado.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:



a. PETAS.



b. CTAS.



c. MAT.



d. ESI.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta 7

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño?

Seleccione una:



a. 70 - 90 lpm.



b. 90 - 100 lpm.



c. Ninguna de las opciones son correctas.



d. 100 - 120 lpm.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, ¿qué debemos realizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz.
- ☒ d. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:

- ☐ a. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.
- ☒ b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- ☐ c. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.
- ☐ d. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. Vía venosa central.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. Vía intraósea.
- ☒ d. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.
- ☐ c. Son completamente distintas.
- ☐ d. No hay diferencias fundamentales entre ambas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. 9 J/Kg.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ c. 4 J/kg.
- ☐ d. 5 J/Kg.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. Bradipnea
- ☐ b. Todas las opciones son incorrectas
- ☐ c. Taquipnea
- ☐ d. Polipnea


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario, la actuación de enfermería es correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. Si se considera oportuna canalizar una vía venosa de calibre normal.
- ☐ d. Dejar el niño en la sala de espera hasta que tengamos una muestra de orina.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Mastoiditis.
- ☐ c. Otitis media aguda.
- ☐ d. Faringoamigdalitis.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?

Seleccione una:

- ☒ a. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ b. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ c. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Pregunta 17

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. ¿Cuál de estos cuidados no debemos realizar?

Seleccione una:

- ☒ a. Es importante mantener la temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.
- ☐ b. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.
- ☐ c. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.
- ☐ d. Todas las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria?

Seleccione una:

- ☐ a. Deshidratación.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Picor intenso.
- ☒ d. Edad del paciente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbón?

Seleccione una:

- ☐ a. Al 21%, oxígeno ambiental.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Al 50%.
- ☒ d. Al 100%.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100%.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo definimos el casi - ahogamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

- ☐ d. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Intoxicación por monóxido de carbono.
- ☐ c. Intoxicación por productos del hogar.
- ☒ d. Intoxicación por antitérmicos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- ☐ a. Gastritis aguda.
- ☒ b. Hiperglucemia.
- ☐ c. Hipotermia.
- ☐ d. Depresión del SNC.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?
Seleccione una:

- ☒ a. Ahogamiento.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Heridas.
- ☐ d. Accidentes de tráfico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?
Seleccione una:

- ☒ a. Lund y Browder.
- ☐ b. Glasgow.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. PIPP.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO₂ del 100% usando un flujo de entre 6-15 l/min?
Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla simple.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Mascarilla Venturi.
- ☒ d. Mascarilla con reservorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración de enemas, indique el correcto:
Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.
- ☒ d. Las opciones 1 y 2 son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- ☐ b. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta 28

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.
- ☐ c. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ d. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- ☒ d. Las opciones 1 y 2 son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 30

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.
- ☒ c. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- ☐ d. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
