

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Paciente neonato que precisa maniobras de resucitación cardiopulmonar tras sufrir accidente de tráfico. Viajaba en coche sin adecuada colocación del arnés, sufriendo fuerte TCE.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la bolsa de ventilación ¿Qué volumen tidal es el adecuado para facilitar la ventilación?

Seleccione una:

- a. 5-8 ml/Kg ✓
- b. 6-10 ml/kg
- c. 2-3 ml/kg
- d. Ninguna es correcta

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de necesitar intubación orotraqueal ¿en que posición se debe colocar al niño?

Seleccione una:

- a. Decúbito lateral izquierdo con la cabeza en posición neutra
- b. Decúbito supino con la cabeza lateralizada
- c. Decúbito supino con la cabeza en posición neutra o ligera extensión ✓
- d. Decúbito lateral izquierdo con la cabeza en ligera extensión

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a las compresiones torácicas, señala la correcta (según nuestra documentación de estudio):

Seleccione una:

- a. El masaje cardiaco está indicado cuando la FC es menor de 60 lpm
- b. Después de 30 segundos de adecuada ventilación
- c. El masaje cardiaco solo se realiza cuando la FC en menor de 40 lpm
- d. A y B son ciertas ✓

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué dosis de adrenalina es la indicada en estos pacientes?

Seleccione una:

- a. 0.01-0.03 mg/kg
- b. 0.01-0.03microgramos /kg
- c. 0.1-0.3 mg/kg ✗
- d. 0.01-0.03 mg

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sobre la Naloxona señala la correcta:

Seleccione una:

- a. Indicada en Depresión respiratoria en RN cuya madre ha recibido narcóticos en las 5 h previas al parto ✗
- b. Puede administrarse sin haber iniciado ventilación
- c. No se debe usar en madre adictas a opiáceos
- d. Todas son falsas