

Bases de Pediatria per l'Atenció Primària

1

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La prevención de los trastornos del sueño en el niño pequeño, mediante el establecimiento de rutinas, debe iniciarse:

Trieu-ne una:

a.

Los dos meses.

b.

Entre 4 y 5 meses.

c.

Hacia los 9 meses.

d.

A partir del año.

e.

Cuando deje el chupete.

Retroacció

La resposta correcta és: Entre 4 y 5 meses.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La presencia de una intumescencia mamaria en un recién nacido de dos semanas de vida, acompañada de exantema maculo papuloso en la cara, hace pensar en:

Trieu-ne una:

a.

Infección por *Candida albicans*.

b.

Estafilococia de focos múltiples.

c.

Hiperplasia suprarrenal congénita.

d.

Intolerancia a la leche.

e.

Es completamente normal.

Retroacció

La resposta correcta és: Es completamente normal.

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En el lactante a partir de los 6 meses, mediante el Test de Hirschberg se puede realizar un cribado de:

Trieu-ne una:

a.

Hipoacusia.

b.

Desarrollo psicomotor.

c.

Inicio de lenguaje.

d.
Estrabismo.

e.
Displasia de cadera.

Retroacció

La resposta correcta és: Estrabismo.

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un niño de 18 meses el mejor parámetro para valorar el estado de nutrición es:

Trieu-ne una:

a.
Índice de masa corporal (IMC).

b.
Peso aislado.

c.
Perímetro craneal.

d.
Pliegue cutáneo interescapular.

e.
Relacionar peso y longitud.

Retroacció

La resposta correcta és: Relacionar peso y longitud.

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Son susceptibles de tratamiento farmacológico por hipercolesterolemia los niños mayores de 10 años que presenten:

Trieu-ne una:

a.
Colesterol LDL >160 mg/dL más factores de riesgo.

b.
Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.

c.
Tabaquismo habitual.

d.
Obesidad.

e.
Hipertensión arterial más sedentarismo.

Retroacció

La respuesta correcta és: Colesterol LDL >160 mg/dL más factores de riesgo.

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La existencia de un llanto agudo característico, es propio de:

Trieu-ne una:

a.
Espasmos del llanto.

b.
Delección Catch 22.

c.
Secuencia de Pierre Robin.

d.

Síndrome de Lejeune.

e.

Síndrome de Down.

Retroacció

La resposta correcta és: Síndrome de Lejeune.

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Todos los derechos del paciente podrían resumirse en uno solo:

Trieu-ne una:

a.

Derecho de autonomía.

b.

Derecho a consentimiento informado.

c.

Libre elección de médico.

d.

Principio de equidad.

e.

Ética social pluralista.

Retroacció

La resposta correcta és: Derecho a consentimiento informado.

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El primer signo de malnutrición en el niño, es:

Trieu-ne una:

a.

Índice de Quetelet inferior a 15.

b.

Disminución del pliegue adiposo cutáneo.

c.

Disminución de la velocidad de crecimiento.

d.

Aparición de zonas de alopecia.

e.

Anemia microcítica.

Retroacció

La resposta correcta és: Disminución de la velocidad de crecimiento.

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La clínica de la estenosis hipertrófica de píloro, se inicia habitualmente:

Trieu-ne una:

a.

en los primeros días de vida.

b.

al introducir sólidos en la dieta.

c.

Hacia las tres semanas de vida.

d.

Alrededor de los tres meses.

e.
Al tomar leche de vaca.

Retroacció

La resposta correcta és: Hacia las tres semanas de vida.

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La causa más frecuente de vómitos recidivantes benignos hay que buscarla en:

Trieu-ne una:

a.

Gastroenteritis virales.

b.

Hernias hiatales leves.

c.

Espasmo pilórico.

d.

Errores en la alimentación.

e.

Introducción precoz de la fruta.

Retroacció

La resposta correcta és: Errores en la alimentación.

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El concepto de velocidad de crecimiento es importante en la valoración de:

Trieu-ne una:

a.

Recuperación de traumatismos óseos.

b.

Estadística poblacional.

c.

Valoración dinámica de la talla.

d.

Análisis de la edad ósea.

e.

Valoración fisiológica de la pubertad.

Retroacció

La resposta correcta és: Valoración dinámica de la talla.

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La escala Denver Developmental Screening Test conocida como Escala de Denver se emplea con la finalidad de:

Trieu-ne una:

a.

Valorar el desarrollo motor y cognitivo hasta los 6 años.

b.

Evaluar precozmente rasgos de trastorno autista.

c.

Establecer el cociente intelectual.

d.

Valorar el lenguaje a los dos años.

e.

Evaluar el desarrollo de la lecto escritura.

Retroacció

La respuesta correcta és: Valorar el desarrollo motor y cognitivo hasta los 6 años.

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La presencia de adenopatías y esplenomegalia en un niño con fiebre prolongada, debe hacer pensar en:

Trieu-ne una:

a.

Dermatomiositis.

b.

Mononucleosis.

c.

Infección por parvovirus B19.

d.

Enfermedad de Kawasaki.

e.

Fiebre reumática.

Retroacció

La respuesta correcta és: Mononucleosis.

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Una correcta exploración clínica, permite descartar la luxación congénita de cadera, para ello se emplea la maniobra de:

Trieu-ne una:

a.
Hirschberg.

b.
Quetelet.

c.
Abducció asimétrica.

d.
Rotación interna.

e.
Barlow y Ortolani.

Retroacció

La resposta correcta és: Barlow y Ortolani.

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El objetivo de la Ética Médica o de la Bioética, fundamentalmente es:

Trieu-ne una:

a.
Establecer la equidad en las decisiones.

b.
Tener en cuenta la moral.

c.
Ayudar en la finalización de la asistencia.

d.
La inclusión de valores en la toma de decisiones.

e.
Analizar los valores personales del paciente.

Retroacció

La resposta correcta és: La inclusión de valores en la toma de decisiones.

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En el desarrollo psicomotor de un niño, el hallazgo de un signo de alerta:

Trieu-ne una:

a.

Indica practicar una resonancia magnética.

b.

Obliga a derivarlo para atención precoz.

c.

Significa forzosamente un desarrollo anormal.

d.

Nunca es un trastorno reversible.

e.

Puede tratarse de un hallazgo transitorio.

Retroacció

La resposta correcta és: Puede tratarse de un hallazgo transitorio.

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La exploración de la agudeza visual mediante optotipos, es aconsejable realizarla:

Trieu-ne una:

a.

Según factores de riesgo.

b.

Si existen antecedentes familiares.

c.

A partir de 3-4 años.

d.

Después de los 6 años.

e.

Solo es posible en adolescentes.

Retroacció

La resposta correcta és: A partir de 3-4 años.

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Como parte del desarrollo psicomotor, el gateo aparece en el niño:

Trieu-ne una:

a.

A los 10 meses de edad.

b.

Hacia los 8 meses.

c.

Cuatro semanas antes de la marcha.

d.

Hacia los 6 meses.

e.

No tiene una edad precisa.

Retroacció

La resposta correcta és: A los 10 meses de edad.

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El perímetre craneal de un lactante normal, en el percentil 50 de creixement, a los seis meses de vida, suele ser de:

Trieu-ne una:

a.
34 cm.

b.
37 cm.

c.
40 cm.

d.
43 cm.

e.
46 cm.

Retroacció

La resposta correcta és: 43 cm.

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Desde la Bioética se entiende que el profesional tiene una actitud paternalista, cuando:

Trieu-ne una:

a.

Los padres imponen su criterio en la asistencia.

b.

Se da un trato paternal al adolescente.

c.

Se informa adecuadamente a los padres.

d.

El profesional impone su criterio al paciente.

e.

El trato del profesional es muy amigable.

Retroacció

La respuesta correcta és: El profesional impone su criterio al paciente.

Pregunta **21**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La mortalidad infantil, se considera.

Trieu-ne una:

a.

Cociente nacidos vivos y fallecidos anteparto.

b.

Fallecidos en el primer semestre.

c.

Índice de calidad de asistencia primaria.

d.

Fallecidos en el primer mes de vida.

e.

Indicador de salud poblacional.

Retroacció

La respuesta correcta és: Indicador de salud poblacional.

Pregunta **22**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El concepto de fiebre prolongada en el niño, se define por:

Trieu-ne una:

a.

Procesos febriles de repetición durante 6 meses.

b.

Fiebre más de 48 horas en menores de 5 años.

c.

Fiebre termometrada de más de 10 días.

d.

Temperatura $>38^{\circ}\text{C}$ tras un proceso infeccioso.

e.

Fiebre $>38^{\circ}\text{C}$ que no cede a antitérmicos.

Retroacció

La resposta correcta és: Fiebre termometrada de más de 10 días.

Pregunta **23**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Recién nacido de 15 días de vida, peso al nacimiento 3.250g, lo traen a la consulta por estreñimiento desde hace una semana. Lactancia materna exclusiva. Peso actual 3.100g. Diagnóstico más probable:

Trieu-ne una:

a.

Enfermedad de Hirschsprung.

b.

Fístula ano rectal.

c.

Hipotiroidismo congénito.

d.

Hipogalactia materna.

e.

Estenosis hipertrófica de píloro.

Retroacció

La resposta correcta és: Hipogalactia materna.

Pregunta **24**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Sólo uno de estos parámetros es normal en el desarrollo del niño:

Trieu-ne una:

a.

Control cefálico escaso a los 4 meses.

b.

Ausencia de sonrisa social a los 2

c.

Dirige la mano a objetos a los 6 meses.

d.

No se mantiene sentado a los 10 meses.

e.

Inicio de balbuceo a los 9 meses.

Retroacció

La resposta correcta és: Dirige la mano a objetos a los 6 meses.

Pregunta **25**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un niño de cuatro años, que presenta una convulsión febril sin complicaciones, hay que descartar:

Trieu-ne una:

a.

Neumonía.

b.

Epilepsia.

c.

Meningitis.

d.

Intoxicación.

e.

Sepsis.

Retroacció

La resposta correcta és: Meningitis.

Pregunta **26**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La edad de mayor frecuentación de urgencias por accidentes, es

Trieu-ne una:

a.

Primer año de vida.



b.
De 2 a 3 años.



c.
De 4 a 5 años.



d.
Edad escolar.



e.
Adolescentes.

Retroacció

La resposta correcta és: De 2 a 3 años.

Pregunta **27**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Con el término de ginecomastia, nos referimos a:

Trieu-ne una:



a.
Distribución ginecoide de la grasa.



b.
Aumento de tamaño mamario en el varón.



c.
Aumento de la glándula mamaria.



d.
Inicio de pubertad en niñas.



e.
Equivale a telarquia prepuberal.

Retroacció

La resposta correcta és: Aumento de tamaño mamario en el varón.

Pregunta **28**

Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La Ética es una disciplina que tiene como objeto:

Trieu-ne una:

a.
Estudio de los valores en la toma de decisiones.

b.
Análisis de las creencias religiosas.

c.
Establecer las normas para una información veraz.

d.
Establecer unos valores morales universales.

e.
Evitar siempre los errores asistenciales.

Retroacció

La resposta correcta és: Estudio de los valores en la toma de decisiones.

Pregunta **29**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En el cribado de la displasia de cadera del recién nacido, es básico:

Trieu-ne una:

a.
Correcta exploración clínica.

b.

Detectar población de riesgo.

c.

Ecografía de cadera.

d.

Valorar antecedentes familiares.

e.

Asimetría de pliegues cutáneos.

Retroacció

La resposta correcta és: Correcta exploración clínica.

Pregunta **30**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Ante la presencia de un estreñimiento en un niño de 8 días de vida, la causa más frecuente es:

Trieu-ne una:

a.

Hipogalactia materna.

b.

Hipotiroidismo congénito.

c.

Fisura anal.

d.

Enfermedad de Hirschsprung.

e.

Atresia intestinal.

Retroacció

La resposta correcta és: Hipogalactia materna.

Pregunta **31**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La actividad más importante de prevención secundaria en Pediatría es:

Trieu-ne una:

a.

Inmunizaciones pasivas.

b.

Cribado poblacional.

c.

Inmunizaciones activas.

d.

Educación sanitaria.

e.

Controles de Salud.

Retroacció

La respuesta correcta és: Cribado poblacional.

Pregunta **32**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En el recién nacido nos debe hacer sospechar en síndrome de Klinefelter, la existencia de:

Trieu-ne una:

a.

Presencia de pterigium colli.

b.

Genitales ambiguos.

c.

Longitud superior a p90.

d.

Testes en ascensor.

e.

Criptorquidia verdadera.

Retroacció

La resposta correcta és: Criptorquidia verdadera.

Pregunta **33**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En la pràctica clínica, la valoració de la massa grasa subcutànea, se realitza mitjançant:

Trieu-ne una:

a.

Perímetre abdominal.

b.

Índice de masa corporal.

c.

Tomografía computarizada (TC).

d.

Pliegue adiposocutáneo.

e.

Índice de Benn.

Retroacció

La resposta correcta és: Pliegue adiposocutáneo.

Pregunta **34**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Es un signo de alerta de alteración en el desarrollo neurológico en un niño de 12 a 24 meses, la presencia de:

Trieu-ne una:

a.

Inicio de la marcha a los 16 meses.

b.

Presencia de ecolalias.

c.

Perímetro craneal en p10.

d.

Malposición de los pies.

e.

Pabellones auriculares con dismorfia.

Retroacció

La resposta correcta és: Presencia de ecolalias.

Pregunta **35**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La medida más importante en prevención primaria, es:

Trieu-ne una:

a.

Vacunación.

b.

Cribado metabólico.



c.

Administración vitamina K.



d.

Educación dietética.



e.

Escolarización adecuada.

Retroacción

La respuesta correcta es: Vacunación.

Bases de Pediatria per l'Atenció Primària

2

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Text de la pregunta

El síndrome de Volkmann se caracteriza por:

Trieu-ne una:

a.

Miopatía progresiva.

b.

Sordera sensorial y piebaldismo.

c.

Displasia ósea.

d.

Isquemia compartamental.

e.

Talla baja y retraso mental.

Retroacció

La resposta correcta és: Isquemia compartamental.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La piràmide de los alimentos sitúa en la base los alimentos:

Trieu-ne una:

a.

Que deben evitarse de forma continua.

b.

Con mayor contenido en fibra absorbible.

c.

Más ricos en vitaminas.

d.

Con mayor contenido calórico.

e.

Que deben ser consumidos en mayor proporción.

Retroacció

La resposta correcta és: Que deben ser consumidos en mayor proporción.

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

¿Cuál de estos factores no esta relacionado con la obesidad primaria?:

Trieu-ne una:

a.

La obesidad en los padres.

b.

La etnia.

c.

El nivel socioeconómico.

d.

La pubertad retrasada.

e.

La inactividad física.

Retroacció

La resposta correcta és: La pubertad retrasada.

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

El tratamiento de elección de la pitiriasis rosada de Gibert es:

Trieu-ne una:

- a.
Antifúngicos tópicos.
- b.
Antibióticos tópicos.
- c.
No tiene tratamiento.
- d.
Antibióticos orales.
- e.
Corticoides locales.

Retroacció

La respuesta correcta és: No tiene tratamiento.

Pregunta **5**

correcte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En relación a la administración de vacunas en un niño inmigrante, es aconsejable:

Trieu-ne una:

-
- a.
Considerarlo no vacunado.
- b.
Aceptar solo las vacunas documentadas.
- c.
Establecer un plan individualizado.
- d.
Aceptar la información de la familia.
- e.
Iniciar calendario según edad.

Retroacció

La respuesta correcta és: Establecer un plan individualizado.

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Con respecto a los probióticos es cierto que:

Trieu-ne una:

a.

Son microorganismos vivos.

b.

Son fitonutrientes.

c.

Son hidratos de carbono que regulan la flora bacteriana intestinal.

d.

Reducen la absorción de ColesterolLDL.

e.

Inhiben el crecimiento de las bacterias no patógenas.

Retroacció

La resposta correcta és: Son microorganismos vivos.

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Las fórmulas artificiales a diferencia de la leche materna, suelen contener

Trieu-ne una:

a.

Oligosacáridos como hidratos de carbono.

b.

Más cantidad de ácido ascórbico.

c.

Más calcio biodisponible.

d.

Más colesterol.



e.

Menos hierro en forma de sales.

Retroacció

La resposta correcta és: Más cantidad de ácido ascórbico.

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En un niño con obesidad, fenotipo normal, talla en p90 y velocidad de crecimiento normal, la etiología más probable es:

Trieu-ne una:



a.

Hipotiroidismo.



b.

Genética.



c.

Obesidad primaria.



d.

Obesidad secundaria.

Retroacció

La resposta correcta és: Obesidad secundaria.

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En relación a su aspecto corporal, la pregunta "¿Soy normal? Se suele plantear, en:

Trieu-ne una:



a.

Escolar de 6 a 10 años.



b.

Adolescente de 11 a 13 años.



c.
Adolescente de 14 a 17 años.

d.
Adolescencia de 17 a 20 años.

e.
En cualquiera de estas etapas.

Retroacció

La resposta correcta és: Adolescente de 11 a 13 años.

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

El eritema polimorfo, puede estar inducido por:

Trieu-ne una:

a.
Infecciones bacterianas.

b.
Medicamentos.

c.
Algunas infecciones vírales.

d.
Las tres causas anteriores.

e.
Es un proceso idiopático.

Retroacció

La resposta correcta és: Las tres causas anteriores.

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

La alopecia areata o pelada, se puede asociar a procesos autoinmunes como:

Trieu-ne una:



a.
Vitilego.



b.
Lupus.



c.
Artritis.



d.
Tiroiditis.



e.
Todas las anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Todas las anteriores.

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

El factor más importante en el tratamiento de la obesidad infantil, es:

Trieu-ne una:



a.
Limitación absoluta e las "chuches".



b.
Colaboración del niño. Reforzar con aspectos estéticos.



c.
Evitar la merienda.



d.
Tomar decisiones tajantes.

Retroacció

La resposta correcta és: Colaboración del niño. Reforzar con aspectos estéticos.

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Las fracturas en el niño pueden presentar secuelas a largo plazo cuando tienen alguna de estas características:

Trieu-ne una:

a.

Son fracturas con minuta.

b.

Fracturas diafisarias por rotación.

c.

Cuando afecta la cápsula articular.

d.

Si incluye el orificio nutricio del hueso.

e.

Afectan el cartílago de crecimiento.

Retroacció

La resposta correcta és: Afectan el cartílago de crecimiento.

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En los jóvenes y adolescentes de nuestro entorno existe una creciente tendencia a la obesidad, entre sus múltiples causas se puede encontrar

Trieu-ne una:

a.

Bajo consumo de proteínas animales.

b.

Elevado consumo de bollería.

c.

Alto consumo de legumbres.

d.

Elevado consumo de aceite de oliva.

e.
Falta de grasas saturadas en la dieta.

Retroacció

La resposta correcta és: Elevado consumo de bollería.

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En términos conceptuales la obesidad se puede definir como:

Trieu-ne una:

a.

Alteración de la conducta alimentaria.

b.

Trastorno genético

c.

Disfunción hormonal múltiple.

d.

Alteración del balance energético.

e.

Trastorno funcional de la leptina.

Retroacció

La resposta correcta és: Alteración del balance energético.

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La mutilación genital femenina es una práctica más frecuente en:

Trieu-ne una:

a.

Sudeste asiático.

b.

África subsahariana.



c.
Islas del Caribe.



d.
Musulmanes practicantes.



e.
Practicantes del taoísmo.

Retroacció

La resposta correcta és: África subsahariana.

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

La dermatitis herpetiforme o enfermedad de Duhring, se puede asociar clínicamente a:

Trieu-ne una:



a.
Intolerancia al gluten.



b.
Déficit de IgA secretoria.



c.
Alergia a proteínas de leche de vaca



d.
Bronquitis hiperreactiva.



e.
Diarrea crónica inespecífica.

Retroacció

La resposta correcta és: Intolerancia al gluten.

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Dentro del concepto de alimentos funcionales se incluyen:

Trieu-ne una:

a.

Fitonutrientes.

b.

Prebióticos.

c.

Probióticos.

d.

Simbióticos.

e.

Todos los anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Todos los anteriores.

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

La causa más frecuente de fracturas óseas en niños mayores de 6 años, es:

Trieu-ne una:

a.

Traumatismos deportivos.

b.

Caídas de la bicicleta.

c.

Caídas casuales en casa.

d.

Accidentes de tráfico.

e.

Peleas en el colegio.

Retroacció

La resposta correcta és: Traumatismos deportivos.

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

La técnica de la "doble pesada" es especialmente útil, para:

Trieu-ne una:

a.

Valoración de la lactancia materna.

b.

Valoración de la diuresis por pañal.

c.

Tranquilizar a las madres que lactan.

d.

Evaluar la velocidad de crecimiento.

e.

Ninguna de las situaciones anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Ninguna de las situaciones anteriores.

Pregunta **21**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Cual de estos fármacos pueden tener como efecto secundario la obesidad en niños:

Trieu-ne una:

a.

Ciproheptadina.

b.

Corticoides.

c.

Valproato sódico.



d.
Aminotriptilina.



e.
Todos ellos.

Retroacció

La resposta correcta és: Todos ellos.

Pregunta **22**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Entre las complicaciones de la obesidad infantil en la vida adulta, no se encuentra:

Trieu-ne una:



a.
Hiperuricemia.



b.
Síndrome de Pickwick.



c.
Higado graso.



d.
Menor esperanza de vida.



e.
Pancreatitis.

Retroacció

La resposta correcta és: Pancreatitis.

Pregunta **23**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

La tricotolomanía es un signo que se encuentra con frecuencia en:

Trieu-ne una:



a.

Niñas ansiosas.

b.

Dermatomicosis.

c.

Enfermedades autoinmunes.

d.

Cromosomopatías.

e.

Celiaquía.

Retroacció

La resposta correcta és: Niñas ansiosas.

Pregunta **24**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En los adolescentes pueden observarse conductas de tipo "pasotismo" favorecidas por:

Trieu-ne una:

a.

Fracaso en los estudios.

b.

Desengaño de valores sociales.

c.

Conductas de imitación.

d.

Dinero fácil.

e.

Todas las anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Todas las anteriores.

Pregunta **25**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El diagnòstic diferencial de la verruga plantar, debe establecerse especialmente con:

Trieu-ne una:

a.

Verruga vulgar.

b.

Verrugas planas.

c.

Papilomas víricos.

d.

Neoplasias.

e.

Callosidades.

Retroacció

La resposta correcta és: Callosidades.

Pregunta **26**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un niño de 5 años que presenta dolor en la cadera derecha con impotencia funcional, con limitación a la movilidad, el diagnóstico más probable es:

Trieu-ne una:

a.

Sarcoma de Ewing.

b.

Osteocondritis idiopática.

c.

Artritis reumatoide.

d.
Sinovitis transitoria de cadera.

e.
Artritis coxo femoral.

Retroacció

La resposta correcta és: Sinovitis transitoria de cadera.

Pregunta **27**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

El alto contenido en isoflavonas y fitoestrogenos, hacen de la soja un alimento:

Trieu-ne una:

a.
Poco recomendado en la infancia.

b.
Especialmente indicado en las niñas.

c.
Aconsejable en la adolescencia.

d.
Útil en la pubertad retrasada.

e.
Estimulante del apetito en niños.

Retroacció

La resposta correcta és: Poco recomendado en la infancia.

Pregunta **28**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En un lactante de 4 meses que recibe lactancia artificial, para una adecuada higiene de los biberones y tetinas, aconsejaremos a la familia:

Trieu-ne una:

a.

Hervir todo en agua unos 10 minutos.

b.

Sumergir en soluciones de hipoclorito.

c.

Esterilizar por acción vapor.

d.

Limpieza correcta con agua y jabón.

e.

Esterilizar en el microondas.

Retroacció

La resposta correcta és: Limpieza correcta con agua y jabón.

Pregunta **29**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En un adolescente que presenta fiebre, astenia, pérdida de fuerza muscular, eritema facial, especialmente periocular y pápulas en los nudillos de las manos, cabe pensar en el diagnóstico de:

Trieu-ne una:

a.

Gripe.

b.

Dermatomiositis.

c.

Mononucleosis infecciosa.

d.

Lupus sistémico.

e.

Ninguna de las anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Dermatomiositis.

Pregunta **30**

Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

16. El adolescente suele tener un sentido de invulnerabilidad que le lleva a conductas de riesgo, tres aspectos a preguntar se pueden incluir en el acrónimo MAR, que incluye:

Trieu-ne una:

a.
Motocicleta, Accidentes y Reglas circulación.

b.
Motores, Deportes de Aventura, Retos.

c.
Moda en vestir, Amigos y Reglas.

d.
Medicación, Abuso sexual y Régimen alimentario.

e.
Miedos, Actitudes y Retos.

Retroacció

La resposta correcta és: Medicación, Abuso sexual y Régimen alimentario.

Pregunta **31**

Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La fascitis plantar se considera una lesión benigna frecuente en:

Trieu-ne una:

a.
Niños entre 10 y 12 años.

b.
Adolescentes sedentarios.

c.
Niños con dietas carenciales.

d.
Adolescentes deportistas.

e.
Niños obesos.

Retroacció

La resposta correcta és: Adolescentes deportistas.

Pregunta **32**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En el adolescente, la sensació de omnipotencia les facilita:

Trieu-ne una:

a.
Marcarse objetivos idealistas.

b.
Desafíos a los padres.

c.
Conductas de riesgo.

d.
Pensamiento abstracto.

e.
Fantasías románticas.

Retroacció

La resposta correcta és: Conductas de riesgo.

Pregunta **33**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por:

Trieu-ne una:

a.
Aparece en adolescentes antes de los 20 años.



b.
Es frecuente en lactantes por intolerancia digestiva.



c.
Es una enfermedad aguda del niño pequeño.



d.
Va asociada a alergia a proteínas de la leche.



e.
Conduce siempre a una colostomia.

Retroacció

La resposta correcta és: Aparece en adolescentes antes de los 20 años.

Pregunta **34**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En un niño de cuatro años, que presenta lesiones de rascado en la nuca y una adenopatía laterocervical, el diagnóstico probable es:

Trieu-ne una:



a.
Sarna.



b.
Pediculosis capiti.



c.
Alergia de contacto.



d.
Eccema atópico.



e.
Varicela.

Retroacció

La resposta correcta és: Pediculosis capiti.

Pregunta **35**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Tras la menarquia, los ciclos irregulares se consideran:

Trieu-ne una:

a.

Indicadores de posible anorexia.

b.

Frecuentes en dietas carenciales.

c.

Excepcionales en chicas normales.

d.

Siempre son patológicos.

e.

Frecuentes en los siguientes dos años.

Retroacció

La resposta correcta és: Frecuentes en los siguientes dos años.

Pregunta **36**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Desde la vertiente sanitaria, debe considerarse un factor de riesgo en los niños emigrantes:

Trieu-ne una:

a.

Procedencia de zonas con alta incidencia de enfermedades infecciosas.

b.

Menor prevalencia de enfermedades congénitas.

c.

Hábitos alimentarios más saludables.

d.

Ausencia de duelo migratorio por la mejora social de los padres.



e.

Buena integración laboral de los padres

Retroacció

La resposta correcta és: Procedencia de zonas con alta incidencia de enfermedades infecciosas.

Pregunta **37**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

En relación a la torsión testicular, es cierto que:

Trieu-ne una:



a.

La fiebre suele ser constante.



b.

Suele acompañarse de náuseas y vómitos.



c.

Es más frecuente en prepúberes.



d.

El dolor es de inicio insidioso.



e.

El reflejo cremastérico está conservado.

Retroacció

La resposta correcta és: Suele acompañarse de náuseas y vómitos.

Pregunta **38**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

El tratamiento de primera elección del herpes circinado en el niño es:

Trieu-ne una:



a.

Aziclovir tópico.



- b. Griseofulvina oral.
- c. Fluconazol parenteral.
- d. Derivados imidazólicos tópicos.
- e. Corticoides tópicos.

Retroacció

La resposta correcta és: Derivados imidazólicos tópicos.

Pregunta **39**

correcte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Un marcado carácter narcisista en un adolescente, se puede dar en:

Trieu-ne una:

-
- a. Desarrollo puberal normal.
- b. Fases de sexualidad poco definida.
- c. Trastorno de conducta alimentaria.
- d. Consumo de tóxicos.
- e. Trastornos obsesivos.

Retroacció

La resposta correcta és: Trastorno de conducta alimentaria.