

Pregunta 1

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un niño que ha ingerido una dosis toxica de Paracetamol hace más de 8 horas, ¿qué actuación debemos realizar inicialmente?

Seleccione una:

- ☐ a. Se iniciará tratamiento antibiótico inmediatamente.
- ☒ b. Se iniciará la administración de N-acetilcisteína y se realizaran niveles de Paracetamol en sangre y analítica.
- ☐ c. Se iniciará la administración de Naloxona y se realizaran niveles de Paracetamol en sangre y analítica.
- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 2

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un box de su servicio de urgencias se encuentra un niño de 10 años al que se le va a realizar una reducción de una fractura de cúbito y rádio. ¿Qué fármaco prepararemos para realizar la sedoanalgesia?

Seleccione una:

- ☐ a. Clóruro Mórfico.
- ☐ b. Naloxona.
- ☐ c. Diacepam.
- ☒ d. Ketamina.

Pregunta 3

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué medidas debemos tener en cuenta ante un paciente quemado?

Seleccione una:

- ☐ a. Sondaje vesical para control de diuresis.
- ☐ b. Soporte psicológico del niño y de sus padres.
- ☐ c. Vigilar la privación del sueño y el prurito, ya que son secuelas frecuentes.
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 4

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de analgésico sistémico emplearemos ante un paciente con dolor intenso?

Seleccione una:

- ☐ a. Metamizol.
- ☒ b. Opioides.
- ☐ c. Ibuprofeno.
- ☐ d. Midazolam.

Pregunta 5

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta INCORRECTA: Durante el examen neurológico de un paciente que ha sufrido un TCE, debemos valorar:

Seleccione una:

- ☐ a. Tamaño, simetría y reactividad pupilar.
- ☐ b. Detectar déficits neurológicos, habitualmente motores (debilidad, asimetría), que podrían ser signos de lesión cerebral establecida o inminente (herniación).
- ☒ c. Detectar reactividad pupilar rápida, ya que esto podría indicar lesión cerebral traumática.
- ☐ d. Valoraremos pares craneales, reflejos osteotendinosos, marcha y sensibilidad.

Pregunta 6

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los signos de obstrucción de la vía aérea superior se presentan con más frecuencia durante la inspiración e incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de la elevación torácica.
- ☒ b. Estridor.
- ☐ c. Crepitantes a la auscultación.
- ☐ d. Sequedad de la mucosa oral.

Pregunta 7

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son métodos para evaluar el dolor: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- ☐ a. Escala de Flacc.
- ☒ b. Test de Apgar.
- ☐ c. Escala de caras de Wong-Baker.
- ☐ d. Escala de Walco y Howite.

Pregunta 8

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Escala de Coma de Glasgow: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- ☐ a. Permite predecir el daño neurológico e incluso el pronóstico vital.
- ☒ b. Se ha de recoger la puntuación desglosada, del siguiente modo: O4, V5, M6.



c. La puntuación desglosada valora: respuesta ocular, respuesta sensitiva y respuesta motora.



d. Se utiliza durante el seguimiento de un paciente, y para el intercambio de información entre profesionales.

Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Llega a su servicio de urgencias un paciente de 6 años, que se ha precipitado desde una altura de 2 metros. El niño está llorando y las constantes vitales son normales. Señale las acciones que realizaremos inicialmente:

Seleccione una:



a. Sospecharemos lesión cervical, debido al mecanismo violento, hasta demostrar su indemnidad, y mantendremos alineación cabeza-cuello-tronco.



b. Dejaremos que el niño se coloque en una posición en la que se encuentre cómodo.



c. Colocaremos sonda vesical para descartar hematuria por traumatismo genital.



d. Realizaremos intubación endotraqueal.

Pregunta 10

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta sobre el hematoma epidural:

Seleccione una:



a. Colección de sangre por debajo de la duramadre.



b. El sangrado siempre es de origen venoso y por tanto de crecimiento lento.



c. El paciente puede presentar un periodo sin síntomas y al cabo de unas horas desarrollar síntomas de alarma.



d. Este tipo de hematoma no representa una emergencia neuroquirúrgica.

Pregunta 11

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Acude a su servicio de urgencias un niño de 2 años que presenta una escaldadura en tórax tras echarse encima accidentalmente un plato de sopa. Presenta eritema en la zona y por el llanto continuo sospechamos dolor intenso. ¿Como clasificaríamos esta lesión?

Seleccione una:

- ☒ a. Quemadura de primer grado.
- ☐ b. Quemadura de segundo grado tipo A.
- ☐ c. Quemadura de segundo grado tipo B.
- ☐ d. Quemadura de tercer grado.

Pregunta 12

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Nos encontramos ante un paciente quemado y necesitamos canalizar un acceso venoso. ¿Cuál sería nuestra primera elección?:

Seleccione una:

- ☐ a. Vía venosa central en tejido no quemado.
- ☐ b. Vía venosa central en tejido quemado.
- ☒ c. Vía venosa periférica en tejido no quemado.
- ☐ d. Vía venosa periférica en tejido quemado.

Pregunta 13

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Hematoma subdural.

- ☐ b. Hematoma epidural.
- ☐ c. Hemorragia subaracnoidea.
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 14

Respuesta guardada

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza como anestésico local?

Seleccione una:

- ☒ a. Fentanilo.
- ☐ b. Gel Lat.
- ☐ c. Lidocaína.
- ☐ d. Mepivacaína.

Pregunta 15

Respuesta guardada

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante la sospecha de una lesión cervical tras un TCE, ¿qué medidas debemos tomar?

Seleccione una:

- ☐ a. Pediremos al paciente que movilice el cuello para comprobar si le duele.
- ☒ b. Inmovilizar con collarín cervical rígido e inmovilizador de cabeza.
- ☐ c. Es suficiente la colocación de collarín cervical, ya que se inmoviliza y se alinea cabeza-cuello-tronco.
- ☐ d. No tomaremos ninguna medida hasta resolver los problemas a consecuencia de TCE, ya que el TCE es prioritario.

Pregunta 16

Respuesta guardada

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué antídoto administraremos ante una intoxicación por Benzodiacepinas?

Seleccione una:

- ☐ a. Flumacenilo.
- ☒ b. Naloxona.
- ☐ c. N-acetilcisteína.
- ☐ d. Carbón activado.

Pregunta 17

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un TCE el daño cerebral secundario y terciario, puede producirse:

Seleccione una:

- ☒ a. Como consecuencia de alteraciones intracerebrales, como la presencia de crisis convulsivas precoces, o edema intracerebral.
- ☐ b. Por complicaciones sistémicas como aumento de la oxigenación, o descenso de la temperatura, entre otros.
- ☐ c. a y b son incorrectas.
- ☐ d. Todas son correctas.

Pregunta 18

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la extensión de las quemaduras debemos valorar la superficie corporal quemada (SCQ) de un niño de 5 años que presenta quemaduras en ambos brazos:

Seleccione una:

- ☐ a. SCQ 12%
- ☐ b. SCQ 36%
- ☒ c. SCQ 18%
- ☐ d. SCQ 20a%

Pregunta 19

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son signos sugestivos de fractura de la base del cráneo, la presencia de: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- ☐ a. Equimosis periorbitaria.
- ☐ b. Equimosis retroauricular.
- ☒ c. Hematemesis.
- ☐ d. Hemotímpano o sangre en CAE.

Pregunta 20

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

“Inducir un estado que permita al paciente tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales”. Esta definición pertenece a:

Seleccione una:

- ☐ a. Analgesia.
- ☐ b. Ansiolisis.
- ☒ c. Sedoanalgesia.
- ☐ d. Sedación.

[Siguiente](#)

NOTA DEL EXAMEN DE 8.5 PTOS.