

Test 3

Test de radiografía de abdomen

Pregunta 1

La radiografía de abdomen está indicada en todas estas situaciones, excepto en:

- a. Obstrucción intestinal
- b. Perforación de víscera hueca (neumoperitoneo)
- c. Cólicos nefríticos
- d. Valoración de líquido abdominal**
- e. Íleo paralítico

Pregunta

Respecto a la RX de abdomen en bipedestación:

- a. Es la primera prueba a realizar en caso de sospecha de obstrucción intestinal
- b. Se debe realizar cuando hay dudas de si hay obstrucción por un silencio aéreo en la radiografía AP**
- c. Sirve para valorar la existencia de niveles hidroaéreos y el patrón mucoso
- d. No es necesario que incluya diafragma

Pregunta 3

Cuando en un paciente no se puede realizar una placa en bipedestación, todas estas son proyecciones alternativas excepto una:

- a. Radiografía en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal
- b. Radiografía simple de abdomen en AP**
- c. Radiografía en decúbito supino con rayo horizontal
- d. Radiografía PA y lateral de tórax

Pregunta 4

En la obstrucción de intestino delgado:

- a. El intestino delgado se ve en condiciones normales y su calibre máximo es 3 cm
- b. Está formado por haustras que no se unen en la línea media
- c. La causa más frecuente son las bridas intestinales tras la cirugía**
- d. Un signo típico es del asa centinela

Pregunta 5

En las hernias incarceradas:

- a. No es una patología urgente
- b. En diferentes series radiográficas se observa una imagen de pseudotumor que se trata de asas fijas**
- c. Los niveles hidroaéreos son abundantes
- d. Las válvulas conniventes se delimitan perfectamente

**** En la pregunta 5 he puesto la B, pero esta mal.

Preguntas 6

En el íleo paralítico postoperatorio o adinámico o paralítico se caracteriza:

- a. Dilatación de asas de intestino delgado e intestino grueso, con aire y líquido en su interior
- b. Aparece secundario a intervención quirúrgica reciente, dolor, traumatismos
- c. Se observa aire distal
- d. Todas son correctas**

Pregunta 7

Todos estos signos sugieren neumoperitoneo, excepto:

- a. Signo de Rigler
- b. Signo de la escalera**
- c. Signos del ligamento falciforme o del ligamento uraco
- d. Signo del balón de Rugby

Pregunta 8

El aire en el sistema biliar (aerobilia) se caracteriza:

- a. Localización periférica en la silueta hepática
- b. Localización central en la silueta hepática
- c. Se puede observar en el íleo biliar
- d. B y c son ciertas**

Pregunta 9

En el gas localizado portal, todo es verdadero excepto:

- a. Se observan imágenes aéreas lineales ramificadas que llegan a superficie hepática
- b. En adultos la causa más frecuente es la isquemia mesentérica
- c. Se observan imágenes lineales en la región central**
- d. En niños la causa más frecuente es la enterocolitis necrotizante

Pregunta 10

Dentro de los signos de líquido libre intraabdominal están todos menos uno:

- a. Aumento de densidad en vidrio deslustrado
- b. Signo de orejas de perro
- c. **Signo de diafragma continuo**
- d. Centralización de asas de delgado y separación de asas