

Comenzado el	jueves, 23 de agosto de 2018, 14:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 23 de agosto de 2018, 14:45
Tiempo empleado	2 minutos 59 segundos
Puntos	6,00/12,00
Calificación	5,00 de 10,00 (50%)
Comentario -	Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media fin

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos
 Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Son completamente distintas.
- c. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- d. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada
 Seleccione una:

- a. Cánula orofaríngea
- b. Intubación traqueal
- c. Mascarilla laríngea
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación traqueal

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso
 Seleccione una:

- a. No apuntar las constantes a la llegada.
- b. No revisar el estado del paciente.
- c. Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.
- d. No conectarlo a la red.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente

Seleccione una:

- a. Verificar su correcto funcionamiento.
- b. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Verificar que tiene batería suficiente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles de las causas no es una de las causas más frecuentes de la tos en niños entre 18 meses y 6 años

Seleccione una:

- a. Asma.
- b. Reflujo gastroesofágico.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Causas ORL.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reflujo gastroesofágico.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando llega al triaje un niño que ha sufrido un síncope. Qué es lo que tenemos que realizar Cuando llega al triaje un niño que ha sufrido un síncope. Qué es lo que tenemos que realizar

Seleccione una:

- a. Hablar con la familia de cómo ha sucedido el episodio, valoración de las constantes vitales, dolor y nivel de conciencia.
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Se realiza una valoración de constantes con palpación de pulsos arteriales, valoración del nivel de conciencia, el dolor y ECG.

- d. Realizar una entrevista dirigida para recoger datos de antecedentes familiares, de cómo se ha desencadenado el episodio, la existencia de síntomas premonitorios, toma de constantes con palpación de los pulsos arteriales, valorar nivel de conciencia, glucemia capilar y ECG en caso de sospecha de síncope cardiogénico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una entrevista dirigida para recoger datos de antecedentes familiares, de cómo se ha desencadenado el episodio, la existencia de síntomas premonitorios, toma de constantes con palpación de los pulsos arteriales, valorar nivel de conciencia, glucemia capilar y ECG en caso de sospecha de síncope cardiogénico.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la causa más frecuente de convulsión en la infancia

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Tumor cerebral
- c. Fiebre
- d. Epilepsia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fiebre

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la patología endocrina más frecuente en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Enfermedad de Cushing
- c. Hipotiroidismo
- d. Diabetes Mellitus tipo I

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diabetes Mellitus tipo I

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Intoxicación por productos del hogar

- b. Intoxicación por monóxido de carbono
- c. Intoxicación por antitérmicos
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Heridas
- b. Accidentes de tráfico
- c. Ahogamiento
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria. Indica la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.
- b. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica. Indica la correcta.

Seleccione una:

- a. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- b. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- c. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.