

### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que es el estado postcritico de un paciente:

Seleccione una:

- ☒ a. Periodo limitado de desorientación, badripsiquia y otros deficit neurologicos, tras un crisis convulsiva. ✓
- ☐ b. Momento tras la resolución de una reclamación de un paciente.
- ☐ c. Momento exacto en el que el paciente deja de estar critico.
- ☐ d. Denominación del síndrome de estancia en unidad de cuidados intensivos.

### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tirotóxica:

Seleccione una:

- ☐ a. Penicilinas.
- ☐ b. Gluten.
- ☒ c. Yodo. ✓
- ☐ d. Polen.

### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un objetivo al colocar una Sonda Nasogástrica (SNG) en el contexto de una posible hemorragia digestiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuantificar pérdidas de volemia.
- ☐ b. Confirmar sangrado/diagnostico.
- ☒ c. Garantizar alimentación y toma de medicación. ✓
- ☐ d. Proteger vía aérea.

#### Pregunta 4

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es un signo de complicación en un cólico reno ureteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Fiebre. ✓
- ☐ b. Vómitos.
- ☐ c. Dolor.
- ☐ d. Disuria.

#### Pregunta 5

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La FiO<sub>2</sub> máxima que obtendremos con una mascarilla venturi a 15 lpm será de:

Seleccione una:

- ☐ a. 1.
- ☐ b. 0,8.
- ☒ c. 50%-60%. ✓
- ☐ d. 27%-31%.

#### Pregunta 6

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Medicación de primera elección en caso de urgencia hipertensiva:

Seleccione una:

- ☒ a. Captopril 25mg VO. o SL. ✓
- ☐ b. Furosemia 40 mg IV.
- ☐ c. Labetalol capsulas de 20 mg VO.
- ☐ d. Tarka 180mg/2mg (verapamilo/trandolapril) VO.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que medicación, aún no siendo analgésico puro, alivia el dolor tipo cólico en un cuadro intestinal o urinario:

Seleccione una:

- ☐ a. Paracetamol.
- ☐ b. Ancha fibrin.
- ☒ c. Buscapina. ✓
- ☐ d. Nolotil.

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el shock hipovolémico la dobutamina se administración en una dosis de:

Seleccione una:

- ☒ a. Si TAS mayor que 90 mm Hg. 250 mg + 230 ml SG5% a 21 ml/h. ✓

- ☐ b. Si TAS menor que 100 mm Hg. 250 mg + 235 ml SG/dx5% a 21 ml/h.
- ☐ c. 250 ml + 230 ml SG/dx 5% a 40 ml/h.
- ☐ d. Si TAS = 90 mm Hg. 150 mg + 250 ml SSF 0.9% a 50 ml/h.

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una solución cristaloide hipertónica:

Seleccione una:

- ☒ a. Ringer Lactato. ✓
- ☐ b. Bicarbonato 1M.
- ☐ c. Glucosa 20%.
- ☐ d. Salino al 7,5 %.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que rango debe estar el PH en sangre arterial para considerarlo normal:

Seleccione una:

- ☒ a. De 7,35 a 7,45. ✓
- ☐ b. Entre 7 y 8.
- ☐ c. De 7,05 a 7,25.
- ☐ d. Entre 6 y 7.

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- ☐ a. Descenso del Ph.
- ☒ b. Aumento del Ph. ✓
- ☐ c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- ☐ d. Descenso del la PIC.

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes opciones, cual es la diferencia entre el shock séptico y los demás tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. No precisa reposición de volumen aún con hipotensión.
- ☐ b. No causa taquicardia (salvo en paciente betabloqueados).
- ☒ c. La necesidad de recoger hemocultivos y urocultivo. ✓
- ☐ d. Nunca se modifica la función respiratoria.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☒ a. Valorar ABCD. ✓
- ☐ b. Hacer glucemia capilar.
- ☐ c. Buscar cuerpos cetónicos.
- ☐ d. Administrar dextrosa/glucosa.

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El omeprazol es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓
- ☐ b. Un inhibidor de la bomba de electrones.
- ☐ c. Un antiemético.
- ☐ d. Un emetizante.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:

- ☐ a. Nauseas.
- ☐ b. Cefalea.
- ☐ c. Malestar general.
- ☒ d. Mareo con giro de objetos. ✓

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son contraindicaciones para usar sueros glucosados:

Seleccione una:

- ☒ a. TCE e hipertensión intracraneal. ✓

- ☐ b. Hipoglucemia y ansiedad.
- ☐ c. Ansiedad e hipoglucemia.
- ☐ d. Hipertensión e hipoglucemia.

**Pregunta 17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las últimas recomendaciones de tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, la saturación de oxígeno del paciente deberá estar:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 95% y 100%.
- ☒ b. Entre 90% y 95%. ✓
- ☐ c. En 90%.
- ☐ d. En 100%.

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:

- ☐ a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardiogénico y "IV" infarto NO complicado
- ☐ b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.
- ☒ c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓
- ☐ d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☐ a. El Ph.
- ☐ b. K+.
- ☐ c. Edema cerebral.
- ☒ d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NISHH, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:

- ☒ a. 1. ✓
- ☐ b. 0.
- ☐ c. 3.
- ☐ d. 2.



## Información

Marcar pregunta

### Texto informativo

Hombre de 70 años con EPOC, llega a urgencias con mal estado general, disnea, palidez, sudoración, ...

### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Valorar primero

Seleccione una:

- ☒ a. A-B-C-D. ✓
- ☐ b. Pulsioximetria.
- ☐ c. Frecuencia respiratoria.
- ☐ d. Tiraje.

### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Si no esta consciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar hipercapnia.
- ☐ b. VMNI.
- ☒ c. Algoritmo SVA. ✓
- ☐ d. VMI.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si está consciente, es criterio de gravedad:

Seleccione una:

- ☒ a. La cianosis intensa. ✓
- ☐ b. Tolera el decubito supino.
- ☐ c. Mantiene una conversación fluida.
- ☐ d. Deambula sin esfuerzo.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No nebulizar:

Seleccione una:

- ☐ a. Salbutamol.
- ☐ b. Bromuro de ipatropio.
- ☐ c. Budesonida.
- ☒ d. Adrenalina. ✓

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No administrar de inicio:

Seleccione una:

- ☐ a. Antitérmico si fiebre.

- ☐ b. Protectores gastricos.
- ☒ c. Antibioticos ✓
- ☐ d. Corticoides.

**Pregunta 6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis del salbutamol será:

Seleccione una:

- ☒ a. De 2,5 a 5 mg según FC. ✓
- ☐ b. de 10mg.
- ☐ c. 1 ampolla.
- ☐ d. 7,5 mg.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de bromuro de ipatropio será:

Seleccione una:

- ☐ a. 100 microgr
- ☐ b. 250 microgr.
- ☒ c. 500 microgr. ✓
- ☐ d. 600 microgr.

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de budesonida será:

Seleccione una:

- ☐ a. 0,5 mg.
- ☒ b. 1 mg. ✓
- ☐ c. 2 mg.
- ☐ d. 5 mg.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis de hidrocortisona será:

Seleccione una:

- ☒ a. 2 mg /kg. ✓
- ☐ b. 1 mg/kg.
- ☐ c. 100 mg.
- ☐ d. 500 mg.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras el primer tratamiento y atención, reevaluar a los

Seleccione una:

- ☐ a. 5 minutos.
- ☒ b. 10-15 minutos. ✓
- ☐ c. 30 minutos.
- ☐ d. 60 minutos.