

# Trauma en situaciones especiales

**Comenzado el** martes, 24 de marzo de 2020, 18:36

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** martes, 24 de marzo de 2020, 18:51

**Tiempo empleado** 14 minutos 44 segundos

**Puntos** 30,00/30,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** APTO

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Cuando se realice la evaluación secundaria en el paciente pediátrico traumático, se debe realizar la movilización en bloque con:

Seleccione una:

- a. 3 personas si se trata de niños y 2 si es un lactante
- b. 2 personas si se trata de niños y 3 si es un lactante
- c. 4 personas si se trata de niños y 3 si es un lactante
- d. 5 personas si se trata de niños y 4 si es un lactante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 personas si se trata de niños y 2 si es un lactante

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Dentro del Índice de trauma pediátrico, que parámetros se deben valorar:

Seleccione una:

- a. Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea
- b. Llantos, SNC, TAS, heridas, fracturas y vía aérea
- c. Peso, TAS, coloración de la piel, heridas, fracturas y vía aérea
- d. Todas las respuestas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Dentro de los fármacos utilizados en la secuencia de intubación rápida en un paciente pediátrico, la Atropina se considera un fármaco:

Seleccione una:

- a. Anticolinérgico
- b. Relajante muscular
- c. Sedante
- d. Relajante muscular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticolinérgico

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En los tratamientos con sueroterapia en un paciente geriátrico, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo
- b. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho
- c. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo
- d. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Entre los signos y síntomas circulatorios, ¿Cuáles no son indicadores fiables en los pacientes geriátricos?

Seleccione una:

- a. Relleno capilar
- b. Frecuencia cardiaca
- c. Tensión arterial
- d. Todas las respuestas son correctas

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En la actuación a una gestante, para evitar el síndrome de la vena cava, a partir de la semana 20 de gestación, se debe colocar en posición:

Seleccione una:

- a. Decúbito lateral izquierdo
- b. Decúbito lateral derecho
- c. Decúbito prono
- d. Decúbito supino en flexión

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Si el paciente pediátrico tiene una puntuación en el Índice de trauma pediátrico de 2 puntos, ¿Qué posibilidad tiene de que pueda fallecer?

Seleccione una:

- a. 60%
- b. 70%
- c. 80%
- d. 90%

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60%

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

A la hora de valorar el estado neurológico de un paciente, utilizaremos:

Seleccione una:

- a. El cuestionario de Lobo
- b. El cuestionario de Pfeiffer
- c. La escala de coma Glasgow
- d. Escala CRIES

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de coma Glasgow

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Señala cuál de los siguientes pasos, no se encuentran entre los necesarios para inmovilizar a un paciente en un tablero espinal:

Seleccione una:

- a. Inmovilizar primero con un collarín cervical
- b. Coordinará la maniobra el personal sanitario que esté en los pies del paciente
- c. Decidir la técnica más adecuada para la introducción del dispositivo
- d. Realizar la técnica y asegurar al paciente con cinchas o arnés araña

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coordinará la maniobra el personal sanitario que esté en los pies del paciente

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

A la hora de intubar a un paciente pediátrico, ¿Qué dosis utilizaremos de Propofol?

Seleccione una:

- a. 0,3-0,5 mg/kg
- b. 2-3 mg/kg
- c. 0,1-1 mg/kg
- d. 1-5 mc/kg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2-3 mg/kg

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿El collarín de trauma que funciones tiene?

Seleccione una:

- a. Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- b. Limita el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical
- c. Impide el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- d. Impide el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Un paciente pediátrico que está confuso, una TA normal y con un relleno capilar >2 segundos, ¿en que grado de shock hipovolémico cree que se encuentra?

Seleccione una:

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV

Retroalimentación

La respuesta correcta es: II

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Si un neonato tiene un llanto inconsolable, con una FiO<sub>2</sub> para SatO<sub>2</sub> mayor a 95% mayor que 0,3, con una FC y TAS menor al 20% de lo establecido como basal, con gemidos y despertar frecuente, ¿dentro de la escala de dolor para neonatos CRIES, que puntuación tendrá?

Seleccione una:

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- a. 6-8
- b. 8
- c. 10
- d. 12

Retroalimentación

< 6 meses un calibre de 6-8 French, 6 a 12 meses y 1 a 3 años calibre de 8 French, de 4 a 7 años un calibre de 10 French y > 8 años se utiliza un calibre de 10-12 French.

La respuesta correcta es: 8

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En una valoración primaria de un paciente, que orden se debe llevar:

Seleccione una:

- a. Circulación > Ventilación > Evaluación neurológica > Vía aérea > Exposición
- b. Vía aérea > Ventilación > Circulación > Evaluación neurológica > Exposición
- c. Evaluación neurológica > Ventilación > Vía aérea > Exposición > Circulación
- d. Circulación > Vía aérea > Evaluación neurológica > Exposición > Ventilación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía aérea > Ventilación > Circulación > Evaluación neurológica > Exposición

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

A la hora de realizar la técnica de volteo de un paciente que está decúbito prono, en el momento inicial de la asistencia, que factores debemos tener en cuenta a la hora de decidir el lado del giro del paciente y como lo vamos a realizar:

Seleccione una:

- a. Espacio del que disponemos
- b. Tipo de lesiones que presente el paciente
- c. Hacia donde mira el paciente
- d. Todas las respuestas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

El inmovilizador de cabeza, con respecto a su función y al collarín cervical:

Seleccione una:

- a. Se debe poner con complemento del collarín cervical y limita los movimientos laterales de la cabeza
- b. Nunca se debe poner con el collarín cervical y limita los movimientos laterales de la cabeza
- c. Se debe poner con complemento del collarín cervical y limita los movimientos de flexo-extensión de la cabeza

- d. Nunca se debe poner con el collarín cervical y limita los movimientos de flexo-extensión

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe poner con complemento del collarín cervical y limita los movimientos laterales de la cabeza

#### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

En una valoración primaria a un paciente pediátrico mayor de un año, ¿qué regla utilizaremos para determinar el tamaño de Tubo Endotraqueal, atendiendo a su edad?:

Seleccione una:

- a.  $4 + (\text{edad}/4)$
- b.  $5 + (\text{edad}/5)$
- c.  $4 + (\text{edad}/5)$
- d.  $6 + (\text{edad}/4)$

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es:  $4 + (\text{edad}/4)$

#### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

A la hora de colocar el collarín de trauma, ¿cuál será la primera parte del mismo que fijará al cuello?:

Seleccione una:

- a. La parte del collarín destinado a la nuca
- b. La parte del collarín destinado a la oreja
- c. La parte del collarín destinado a la barbilla
- d. Ninguna de ellas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La parte del collarín destinado a la barbilla

#### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

En la circulación, dentro de una gestante, entre los cambios anatomofisiológicos nos podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Una hipervolemia
- b. Aumento gradual hasta 40-60 lpm
- c. El gasto cardíaco aumenta hasta un 40%

d. Las respuestas a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a y c son correctas

### Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Una vez, colocado las piezas laterales del inmovilizador de cabeza, en qué orden y sobre que zonas anatómicas de la cabeza, se ponen las cintas que unen sendas piezas:

Seleccione una:

- a. Primero la cinta que se coloca en el mentón del paciente y después la cinta que pasa sobre la frente del paciente.
- b. Primero la cinta que se coloca en el boca del paciente y después la cinta que pasa sobre la frente del paciente.
- c. Primero la cinta que pasa sobre la frente del paciente y después la cinta que se coloca en el mentón del paciente.
- d. Ninguna de ellas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Primero la cinta que pasa sobre la frente del paciente y después la cinta que se coloca en el mentón del paciente.

### Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Si tenemos a una gestante que ha sufrido un traumatismo y vemos que sufre un sangrado vaginal, podemos sospechar que tiene en principio:

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico
- b. Desprendimiento de placenta
- c. Hemorragia fetomaterna
- d. Rotura uterina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desprendimiento de placenta

### Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué lesiones específicas pueden padecer una gestante tras un traumatismo?

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico

- b. Desprendimiento de placenta
- c. Rotura uterina
- d. Todas las respuestas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

#### Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

Dentro del síndrome de la vena cava que puede afectar a la paciente gestante, aunque la presión arterial se mantenga, la disminución del gasto cardiaco puede llegar hasta:

Seleccione una:

- a. 30-40%
- b. 40-50%
- c. 50-60%
- d. 60-70%

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30-40%

#### Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

Un paciente pediátrico de una edad inferior a tres años, que responde a estímulos dolorosos, está irritable o inconsolable, retira una pierna al dolor, ¿Qué puntuación, dentro de la escala Glasgow modificada para menores de 3 años, cree que puede tener?

Seleccione una:

- a. 7
- b. 8
- c. 9
- d. 10

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 9

#### Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

En una persona mayor a la hora de atender a un paciente geriátrico que ha sufrido un traumatismo, hay que tener presente como consideraciones especiales:

Seleccione una:

- a. El deterioro de los órganos sensoriales
- b. La variabilidad en el umbral al dolor
- c. El posible maltrato al mayor
- d. Todas las respuestas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

#### Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

Entre los cambios anatófisiológicos que nos podemos encontrar en la vía aérea de un paciente geriátrico, se encuentran:

Seleccione una:

- a. La flacidez, tanto cervical como temporomandibular, puede ocasionar dificultades para mantener la vía permeable.
- b. La cavidad bucal puede verse comprometida por una microglosia o una microstomía.
- c. La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una macrostomía.
- d. La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una microstomía.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una microstomía.

#### Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

A la hora de calcular la TAS, dentro de la valoración secundaria a un paciente pediátrico mayor de 2 años, utilizaremos la fórmula:

Seleccione una:

- a.  $6 + (2 \times \text{edad en años})$
- b.  $7 + (2 \times \text{edad en años})$
- c.  $8 + (2 \times \text{edad en años})$
- d.  $9 + (2 \times \text{edad en años})$

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es:  $8 + (2 \times \text{edad en años})$

#### Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Enunciado de la pregunta

Respecto a las consideraciones de los efectos de los medicamentos en el paciente anciano. Señale la opción incorrecta.

Seleccione una:

- a. Diuréticos, pueden dar un hipotensión ortostática
- b. Los AINEs puede aumentar la generación de coágulos en la sangre
- c. Los beta-bloqueantes limitan la actividad cronotrópica
- d. Los psicótropos pueden enmascarar las lesiones

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los AINEs puede aumentar la generación de coágulos en la sangre

### Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Si un paciente pediátrico, pesa unos 17 kg, tiene una vía aérea normal, una TAS de 45 mmHg, está obnubilado y no presenta fracturas pero si una pequeña herida, según el Índice de trauma pediátrico (ITP), que puntuación tendría:

Seleccione una:

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6