

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones gastrointestinales, musculoesqueléticas, endocrinas y hematológicas

Comenzado el martes, 1 de diciembre de 2020, 03:36

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 1 de diciembre de 2020, 03:38

Tiempo empleado 1 minutos 40 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una fractura conminuta:

Seleccione una:

- ☐ a. Presenta un trazo limpio con separación apreciable entre dos fragmentos
- ☒ b. Presenta múltiples fragmentos de diferentes tamaños y trazado irregular ✓
- ☐ c. Presenta dos o más trazos de fractura en un mismo hueso con fragmentos bien diferenciados entre los focos
- ☐ d. Presenta un trazo de fractura incompleto en una de las corticales del hueso

La respuesta correcta es: Presenta múltiples fragmentos de diferentes tamaños y trazado irregular

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un fijador externo se utiliza preferentemente en:

Seleccione una:

- ☐ a. Fracturas cerradas sin desplazar
- ☐ b. Fracturas que tras la reducción se mantienen estables
- ☒ c. Fracturas abiertas que requieren un proceso complejo en su reparación ✓
- ☐ d. Fracturas de los huesos cortos

La respuesta correcta es: Fracturas abiertas que requieren un proceso complejo en su reparación

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En un esguince:

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce una pérdida de contacto completa de las superficies articulares
- ☐ b. Se produce una pérdida de contacto parcial de las superficies articulares
- ☒ c. Se produce una torsión de la estructura articular sin pérdida de contacto en las superficies óseas ✓
- ☐ d. Se produce una fractura de las superficies óseas articulares

La respuesta correcta es: Se produce una torsión de la estructura articular sin pérdida de contacto en las superficies óseas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

El acortamiento evidente de la extremidad afectada es común en las fracturas de:

Seleccione una:

- ☐ a. Los metacarpianos
- ☒ b. Fémur ✓
- ☐ c. Rótula
- ☐ d. Calcáneo

La respuesta correcta es: Fémur

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Los signos de compresión excesiva de un vendaje inmovilizador son:

Seleccione una:

- ☒ a. Palidez, frialdad, alteraciones de la sensibilidad y disminución del relleno capilar de los dedos del miembro afectado ✓
- ☐ b. Calor, picor y enrojecimiento por encima del vendaje
- ☐ c. Flictenas rellenas de contenido serohemático en la piel perilesional
- ☐ d. Desaparición del dolor tras la toma de los analgésicos prescritos

La respuesta correcta es: Palidez, frialdad, alteraciones de la sensibilidad y disminución del relleno capilar de los dedos del miembro afectado

Pregunta 6


Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Marcar la afirmación incorrecta respecto a las fracturas abiertas:

Seleccione una:

- ☒ a. Se debe controlar el sangrado antes de proceder a su cobertura 
- ☐ b. Hay que identificar de manera precoz los signos de infección
- ☐ c. El estado de inmunización antitetánica del paciente no es relevante
- ☐ d. Hay que realizar una limpieza escrupulosa del foco y la piel circundante tan pronto como sea posible

La respuesta correcta es: El estado de inmunización antitetánica del paciente no es relevante

Pregunta 7


Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Al vigilar los signos de shock tras la fractura de pelvis se valorará la aparición de:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión y taquicardia
- ☐ b. Palidez y diaforesis
- ☐ c. Frialdez de extremidades y relleno capilar disminuido
- ☒ d. Todas las respuestas son ciertas 

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son ciertas

Pregunta 8


Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Un indicador de daño neurológico es la:

Seleccione una:

- ☒ a. La incapacidad para la movilización voluntaria del miembro afectado 
- ☐ b. La solución de continuidad de la piel perilesional
- ☐ c. La aparición de flictenas con contenido serohemático
- ☐ d. La inflamación de los dedos

La respuesta correcta es: La incapacidad para la movilización voluntaria del miembro afectado

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Al colocar un vendaje en las extremidades, los pulsos distales se comprobarán:

Seleccione una:

- ☐ a. Antes de la colocación
- ☐ b. Después de la colocación
- ☒ c. Las respuestas a y b son ciertas ✓
- ☐ d. Si tiene buen color en los dedos no es necesario controlar el pulso distal

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son ciertas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La sindactilia es un sistema de inmovilización utilizado en las lesiones de:

Seleccione una:

- ☒ a. Las falanges distales de los dedos ✓
- ☐ b. Los metatarsianos
- ☐ c. Los metacarpianos
- ☐ d. Todas las respuestas son falsas

La respuesta correcta es: Las falanges distales de los dedos

[Volver a: Módulo 3. Atenc... ➡](#)

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones gastrointestinales, musculoesqueléticas, endocrinas y hematológicas

Comenzado el martes, 1 de diciembre de 2020, 03:48

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 1 de diciembre de 2020, 03:52

Tiempo empleado 4 minutos 35 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las actividades de enfermería que podemos realizar para el cuidado de enfermedades óseas metabólicas, indique cual no es correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. En patologías como la osteoporosis o el raquitismo se debe recomendar una dieta rica en calcio
- ☒ b. Se debe recomendar dietas vegetarianas con alto contenido en oxalatos ✓
- ☐ c. Enseñar al paciente la colocación de los distintos dispositivos necesarios para el tratamiento ortopédico que requiera cada patología
- ☐ d. Instruir una correcta higiene postural

La respuesta correcta es: Se debe recomendar dietas vegetarianas con alto contenido en oxalatos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La osteomielitis secundaria:

Seleccione una:

- ☒ a. Es aquella en la que la implantación del microorganismo en el hueso es de forma indirecta ✓
- ☐ b. Es aquella en la que la implantación del microorganismo en el hueso es de forma directa
- ☐ c. Se produce como consecuencia de una fractura abierta
- ☐ d. No es tratable con antibióticos

La respuesta correcta es: Es aquella en la que la implantación del microorganismo en el hueso es de forma indirecta

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La etiología de la artrosis, viene dada por tres factores fundamentalmente:

Seleccione una:

- ☐ a. El envejecimiento, la alimentación y el ejercicio
- ☐ b. Procesos mecánicos, alimentación y envejecimiento
- ☒ c. Factores hereditarios, procesos mecánicos y el envejecimiento ✓
- ☐ d. No se conoce la etiología

La respuesta correcta es: Factores hereditarios, procesos mecánicos y el envejecimiento

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Las malformaciones osteoarticulares congénitas suelen ser ocasionadas por:

Seleccione una:

- ☒ a. Factores ambientales, genéticos y mixtos ✓
- ☐ b. Agentes infecciosos y mecánicos
- ☐ c. Factores genéticos exclusivamente
- ☐ d. Todas las afirmaciones son correctas

La respuesta correcta es: Factores ambientales, genéticos y mixtos

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

El raquitismo es una enfermedad carencial de la infancia producida por un déficit de calcio y fósforo en los niveles plasmáticos de sangre, que provoca:

Seleccione una:

- ☐ a. Astenia progresiva
- ☒ b. Descenso de la mineralización de huesos y cartílagos ✓
- ☐ c. Deterioro cognitivo
- ☐ d. Inflamación de encías

La respuesta correcta es: Descenso de la mineralización de huesos y cartílagos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria del tejido óseo que se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☒ a. Una inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, que puede afectar a otros órganos ✓
- ☐ b. Un síndrome no inflamatorio y crónico caracterizado por deterioro progresivo del cartílago articular
- ☐ c. La aparición de Nódulos de Heberden
- ☐ d. Una infección del hueso

La respuesta correcta es: Una inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, que puede afectar a otros órganos

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Una malformación congénita del sistema osteoarticular se produce:

Seleccione una:

- ☐ a. Por falta de vitamina A
- ☐ b. En la gametogénesis
- ☒ c. Durante la organogénesis del periodo embrionario ✓
- ☐ d. Por fallo en el desarrollo de la notocorda

La respuesta correcta es: Durante la organogénesis del periodo embrionario

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Entre las alteraciones metabólicas del tejido óseo producidas por alteración del metabolismo de los glúcidos, podemos destacar como la más representativa:

Seleccione una:

- ☒ a. El escorbuto ✗
- ☐ b. La enfermedad de Hurler o Gargolismo
- ☐ c. La enfermedad de Paget
- ☐ d. La osteomielitis

La respuesta correcta es: La enfermedad de Hurler o Gargolismo

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Los factores de riesgo más importantes para padecer osteoporosis son:

Seleccione una:

- ☐ a. Sexo femenino
- ☐ b. Raza blanca o asiática
- ☐ c. Edad avanzada
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

**En el tratamiento enfermero de las patologías osteoarticulares congénitas,
no es correcto:**

Seleccione una:

- ☒ a. Dar demasiada información a los padres sobre el uso y mantenimiento de los dispositivos ortopédicos ✓
- ☐ b. Que se realice un refuerzo positivo de los logros alcanzados por el paciente
- ☐ c. Que se fomente el autocuidado e independencia del paciente
- ☐ d. Que se permita plantear dudas y se facilite la información que ayude a resolverlas

La respuesta correcta es: Dar demasiada información a los padres sobre el uso y mantenimiento de los dispositivos ortopédicos

Volver a: Módulo 3. Atenc... ➡

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones gastrointestinales, musculoesqueléticas, endocrinas y hematológicas

Comenzado el martes, 1 de diciembre de 2020, 03:38

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 1 de diciembre de 2020, 03:47

Tiempo empleado 8 minutos 48 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

La fractura vertebral más estable:

Seleccione una:

- ☒ a. Es la fractura-luxación ❌
- ☐ b. Es la fractura con estallido
- ☐ c. Es la fractura acúñamiento
- ☐ d. Son todas igual de estables

La respuesta correcta es: Es la fractura acúñamiento

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Para evitar la aparición de edemas:

Seleccione una:

- ☒ a. Hay que mantener elevado el miembro afectado el mayor tiempo posible ✅
- ☐ b. Hay que aplicar un vendaje con mucha tensión para contenerlos
- ☐ c. Hay que realizar una movilización mínima de la extremidad afectada
- ☐ d. Solamente aplicando frío local se pueden reducir los edemas

La respuesta correcta es: Hay que mantener elevado el miembro afectado el mayor tiempo posible

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En una subluxación:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se suspende la tensión sobre la articulación puede retornar a la posición inicial
- ☐ b. Puede evolucionar a luxación completa si se manipula inadecuadamente
- ☒ c. Las respuestas a y b son ciertas ✓
- ☐ d. La inestabilidad no es propia de las luxaciones completas

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son ciertas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En el vendaje de Velpeau el almohadillado de la axila:

Seleccione una:

- ☒ a. Se pondrá suficiente para absorber la transpiración y evitar la maceración cutánea ✓
- ☐ b. Será abundante para separar el brazo del tórax
- ☐ c. No se colocará para evitar la separación del brazo del tórax
- ☐ d. Se pondrá la cantidad de almohadillado que reclame el paciente

La respuesta correcta es: Se pondrá suficiente para absorber la transpiración y evitar la maceración cutánea

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

El tratamiento quirúrgico de la fractura de calcáneo está indicado:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realiza en todos los casos
- ☐ b. No está indicado en ningún caso
- ☐ c. Cuando la deformidad es compatible con la funcionalidad anatómica
- ☒ d. Cuando la deformidad no es compatible con la funcionalidad anatómica o se trata de una fractura abierta ✓

La respuesta correcta es: Cuando la deformidad no es compatible con la funcionalidad anatómica o se trata de una fractura abierta

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

El mayor riesgo en la fractura de astrágalo es:

Seleccione una:

- ☒ a. La necrosis del ástragalo por isquemia ✓
- ☐ b. El desplazamiento de las partes blandas por el edema
- ☐ c. La inflamación de los ligamentos peroneos
- ☐ d. El apoyo doloroso del pie en la deambulación

La respuesta correcta es: La necrosis del ástragalo por isquemia

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Marcar la respuesta incorrecta en la fractura de anillo pélvico:

Seleccione una:

- ☐ a. La reparación quirúrgica se aplica en las fracturas muy inestables o desplazadas
- ☒ b. El paciente permanecerá sentado todo el tiempo que pueda si la fractura no está desplazada ✓
- ☐ c. El tratamiento ortopédico mediante reposo en cama plana está indicado en las fracturas no desplazadas
- ☐ d. La colocación de una tracción en suspensión tipo hamaca se aplica en fracturas con ligero desplazamiento

La respuesta correcta es: El paciente permanecerá sentado todo el tiempo que pueda si la fractura no está desplazada

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

El dolor y las parestesias en las extremidades tras un traumatismo cervical pueden indicar:

Seleccione una:

- ☐ a. Que el paciente tiene frío
- ☒ b. Una posible lesión medular ✓
- ☐ c. Hay que esperar para ver como evoluciona el cuadro
- ☐ d. Son síntomas sin relevancia

La respuesta correcta es: Una posible lesión medular

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En la manipulación de las lesiones cervicales:

Seleccione una:

- ☒ a. Es necesario realizar las movilizaciones en cama plana y con control cervical siempre hasta conocer el alcance de la lesión ✓
- ☐ b. Una vez colocado el collarín el paciente se puede mover libremente
- ☐ c. El paciente permanecerá incorporado para respirar mejor
- ☐ d. Hay que hacerlas con rapidez para que el dolor sea mínimo

La respuesta correcta es: Es necesario realizar las movilizaciones en cama plana y con control cervical siempre hasta conocer el alcance de la lesión

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La gravedad de un esguince se mide:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorando la impotencia funcional
- ☐ b. La inflamación que presenta
- ☐ c. La inestabilidad articular
- ☒ d. Todas las respuestas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son ciertas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La equimosis plantar precoz es típica de la fractura de:

Seleccione una:

- ☐ a. La fractura de tobillo
- ☒ b. La fractura de calcáneo ✓
- ☐ c. La fractura de los dedos del pie
- ☐ d. La fractura del peroné

La respuesta correcta es: La fractura de calcáneo

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En las fracturas bilaterales de fémur el riesgo de shock hipovolémico:

Seleccione una:

- ☐ a. Es improbable
- ☐ b. Es muy bajo
- ☐ c. Es moderado
- ☒ d. Es alto ✓

La respuesta correcta es: Es alto

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La mayor incidencia del “latigazo cervical” se produce en las vértebras:

Seleccione una:

- ☐ a. C1 y C2
- ☐ b. C2 y C3
- ☐ c. De C3 a C5
- ☒ d. De C4 a C7 ✓

La respuesta correcta es: De C4 a C7

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la fractura de meseta tibial la inmovilización inguinopédica se colocará en:

Seleccione una:

- ☐ a. Flexión a 45° a nivel de la rodilla
- ☒ b. Semiflexión anatómica similar a la de la rodilla en reposo ✓
- ☐ c. En extensión completa
- ☐ d. En la mayor flexión que permita el paciente

La respuesta correcta es: Semiflexión anatómica similar a la de la rodilla en reposo

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La complicación secundaria más frecuente de las fracturas costales es:

Seleccione una:

- ☒ a. La neumonía secundaria al acúmulo de secreciones ✓
- ☐ b. La falta de fuerza en las extremidades
- ☐ c. La necesidad de aumentar la ingesta de líquidos
- ☐ d. La fisioterapia respiratoria

La respuesta correcta es: La neumonía secundaria al acúmulo de secreciones

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En las fracturas en las que la piel ha sufrido una gran tensión:

Seleccione una:

- ☐ a. Aparece enrojecimiento que evoluciona a equimosis
- ☐ b. Aparecen flictenas de contenido seroso – serohemático
- ☐ c. El edema y la inflamación empeoran el pronóstico
- ☒ d. Todas las respuestas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son ciertas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En la fractura de cadera la pierna afectada se mantendrá en:

Seleccione una:

- ☐ a. En flexión y rotación interna
- ☐ b. En extensión sin ninguna elevación
- ☒ c. En abducción y posición neutra, manteniendo la elevación mediante el uso de almohadas-férulas ✓
- ☐ d. En extensión y rotación externa

La respuesta correcta es: En abducción y posición neutra, manteniendo la elevación mediante el uso de almohadas-férulas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Las costillas superiores y flotantes se rompen cuando el traumatismo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. Intensidad baja
- ☐ b. Intensidad moderada
- ☒ c. Intensidad alta ✓
- ☐ d. Es independiente de la intensidad

La respuesta correcta es: Intensidad alta

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la fractura de clavícula se puede ver afectado:

Seleccione una:

- ☐ a. La arteria poplítea
- ☐ b. La arteria cubital
- ☒ c. El plexo braquial ✓
- ☐ d. El plexo femoral

La respuesta correcta es: El plexo braquial

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El doppler, arteriografía y electromiografía están indicados ante la sospecha de:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesión cutánea
- ☒ b. Lesión vascular o nerviosa ✓
- ☐ c. Lesión ósea
- ☐ d. Lesión del tejido subcutáneo

La respuesta correcta es: Lesión vascular o nerviosa

[Volver a: Módulo 3. Atenc... ➡](#)

Cuidados de práctica avanzada al paciente con alteraciones gastrointestinales, musculoesqueléticas, endocrinas y hematológicas

Comenzado el martes, 1 de diciembre de 2020, 03:53

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 1 de diciembre de 2020, 04:01

Tiempo empleado 7 minutos 40 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a los cuidados de colaboración enfermera en la osteomielitis, en la administración de terapias intravenosas con antibióticos (vancomicina) debemos evitar:

Seleccione una:

- ☒ a. El llamado síndrome del hombre rojo ocasionado por la administración demasiado rápida del antibiótico ✓
- ☐ b. El llamado síndrome del hombre rojo ocasionado por la administración intramuscular del antibiótico
- ☐ c. El llamado síndrome del hombre rojo ocasionado por la administración demasiado lenta del antibiótico
- ☐ d. Todas son incorrectas

La respuesta correcta es: El llamado síndrome del hombre rojo ocasionado por la administración demasiado rápida del antibiótico

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La osteomalacia dependiente de vitamina D se produce como consecuencia de:

Seleccione una:

- ☒ a. Una ingesta inadecuada de vitamina D o por defectos en su metabolismo ✓
- ☐ b. Defectos tubulares renales
- ☐ c. Alteraciones en la absorción de potasio
- ☐ d. Una ingesta inadecuada de ácidos grasos

La respuesta correcta es: Una ingesta inadecuada de vitamina D o por defectos en su metabolismo

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Entre los diagnósticos enfermeros que se citan a continuación, ¿cuál no sería el más apropiado aplicar en relación a la artritis reumatoide?

Seleccione una:

- ☒ a. Alteración de la nutrición relacionado con un aporte inadecuado de calcio ✓
- ☐ b. Alto riesgo de manejo inadecuado del régimen terapéutico en relación con el desconocimiento de la patología y tratamiento farmacológico
- ☐ c. Fatiga en relación con proceso inflamatorio crónico
- ☐ d. Trastorno de la imagen corporal en relación a la deformidad de las articulaciones

La respuesta correcta es: Alteración de la nutrición relacionado con un aporte inadecuado de calcio

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En una analítica de sangre cuando la fosfatasa alcalina sérica está muy elevada nos indica:

Seleccione una:

- ☒ a. La existencia de un importante recambio óseo ✓
- ☐ b. Un aumento de la absorción intestinal de calcio
- ☐ c. Un descenso de la formación de osteocitos
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: La existencia de un importante recambio óseo

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Para el diagnóstico de la artritis reumatoide, una de las pruebas analíticas que se piden es la VSG y la proteína C reactiva, ¿qué nos indican estos parámetros?

Seleccione una:

- ☒ a. Nos indican un estadio de inflamación activa ✓
- ☐ b. Nos indican un elevado recambio óseo
- ☐ c. Nos indican la presencia de daño sinovial
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Nos indican un estadio de inflamación activa

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Entendemos por espondilolistesis:

Seleccione una:

- ☐ a. La curvatura lateral de la columna vertebral
- ☐ b. La fusión incompleta de los arcos vertebrales durante el periodo embrionario
- ☒ c. El desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre el inmediato inferior ✓
- ☐ d. El desplazamiento posterior de un cuerpo vertebral sobre el inmediato superior

La respuesta correcta es: El desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre el inmediato inferior

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Entre las deformidades esqueléticas que se producen en la enfermedad de Hurler o gargolismo, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Facies de gárgola
- ☐ b. Cifosis a nivel de D-12
- ☐ c. Cuello corto
- ☒ d. Arqueamiento de las piernas ✓

La respuesta correcta es: Arqueamiento de las piernas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La aparición de nódulos de Heberden es característica de:

Seleccione una:

- ☐ a. Osteomielitis
- ☐ b. Artritis reumatoide
- ☒ c. Artrosis ✓
- ☐ d. Artritis séptica

La respuesta correcta es: Artrosis

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Entre los factores de riesgo más importantes para padecer osteoporosis, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Dieta baja en calcio y vitamina D
- ☐ b. Raza blanca o asiática
- ☐ c. Edad avanzada (a partir de los 40 años)
- ☒ d. Sexo masculino (más frecuente en hombres que en mujeres) ✓

La respuesta correcta es: Sexo masculino (más frecuente en hombres que en mujeres)

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En estadios crónicos de la artritis reumatoide, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Aparece deformación en manos
- ☐ b. Puede aparecer pleuritis y esplenomegalia
- ☒ c. Se produce una regeneración articular ✓
- ☐ d. Aparecen nódulos subcutáneos

La respuesta correcta es: Se produce una regeneración articular

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Indique cual o cuales de los siguientes microorganismos pueden causar osteomielitis:

Seleccione una:

- ☐ a. Staphylococcus aureus
- ☐ b. Salmonella
- ☐ c. Staphylococcus epidermidis
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y sistémica caracterizada por:

Seleccione una:

- ☐ a. Degeneración generalizada de cartílagos articulares
- ☒ b. Inflamación de articulaciones y tejidos circundantes, pudiendo afectar también a otros órganos ✓
- ☐ c. Inflamación de articulaciones y tejidos circundantes exclusivamente
- ☐ d. Inflamación de periostio y pericondrio

La respuesta correcta es: Inflamación de articulaciones y tejidos circundantes, pudiendo afectar también a otros órganos

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La artrosis es una enfermedad articular degenerativa y crónica caracterizada por deterioro progresivo del cartilago articular, de las siguientes afirmaciones señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un síndrome inflamatorio y agudo
- ☐ b. Es un síndrome no inflamatorio y agudo
- ☐ c. Es un síndrome inflamatorio y crónico
- ☒ d. Es un síndrome no inflamatorio y crónico ✓

La respuesta correcta es: Es un síndrome no inflamatorio y crónico

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Las malformaciones osteoarticulares congénitas suelen ser ocasionadas por:

Seleccione una:

- ☒ a. Factores ambientales, genéticos y mixtos ✓
- ☐ b. Agentes infecciosos y mecánicos
- ☐ c. Factores genéticos exclusivamente
- ☐ d. Todas las afirmaciones son correctas

La respuesta correcta es: Factores ambientales, genéticos y mixtos

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La hipertrofia de la articulación interfalángica distal, se conoce con el nombre de:

Seleccione una:

- ☒ a. Nódulos de Bouchard ✓
- ☐ b. Nódulos de Heberden
- ☐ c. Enfermedad de Hurler
- ☐ d. Nódulos de Paccini

La respuesta correcta es: Nódulos de Bouchard

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La osteomielitis es una infección que afecta al hueso, médula ósea y tejido blando adyacente causada generalmente por bacterias gramnegativas. Consideramos que una osteomielitis es crónica cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay una infección del hueso con menos de un mes de evolución
- ☒ b. Hay una infección del hueso con más de un mes de evolución o aquella que no ha respondido al tratamiento antibiótico inicial ✓
- ☐ c. Únicamente aquella que no responde al tratamiento antibiótico inicial
- ☐ d. Aquella con más de 6 meses de tratamiento antibiótico

La respuesta correcta es: Hay una infección del hueso con más de un mes de evolución o aquella que no ha respondido al tratamiento antibiótico inicial

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Una dieta rica en calcio, fósforo y vitamina D debe incorporar los siguientes alimentos:

Seleccione una:

- ☐ a. Leche desnatada, mantequilla y queso
- ☒ b. Aceite de hígado de bacalao, salmón y huevos ✓
- ☐ c. Sardinas, aceite de girasol y fruta
- ☐ d. Lácteos, carnes rojas y verdura

La respuesta correcta es: Aceite de hígado de bacalao, salmón y huevos

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Un traumatismo en una articulación que daña el cartilago articular puede producir:

Seleccione una:

- ☐ a. Osteoartritis reumatoide
- ☒ b. Artrosis secundaria ✓
- ☐ c. Artritis reumatoide
- ☐ d. Artrosis idiopática

La respuesta correcta es: Artrosis secundaria

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

El tratamiento farmacológico de elección más utilizado en la enfermedad de Paget es:

Seleccione una:

- ☒ a. Calcitonina, tobramicina y fosfatos ✗
- ☐ b. Bifosfonatos y tobramicina
- ☐ c. Clindamicina y calcio
- ☐ d. Plicamicina, bifosfonatos y calcitonina

La respuesta correcta es: Plicamicina, bifosfonatos y calcitonina

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El escorbuto se produce por un déficit prolongado de:

Seleccione una:

- ☐ a. Vitamina A
- ☐ b. Vitamina B
- ☐ c. Calcio
- ☒ d. Ácido ascórbico ✓

La respuesta correcta es: Ácido ascórbico

[Volver a: Módulo 3. Atenc... ➡](#)