

Comenzado el jueves, 18 de enero de 2018, 11:19

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 18 de enero de 2018, 11:46

Tiempo empleado 26 minutos 47 segundos

Puntos 25,00/25,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al administrar la medicación a través de una sonda enteral (señala la opción incorrecta).

Seleccione una:

- a. Todas son correctas ✓
- b. No mezclar con la fórmula nutricional.
- c. Debemos administrar preferentemente formas líquidas.
- d. Las preparaciones con cubierta entérica no deben triturarse

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de estos métodos no está indicado para la realización de gastrostomía en caso de achalasia.

Seleccione una:

- a. Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) ✓
- b. Todas están indicadas.
- c. Gastrostomía quirúrgica.
- d. Gastrostomía radiológica percutánea (PRG)

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El control de la diuresis en el seguimiento de la NPD se incluye en:

Seleccione una:

- a. Control de las vías de acceso enteral.
- b. Controles nutricionales
- c. Controles analíticos
- d. Cuidados clínicos básicos ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En caso de administración continua de nutrición enteral (señala la opción correcta).

Seleccione una:

- a. Debe ser administrada con bomba de infusión.
- b. Debe detenerse la administración durante el aseo.
- c. Todas son correctas ✓
- d. Por regla general no debe administrarse agua mezclada con la fórmula nutricional

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En caso de estrés grave las necesidades proteicas son:

Seleccione una:

- a. 3 gr/kg/día
- b. 1 gr/kg/día ✓
- c. 1,3 gr/kg/día
- d. 2 gr/kg/día

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuál de los siguientes casos no está indicada la Nutrición Parenteral:

Seleccione una:

- a. Todas ellas son incorrectas ✓
- b. Cuando la vía enteral no es segura
- c. Tolerancia oral limitada
- d. Periodo de ayuno superior a 14 días.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el síndrome de realimentación se observa todo lo siguiente excepto:

Seleccione una:

- a. Hipopotasemia.
- b. Hipocloremia ✓
- c. Hipofosfatemia
- d. Hipomagnesemia

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la administración de NPT es importante no superar la tasa de oxidación de glucosa:

Seleccione una:

- a. 6-8 mg/kg/día
- b. 2-4 mg/kg/día
- c. 4-5 mg/kg/día ✓
- d. 5-7 mg/kg/minuto

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la administración de nutrición enteral intermitente (señala la respuesta correcta).

Seleccione una:

- a. Puede utilizarse en la administración en intestino.
- b. No produce elevados residuos gástricos.
- c. Puede administrarse con jeringa ✓
- d. No es la forma más fisiológica.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Es contraindicación relativa de la nutrición enteral:

Seleccione una:

- a. HDA grave activa
- b. Malabsorción grave
- c. Vómitos incoercibles ✓
- d. Ileo paralítico

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La causa más frecuente de extracción de SNG es:

Seleccione una:

- a. Tos.
- b. Movilización del paciente
- c. Pacientes desorientados y agitados. ✓
- d. Limpieza inadecuada de la sonda

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La instrucción oral en la educación del paciente/cuidador de la Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) debe ser... (señala la opción incorrecta)

Seleccione una:

- a. En una sola sesión y de forma no repetitiva ✓
- b. Con diálogo abierto
- c. Sencilla y con lenguaje comprensible
- d. Afianzando lo aprendido.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La longitud mínima de la SNG en adultos debe ser:

Seleccione una:

- a. 75 cm.
- b. 90 cm. ✓
- c. 120 cm.
- d. 60 cm.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La NPT se protegé de la luz para...

Seleccione una:

- a. Evitar la formación de peróxidos ✓
- b. Evitar que se contamine
- c. Mantener la intimidad del paciente
- d. Estar más protegida

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La Nutrición Parenteral debe administrarse por vía central si la osmolaridad supera...

Seleccione una:

- a. 600 mOsm/l
- b. 1200 mOsm/l
- c. 900 mOsm/l ✓
- d. 1000 mOsm/l

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La osmolalidad de la formula nutricional viene determinada por:

Seleccione una:

- a. C. Proteínas
- b. A y C son correctas ✓
- c. B. Lípidos
- d. A. Hidratos de Carbono

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La yeyunostomía está contraindicada en caso de:

Seleccione una:

- a. C. Ascitis masiva
- b. A y C son correctas ✓
- c. B. Estenosis pilórica.
- d. A. Fístula digestiva alta.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las complicaciones más frecuentes relacionadas con la Nutrición Enteral son:

Seleccione una:

- a. B. Complicaciones de la sonda
- b. B y C son correctas. ✓
- c. C. Gastrointestinales
- d. A. Metabólicas

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las formulas poliméricas suelen incluir como fuente de hidratos de carbono. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Almidón
- b. Dextrinomaltosa
- c. Polisacáridos de glucosa.
- d. Disacáridos ✓

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la opción incorrecta respecto a las nutriciones parenterales todo en uno.

Seleccione una:

- a. Necesitan menos manipulación
- b. Necesitan una bomba de administración
- c. Incluyen aminoácidos, lípidos e hidratos de carbono
- d. Requieren mayor gasto de fungible y personal sanitario. ✓

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se prevé la administración de nutrición enteral más de 6 semanas en un paciente con bajo nivel de conciencia la vía de administración adecuada es:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Sonda nasoyeyunal
- c. Sonda gástrica.
- d. Gastrostomía ✓

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Son causas de diarrea durante la administración de la Nutrición Enteral. Señale la opción incorrecta

Seleccione una:

- a. Administración intermitente ✓

- a. Administración intermitente
- b. Flujo rápido
- c. Contaminación de la fórmula nutricional.
- d. Fórmula hiperosmolar

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una complicación de la NPT es la hepatopatía. Señala la opción incorrecta.

Seleccione una:

- a. Aparece generalmente cuando se llevan más de dos semanas de tratamiento.
- b. Puede evolucionar a cirrosis.
- c. Es poco frecuente ✓
- d. Suele revertir cuando se suspende.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una fórmula nutricional considerada hiperproteica aporta...

Seleccione una:

- a. >25% de las calorías en forma de proteínas
- b. >15% de las calorías en forma de proteínas
- c. >18% de las calorías en forma de proteínas ✓
- d. >20% de las calorías en forma de proteínas

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una fórmula nutricional se considera hipercalórica si aporta...

Seleccione una:

- a. >1,3 kcal/ml
- b. >2 kcal/ml
- c. >1,5 kcal/ml.
- d. >1,1 kcal/ml ✓

