



☎ Teléfono: +34 983 377 999

✉ Correo electrónico: dptosoporte@fecyl.com

Página Principal ► Mis cursos ► FC\_Ginecologia\_ABRIL 2018 ► Prueba de Evaluación ► Evaluación del Curso

**Comenzado el** domingo, 29 de abril de 2018, 18:31

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 29 de abril de 2018, 19:44

**Tiempo empleado** 1 hora 12 minutos

**Puntos** 28,0/40,0

**Calificación** 7,0 de 10,0 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

La exploración mamaria de una paciente debe incluir:

Seleccione una:

- ☐ a. Palpación.
- ☐ b. Exploración de la axila.
- ☐ c. Inspección.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En una torsión ovárica/anexial, en caso de que exista un gran compromiso circulatorio se realiza la extirpación del anejo:

Seleccione una:

- ☐ a. Sin destorsionar y en bloque porque de este modo la cirugía es más sencilla y rápida.
- ☐ b. Destorsionando el anejo para poder drenar su contenido.
- ☒ c. Sin destorsionar y en bloque porque existe riesgo de embolismo pulmonar. ✓
- ☐ d. Destorsionando el anejo para poder resecarlo sin complicaciones.

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Señale la opción falsa respecto a la actuación del personal sanitario en el servicio de urgencias ante una agresión sexual:

Seleccione una:

- ☐ a. Tratamiento inmediato de las lesiones físicas.
- ☐ b. Prevención de las ITS, incluida la profilaxis post-exposición frente al VIH.
- ☐ c. Administración de anticoncepción de urgencia en caso de riesgo de embarazo si el test de orina de b-HCG es positivo.
- ☒ d. Asistencia psicológica. ✗

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntuá 0,0 sobre 1,0

Identifica la respuesta correcta en relación con los factores de riesgo para desarrollar un SHO:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son falsas.
- ☒ b. Tener un IMC elevado. ✗
- ☐ c. Formación de un número pequeño de folículos de tamaño intermedio (10-14 mm).
- ☐ d. Mujer joven, debido a una menor reserva ovárica.

Pregunta **5**

Correcta

Puntuá 1,0 sobre 1,0

Con respecto a una agresión sexual donde la paciente desea denunciar el procedimiento es:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas. ✓
- ☐ b. Una vez la paciente ha puesto la denuncia, el médico adjunto responsable del servicio realizará la exploración y toma de muestras de forma conjunta con el médico forense.
- ☐ c. La Policía Nacional se encarga de recoger en el servicio de urgencias a la paciente, llevarla a poner la denuncia y trasladarla de nuevo al hospital para la exploración y toma de muestras.
- ☐ d. Llamar al Servicio de Atención a la Mujer de cada comunidad autónoma o a la Policía Nacional (091).

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta incorrecta respecto a la mastitis no puerperal:

Seleccione una:

- ☒ a. La mastitis es una causa de dolor cíclico. ✓
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☐ c. La mastitis es infección de la mama, que se origina por la entrada de patógenos a través de lesiones en la piel o en los pezones.
- ☐ d. La mastitis no puerperal suele ser secundaria a la manipulación del pezón en las relaciones sexuales o a la fricción con la ropa.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

El principal factor de riesgo para que se produzca una torsión de ovario o de anejo es:

Seleccione una:

- ☒ a. Aumento del tamaño del anejo. ✓
- ☐ b. Deportes de impacto.
- ☐ c. Relaciones sexuales muy frecuentes.
- ☐ d. Todas son correctas.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta INCORRECTA respecto al SHO:

Seleccione una:

- ☐ a. La SEF y la SEGO la clasifican en cuatro estadios según su gravedad.
- ☒ b. Una vez se da el embarazo se produce una mejoría significativa del cuadro. ✓
- ☐ c. Es una complicación iatrogénica de las técnicas de reproducción asistida.
- ☐ d. El factor desencadenante es la hormona HCG, tanto exógena como endógena.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Es característico entre las mujeres que sufren agresiones sexuales encontrarnos con:

Seleccione una:

- ☐ a. Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa.
- ☒ b. Todas son correctas. ✓
- ☐ c. Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas.
- ☐ d. Hematomas o contusiones en zonas sospechosas (cabeza, cara, parte interna de brazos o muslos).

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Sobre la anticoncepción de urgencia es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Los efectos secundarios registrados con levonorgestrel son graves por lo que hay que utilizarlo con mucha precaución.
- ☐ b. Si aparecieran vómitos a las 3-4 horas de la toma, se debe repetir la pauta.
- ☐ c. Se ha demostrado que si se produjera la fertilización e implantación, la gestación progresaría a pesar de la administración.
- ☒ d. b y c son ciertas. ✓

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En el tratamiento preventivo de las ITS se incluye:

Seleccione una:

- ☐ a. Tratamiento preventivo para clamidia.
- ☐ b. Solo para sífilis.
- ☒ c. Tratamiento para gonococia, clamidia y sífilis. ✓
- ☐ d. Tratamiento preventivo para gonococia.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál de los siguientes microorganismos causantes de ITS es también causante frecuente de Bartholinitis?

Seleccione una:

- ☒ a. N. gonorrheae. ✓
- ☐ b. T. Pallidum.
- ☐ c. Virus herpes simple.
- ☐ d. a y b son correctas.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Los miomas pueden sufrir necrosis debida al fallo circulatorio en los vasos del tumor.
- ☒ b. Durante el embarazo, los miomas suelen disminuir de tamaño. ✓
- ☐ c. Los miomas pueden sufrir cambios degenerativos como resultado de alteraciones circulatorias, infecciosas o por cambios hormonales.
- ☐ d. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen.

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntuá 0,0 sobre 1,0

Con respecto a las urgencias mamarias no puerperales, señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La exploración de las mamas incluye la realización de una ecografía urgente.
- ☒ b. El motivo de consulta más frecuente es la secreción del pezón. **✗**
- ☐ c. Todas son falsas.
- ☐ d. Suponen el 50 % de las consultas en urgencias ginecológicas.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntuá 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta en relación con la exploración mamaria:

Seleccione una:

- ☐ a. Toda exploración de la mama incluye obligatoriamente la inspección y la palpación, la exploración de la axila es opcional.
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☒ c. En caso de observarse nódulos o masas a nivel axilar hay que realizar confirmación con pruebas de imagen de manera inmediata. **✗**
- ☐ d. La exploración de la axila se practica con la paciente sentada, los brazos caídos y paralelos al tórax, mientras que con una mano el explorador moviliza el miembro superior mientras con la otra explora la cavidad axilar.




Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Debe realizarse con la mano extendida, palpando toda la superficie mamaria, siguiendo la dirección contraria a las de las agujas del reloj sin olvidar ninguna zona.  

- ☐ b. La palpación de la mama se realiza con la paciente en decúbito supino, los brazos flexionados y las manos detrás de la cabeza.
- ☐ c. Si la sintomatología que refiere la paciente es unilateral, siempre se comenzará palpando primero la mama sintomática.
- ☐ d. Todas son correctas.


Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

No es muy común que una mujer acuda a la urgencia refiriendo tener un objeto alojado en la vagina, pero cuando sucede resultar ser una situación incómoda y vergonzosa para ella por lo que en estas situaciones debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar que sea un hombre quien la atienda para no aumentar su malestar.
- ☐ b. Comentarle con el resto del equipo de la urgencia, aunque no vayan a atenderla, simplemente para que estén informados.
- ☒ c. Preservar su intimidad, normalizar la situación, desculpabilizar y tener una actitud empática y de escucha activa. 
- ☐ d. a y b son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Con respecto al uso de la anticoncepción de urgencia es cierto que:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas. ✓
- ☐ b. Violación.
- ☐ c. Relaciones sexuales poco controladas bajo el efecto de drogas o alcohol.
- ☐ d. Cuando se ha realizado el coito sin ningún método anticonceptivo o los métodos se han utilizado incorrectamente.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Con respecto a la toma de muestras vaginales tras una agresión sexual, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Toma de muestra del fondo de saco vaginal con hisopo para investigación de esperma.
- ☐ b. Toma de muestras para la investigación de tricomonas.
- ☐ c. Toma endocervical para la investigación de clamidias.
- ☒ d. Toma de muestras con hisopo para la investigación de cándidas. ✓

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta en relación con la endometriosis:

Seleccione una:

- ☒ a. El embarazo en general, produce una importante involución de las lesiones. ✓
- ☐ b. El diagnóstico definitivo se realiza mediante TAC.
- ☐ c. El tratamiento médico se basa en el establecimiento de diferentes pautas de radioterapia convencional.
- ☐ d. La exploración visual genital revela alteraciones características.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Las complicaciones más frecuentes tras cirugías en la mama son:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas. ✓
- ☐ b. Seroma.
- ☐ c. Hematoma.
- ☐ d. Linfedema.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta incorrecta respecto a las masas pélvicas:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede deberse a la presencia de un carcinoma de endometrio.
- ☒ b. En las pacientes en edad fértil es más fácil el diagnóstico diferencial. ✓
- ☐ c. La sintomatología puede deberse a múltiples enfermedades, tanto ginecológicas como no ginecológicas por lo que el diagnóstico diferencial es fundamental.
- ☐ d. Ante una mujer que refiere una masa pélvica o sintomatología compatible con la misma son de utilidad diagnóstica el tacto bimanual con la vejiga vacía y la ecografía vaginal y/o abdominal con o sin doppler.

Pregunta **23**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Su mayor eficacia se produce cuando ha ocurrido la ovulación. ✗
- ☐ b. Tiene una vida media de 12 horas.
- ☐ c. El acetato de ulipristal es de venta libre en farmacias.
- ☐ d. Es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno.

Pregunta **24**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Ante la presencia de flujo anormal en niñas debe descartarse la presencia de:

Seleccione una:

- ☐ a. Vulvovaginitis infecciosa.
- ☒ b. Infección de transmisión sexual. ✖
- ☐ c. Cuerpo extraño en vagina.
- ☐ d. a y c son correctas.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Ante un hematoma vulvar, la primera medida a tomar será:

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna es correcta. ✔
- ☐ b. Administración de anticoagulantes.
- ☐ c. Compresión.
- ☐ d. Apertura quirúrgica del hematoma para drenarlo.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

El tratamiento en las mastitis no puerperales es:

Seleccione una:

- ☐ a. En estas mastitis el tratamiento antibiótico no tiene efectividad.
- ☐ b. Presión fuerte en el pecho con un sujetador deportivo.
- ☒ c. Antibiótico, recomendado Clindamicina 300 mg/6 horas, durante 10 días. ✓
- ☐ d. Simplemente calor seco para aliviar los síntomas.

Pregunta **27**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

El catéter de Word se puede utilizar para:

Seleccione una:

- ☐ a. Extirpar la glándula de Bartholino.
- ☐ b. Ninguna es correcta.
- ☒ c. Evitar recidivas en un episodio de Bartholinitis tras la marsupialización. ✗
- ☐ d. Promover la curación en un episodio de Bartholinitis tras la marsupialización.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Con respecto a la actuación de la medicina forense en una agresión sexual en el servicio de urgencias señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Grabación de la entrevista con la mujer. ✓
- ☐ b. Realización del Informe Médico Forense para el Juzgado.
- ☐ c. Toma de muestras de interés legal.
- ☐ d. Señalar la localización e importancia de las lesiones (fotografiar lesiones).

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Las lesiones vaginales pueden ser producidas por, señale la INCORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Debido a relaciones sexuales.
- ☒ b. Por la toma de anticonceptivo orales durante más de 20 años. ✓
- ☐ c. Objetos como tampones con aplicadores de plástico, pesarios o cuerpo extraños.
- ☐ d. El agua a presión que entre en la vagina tras caídas en deportes acuático.

Pregunta **30**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta en relación con la exploración mamaria:

Seleccione una:

- ☒ a. En caso de observarse nódulos o masas a nivel axilar hay que realizar confirmación con pruebas de imagen de manera inmediata. ✗
- ☐ b. El explorador pide que la paciente tenga elevado el brazo mientras con explora la cavidad axilar.
- ☐ c. La exploración de la axila se practica con la paciente tumbada, los brazos caídos y paralelos al tórax.
- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta **31**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Respecto a la enfermedad de Zuska:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas. ✓
- ☐ b. Se pueden formar abscesos retroareolares (en el comienzo de la zona areolar) y, en fases avanzadas, la fistulización de los mismos hacia la piel.
- ☐ c. La cronificación se debe a la obstrucción de los conductos galactóforos por detritus, sebo y queratina y su posterior infección, debido a la acción del tabaco que produce una metaplasia escamosa.
- ☐ d. Es una mastitis que tiende a cronificar, sobre todo en mujeres jóvenes y fumadoras.



Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Con respecto a la anticoncepción de urgencia, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas. ✓
- ☐ b. No es un método anticonceptivo habitual.
- ☐ c. Es un método seguro, eficaz, bien tolerado y no es abortivo ni teratígeno.
- ☐ d. No protege frente a ITS.

Pregunta **33**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

El tratamiento de las hemorragias uterinas disfuncionales suele ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Corticoides.
- ☐ b. Hormonas.
- ☒ c. AINEs. ✗
- ☐ d. Metotrexato.

Pregunta **34**

Correcta

Puntuá 1,0 sobre 1,0

Las hemorragias uterinas disfuncionales se clasifican en:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta.
- ☒ b. Ovulatorias y anovulatorias. ✓
- ☐ c. Cíclicas y acíclicas.
- ☐ d. Orgánicas, sistémicas y iatrogénicas.

Pregunta **35**

Correcta

Puntuá 1,0 sobre 1,0

Señala las principales causas de las lesiones vaginales:

Seleccione una:

- ☐ a. Uso de tampones con aplicadores de plástico.
- ☐ b. El agua a presión que entra en la vagina tras caídas en deportes acuáticos.
- ☐ c. Pesarios.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **36**

Incorrecta

Puntuación 0,0 sobre 1,0

Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ a. Obligar a masturbarse a una mujer, es un atentado contra la libertad sexual pero no se considera una agresión sexual.
- ☐ b. La agresión sexual provoca deterioro del bienestar físico, psíquico y social de la mujer, tanto a corto como a largo plazo, y también a la de personas que viven con ellas o dependen de ella.
- ☐ c. Obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales con terceros se considera una agresión sexual.
- ☒ d. La violencia o agresión sexual ocurre siempre que se impone a la mujer un comportamiento sexual contra su voluntad. ✖

Pregunta **37**

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Señala la respuesta correcta con respecto a la tumoración mamaria:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un criterio de malignidad la presencia de una superficie lisa de la tumoración.
- ☐ b. Es un signo de malignidad la presencia de bordes bien delimitados de la lesión.
- ☒ c. Es un criterio de benignidad que la lesión no esté adherida a la piel o a los planos profundos. ✔
- ☐ d. Es un criterio de benignidad la presencia de adenopatías.


Pregunta **38**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

El diagnóstico de la EIP se basa en:

Seleccione una:

- ☒ a. En la presencia de los criterios de Hager, siendo necesario la presencia de todos los criterios menores y al menos uno de los mayores. 
- ☐ b. En la presencia de los criterios de Henderson, siendo necesario la presencia de al menos un criterio mayor y un criterio menor.
- ☐ c. En la presencia de los criterios de Henderson, siendo necesario la presencia de todos los criterios mayores y al menos uno de los menores.
- ☐ d. En la presencia de los criterios de Hager, siendo necesario la presencia de todos los criterios mayores y al menos uno de los menores.


Pregunta **39**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

La localización más frecuente de la endometriosis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Recto.
- ☐ b. Vagina.
- ☒ c. Ovario. 
- ☐ d. Fondo de saco de Douglas.

Pregunta **40**

Correcta

Puntuá 1,0 sobre 1,0

En la edad adulta los cuerpos extraños que más comúnmente que pueden quedarse alojados en vagina son:

Seleccione una:

- ☒ a. Tampones, preservativos y juguetes sexuales. ✓
- ☐ b. Ropa interior y compresas.
- ☐ c. Esponja de la ducha.
- ☐ d. Ninguna es correcta.



Fundación de Enfermería en Castilla y León

Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León

## Info

Info Formacion on-line feCyL

WEB feCyL

WEB Consejo de Enfermería CyL


Secretaria Virtual feCyL

Soporte para el CapusVirtual

Soporte correo

## Contacto

C/Alcalleres, 5 - 47001-Valladolid

 Teléfono : +34 983 377 999

 Correo electrónico: [dptosoporte@fecyl.com](mailto:dptosoporte@fecyl.com)

Todos los derechos reservados © 2017 - Fundación Enfermería en Castilla y León