

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación previa x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆

24 100 Finalizar revisión

Para acceder al caso práctico del Módulo 3 [pincha aquí](#)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

El periodo de incubación del virus del Ébola es:

Seleccione una:

- ☐ a. De 5 a 15 días.
- ☐ b. De 8 a 24 horas.
- ☒ c. De 2 a 21 días (comúnmente de 8 a 10 días). ✓
- ☐ d. De 20 a 35 días.

La respuesta correcta es: De 2 a 21 días (comúnmente de 8 a 10 días).

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Uno de los principales métodos de control de la sarna es:

Seleccione una:

- ☐ a. Campañas de vacunación.
- ☐ b. Trabajo con aguas para su depuración y limpieza.
- ☒ c. Educación sanitaria a la comunidad sobre modos de transmisión, diagnóstico temprano y tratamiento de afectados y contactos. ✓
- ☐ d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: Educación sanitaria a la comunidad sobre modos de transmisión, diagnóstico temprano y tratamiento de afectados y contactos.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Neisseria meningitidis, streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae tipo B, estos tres microorganismos son los responsables de las meningitis bacterianas en un:

Seleccione una:

- ☐ a. 60%.
- ☐ b. 90%.
- ☐ c. 25%.
- ☒ d. 75%. ✓

La respuesta correcta es: 75%.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Dentro del virus del Ébola, según la OMS ¿qué países se encuentran en el momento actual en vigilancia?

Seleccione una:

- ☐ a. Guinea Conakry y Liberia.
- ☐ b. Nigeria y Liberia.
- ☐ c. Sierra Leona y República democrática del Congo.
- ☒ d. Sierra Leona y Guinea Conakry. ✓

La respuesta correcta es: Sierra Leona y Guinea Conakry.

17:03 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación previa x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆

La respuesta correcta es: Sierra Leona y Guinea Conakry.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿El modo de transmisión del virus del Ébola es?

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto directo a través de esporas en suspensión.
- ☐ b. A través de saliva y esputos contaminados.
- ☒ c. Contacto directo con la sangre, las secreciones, los órganos o el semen infectados. ✓
- ☐ d. A través de la piel, por eso es un aislamiento estricto.

La respuesta correcta es: Contacto directo con la sangre, las secreciones, los órganos o el semen infectados.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Qué tipo de prueba sería la más apropiada para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar?

Seleccione una:

- ☐ a. Frotis faríngeo.
- ☒ b. Presencia de bacilos ácido-alcohol-resistentes en frotis de esputo u otros líquidos corporales. ✓
- ☐ c. Serología.
- ☐ d. Mantoux.

La respuesta correcta es: Presencia de bacilos ácido-alcohol-resistentes en frotis de esputo u otros líquidos corporales.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Para la detección del Coronavirus, ¿qué tipo de muestras son las idóneas?

Seleccione una:

- ☐ a. Orina.
- ☐ b. Sangre.
- ☒ c. Lavado broncoalveolar, esputo y aspirado endotraqueal. ✓
- ☐ d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: Lavado broncoalveolar, esputo y aspirado endotraqueal.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Para la transmisión del coronavirus de una persona a otra, ¿qué tipo de contacto requiere?

Seleccione una:

- ☐ a. Mínimo porque se transmite a través del aire con esporas.
- ☐ b. Contacto indirecto a través de animales contaminados siendo estos la vía de transmisión, sino tengo contacto con los animales no tendré riesgo alguno.
- ☒ c. No se transmite fácilmente, a menos que tenga un contacto estrecho, sin tomar las medidas de protección necesarias. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: No se transmite fácilmente, a menos que tenga un contacto estrecho, sin tomar las medidas de protección necesarias.

17:04 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación previa x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆ ⋮

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Cuál es la vía de transmisión del sarampión?

Seleccione una:

- ☒ a. Gotitas suspendidas en aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. ✓
- ☐ b. A través de animales domésticos.
- ☐ c. En aguas en mal estado de depuración y limpieza.
- ☐ d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Gotitas suspendidas en aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

El principal reservorio de bacillus antrax es:

Seleccione una:

- ☐ a. Humanos.
- ☐ b. Agua contaminadas en mal estado.
- ☐ c. Cuerpos en descomposición.
- ☒ d. Animales, principalmente herbívoros ya sea domésticos o silvestres. ✓

La respuesta correcta es: Animales, principalmente herbívoros ya sea domésticos o silvestres.

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Qué porcentaje de personas que han tenido la varicela pueden desarrollar herpes zoster en adultos?

Seleccione una:

- ☐ a. 25%.
- ☐ b. 35%.
- ☒ c. 15%. ✓
- ☐ d. 8-10%.

La respuesta correcta es: 15%.

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

El método de detección para la difteria faríngea es:

Seleccione una:

- ☐ a. Exudado nasofaríngeo.
- ☒ b. Exudado faríngeo. ✓
- ☐ c. Exudado ótico.
- ☐ d. Exudado nasal.

La respuesta correcta es: Exudado faríngeo.

17:04 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación previa x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆ ⋮

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Cuál es el modo de transmisión de la fiebre tifoidea?

Seleccione una:

- ☐ a. Animales salvajes.
- ☐ b. Contacto directo con sangre y fluidos corporales.
- ☒ c. Ingestión de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos portadores. ✓
- ☐ d. Por el aire o diseminación por gotitas.

La respuesta correcta es: Ingestión de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos portadores.

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Cuál es el principal modo de transmisión del ántrax?

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto con cuerpos en descomposición.
- ☒ b. Contacto con tejidos animales que han fallecido de la enfermedad. ✓
- ☐ c. Paciente portador a otro portador.
- ☐ d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: Contacto con tejidos animales que han fallecido de la enfermedad.

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿De qué enfermedad son característicos los siguientes síntomas: infestación parasitaria de la piel causada por un ácaro, cuya penetración es visible en forma de pápulas, vesículas o surcos lineales diminutos que contienen ácaros y sus huevos?

Seleccione una:

- ☐ a. Eritema nodoso.
- ☒ b. Sarna. ✓
- ☐ c. Pediculosis.
- ☐ d. Difteria.

La respuesta correcta es: Sarna.

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿A qué patología corresponde los siguientes síntomas? Tos irritante, que se transforma en paroxística en torno a dos semanas y que dura de uno a dos meses

Seleccione una:

- ☐ a. Difteria.
- ☐ b. Carbunco.
- ☒ c. Tosferina. ✓
- ☐ d. Parotiditis.

La respuesta correcta es: Tosferina.

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Cuál es el reservorio principal del virus del Ébola?

17:04 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación prev... x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuál es el reservorio principal del virus del Ébola?

Seleccione una:

- ☐ a. Se relacionaron en África con cabras y ovejas fallecidas.
- ☐ b. El principal reservorio de esta enfermedad son perros con la rabia.
- ☒ c. El reservorio de las infecciones por el virus del Ébola de los casos índice humanos se relacionaron con el contacto con gorilas, chimpancés y antílopes selváticos. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: El reservorio de las infecciones por el virus del Ébola de los casos índice humanos se relacionaron con el contacto con gorilas, chimpancés y antílopes selváticos.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿A qué enfermedad corresponde los siguientes síntomas? Enfermedad vírica aguda muy contagiosa síntomas prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y manchas de aspecto blanquecino/ azulado sobre una base eritematosa en la mucosa interna de la mejilla.

Seleccione una:

- ☐ a. Parotiditis.
- ☒ b. Sarampión. ✓
- ☐ c. Varicela.
- ☐ d. Sarna.

La respuesta correcta es: Sarampión.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Microorganismo responsable de la conjuntivitis bacteriana:

Seleccione una:

- ☐ a. Bacillus anthracis.
- ☐ b. Micobacterium bovis.
- ☒ c. Haemophilus influenzae/ streptococcus pneumoniae. ✓
- ☐ d. Estafilococo aureus meticilín sensible.

La respuesta correcta es: Haemophilus influenzae/ streptococcus pneumoniae.

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

El periodo de incubación de la rubeola congénita es:

Seleccione una:

- ☐ a. De 7 a 10 días.
- ☐ b. De 4 a 20 días.
- ☐ c. Aproximadamente unos 5 días.
- ☒ d. De 14 a 17 días. ✓

La respuesta correcta es: De 14 a 17 días.

17:04 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación prev... x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Transmisibilidad de la sarna:

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto indirecto a través de estructuras inertes infectadas.
- ☐ b. Aguas residuales y contaminadas.
- ☒ c. Contacto directo y prolongado con piel afectada por el ácaro y durante relaciones sexuales. ✓
- ☐ d. A través de animales salvajes.

La respuesta correcta es: Contacto directo y prolongado con piel afectada por el ácaro y durante relaciones sexuales.

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Las manifestaciones clínicas de la pediculosis son:

Seleccione una:

- ☐ a. Rubor, calor y dolor.
- ☒ b. Picor, irritación y aparición de lesiones en ocasiones. ✓
- ☐ c. Lagrimeo, picor de garganta.
- ☐ d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: Picor, irritación y aparición de lesiones en ocasiones.

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Qué entiendes por Herpes Zoster?

Seleccione una:

- ☐ a. Reactivación de la enfermedad de las paperas.
- ☒ b. Manifestación clínica que aparece al reactivarse la infección latente por el virus de la varicela. ✓
- ☐ c. Lesión típica de la infección por coronavirus.
- ☐ d. Síntoma característico de la enfermedad por corynebacterium diphtheriae.

La respuesta correcta es: Manifestación clínica que aparece al reactivarse la infección latente por el virus de la varicela.

Pregunta 24
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿A qué tipo de enfermedad viral aguda, corresponde una erupción cutánea maculopopulosa durante pocas horas, vesiculosa durante tres o cuatro días y que deja costras granulosas?

Seleccione una:

- ☐ a. Difteria.
- ☐ b. Tosferina.
- ☐ c. Parotiditis.
- ☒ d. Varicela/ Herpes zoster diseminado. ✓

La respuesta correcta es: Varicela/ Herpes zoster diseminado.

Pregunta 25
Correcta

Señale la respuesta falsa respecto a varicela:

17:04 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación previa x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆ ⋮

Pregunta 25
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Señale la respuesta falsa respecto a varicela:

Seleccione una:

- ☐ a. Periodo transmisibilidad de 1 a 2 días antes de que aparezca la erupción.
- ☐ b. Un buen método de control y prevención es la vacunación.
- ☐ c. Periodo incubación de dos a tres semanas, comúnmente 14 a 16 días.
- ☒ d. Susceptibilidad en países subdesarrollados, siendo más grave en niños que en adultos. ✓

La respuesta correcta es: Susceptibilidad en países subdesarrollados, siendo más grave en niños que en adultos.

Pregunta 26
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones persona a animal, siendo los caballos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección para otros animales.
- ☒ b. La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones persona a persona, siendo los camellos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección en humanos. Aunque se desconoce la ruta de transmisión del virus. ✓
- ☐ c. La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones animal a animal, siendo los camellos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección para las animales.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones persona a persona, siendo los camellos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección en humanos. Aunque se desconoce la ruta de transmisión del virus.

Pregunta 27
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Dónde fue detectado por primera vez el coronavirus?

Seleccione una:

- ☐ a. Irán 2012.
- ☒ b. Arabia Saudí 2012. ✓
- ☐ c. Irak 2011.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Arabia Saudí 2012.

Pregunta 28
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Qué tipo de aislamiento requieren las fiebres hemorrágicas, como por ejemplo la enfermedad vírica aguda grave Ébola?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento gotas.
- ☒ b. Aislamiento aéreo. ✗
- ☐ c. Aislamiento protector.
- ☐ d. Aislamiento estricto.

La respuesta correcta es: Aislamiento estricto.

Windows taskbar: 17:04 16/11/2016

ITINERARIO VALORACIÓN x Caso práctico - Módulo 3 x Sindicato de enfermería x Test de evaluación previa x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077395 ☆ ⋮

Pregunta 27
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Dónde fue detectado por primera vez el coronavirus?

Seleccione una:

- ☐ a. Irán 2012.
- ☒ b. Arabia Saudí 2012. ✓
- ☐ c. Irak 2011.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Arabia Saudí 2012.

Pregunta 28
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

¿Qué tipo de aislamiento requieren las fiebres hemorrágicas, como por ejemplo la enfermedad vírica aguda grave Ébola?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento gotas.
- ☒ b. Aislamiento aéreo. ✗
- ☐ c. Aislamiento protector.
- ☐ d. Aislamiento estricto.

La respuesta correcta es: Aislamiento estricto.

Pregunta 29
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

Periodo de incubación de la varicela:

Seleccione una:

- ☒ a. De 14 a 16 días. ✓
- ☐ b. Algo más de tres semanas.
- ☐ c. De 5 a 7 días.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: De 14 a 16 días.

Pregunta 30
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
⚑ Marcar pregunta

El microorganismo responsable de la difteria faríngea es:

Seleccione una:

- ☒ a. Corynebacterium diphtheriae. ✓
- ☐ b. Mycobacterium tuberculosis.
- ☐ c. Haemophilus influenzae.
- ☐ d. Bacillus anthracis.

La respuesta correcta es: Corynebacterium diphtheriae.

Finalizar revisión

Windows taskbar: 17:04 16/11/2016

Sindicato de enfermería x Cuestionario: Enfermedades x Responder al mensaje x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077448 ☆

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

El paciente a su ingreso es trasladado a box de aislamiento, ¿qué aislamiento indicarias en este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento de contacto y estricto.
- ☐ b. Solo vigilar los piojos y no acercarme mucho.
- ☒ c. Aislamiento de contacto debido a la presencia de piojos y aislamiento aéreo ya que presenta lesiones compatibles con el virus de la varicela. ✓
- ☐ d. Solo aislamiento estricto.

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto debido a la presencia de piojos y aislamiento aéreo ya que presenta lesiones compatibles con el virus de la varicela.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

El periodo de incubación para los piojos es:

Seleccione una:

- ☒ a. 18 días para piojos de cuerpo y cabeza, 15 días para piojos de pubis. ✓
- ☐ b. Menos de 12 días.
- ☐ c. Más de 20 días tanto en piojos de cuerpo y cabeza y 25 en piojos de pubis.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: 18 días para piojos de cuerpo y cabeza, 15 días para piojos de pubis.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

En el caso de salida de la habitación, respecto a su aislamiento de contacto ¿qué medida sería muy importante para el control de los piojos?

Seleccione una:

- ☐ a. Uso de guantes e higiene de manos.
- ☒ b. Colocar un gorro cubriéndole perfectamente todo su pelo y colocarse el personal sanitario que este en contacto con el otro gorro. ✓
- ☐ c. Únicamente colocar mascarilla al tener condiciones higiénicas muy deficientes.
- ☐ d. Impregnaremos suavizante en cuero cabello para eliminar piojos y ya podrá salir sin medidas de aislamiento.

La respuesta correcta es: Colocar un gorro cubriéndole perfectamente todo su pelo y colocarse el personal sanitario que este en contacto con el otro gorro.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuánto tiempo tendrá que estar aislado el paciente debido a la presencia de piojos?

Seleccione una:

- ☐ a. Desde el momento de observarse 10 días ya que su ciclo de reproducción termina.
- ☒ b. Se mantendrá aislado hasta que no se observen huevos o piojos en la persona afectada. ✓
- ☐ c. En el momento de utilizar los geles adecuados ya se puede retirar el aislamiento.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Se mantendrá aislado hasta que no se observen huevos o piojos en la persona afectada.

Windows taskbar: 17:10 16/11/2016

Sindicato de enfermería x Cuestionario: Enfermedades x Responder al mensaje x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077448 ☆

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Tras confirmar el virus de la varicela por prueba diagnóstica ¿qué tipo de mascarilla utilizarías?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla quirúrgica.
- ☐ b. No es necesario si estoy a menos de un metro.
- ☒ c. Mascarilla FFP2. ✓
- ☐ d. Solo es necesaria si existe riesgo de salpicaduras y en este caso es quirúrgica.

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuáles son los nombres que reciben los piojos de cabeza, cuerpo y pubis respectivamente?

Seleccione una:

- ☒ a. P. Capitis, P. Corporis, y P. Pubis. ✓
- ☐ b. P. Cabellis, P. Corporis y P. Genitales.
- ☐ c. P. Pelus, P. cuerpo y P. Pubis.
- ☐ d. P. Cabellis, P. corporis y P. Pubis.

La respuesta correcta es: P. Capitis, P. Corporis, y P. Pubis.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuál puede ser uno de los métodos de control, para erradicar los piojos en el paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Higiene personal, retirar la ropa al paciente e introducirla en bolsa para tratamiento y lavado de la misma, tratamiento específico para cuello cabelludo. ✓
- ☐ b. Únicamente colocar gorro ya en su domicilio al alta realizar tratamiento.
- ☐ c. Uso de solución hidroalcohólica en nuestras manos para protegernos y sobre el paciente en cuero cabelludo.
- ☐ d. Rapar la cabeza.

La respuesta correcta es: Higiene personal, retirar la ropa al paciente e introducirla en bolsa para tratamiento y lavado de la misma, tratamiento específico para cuello cabelludo.

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuál sería el periodo de incubación para los piojos que presenta el paciente en cuero cabelludo y cuerpo y en pubis?

Seleccione una:

- ☐ a. 12 días para piojos de cabeza y cuerpo y 8 días para pubis.
- ☒ b. 8 días para piojos de cabeza y cuerpo y 12 días para pubis. ✗
- ☐ c. 10 días tanto para cabeza y cuerpo como para pubis.
- ☐ d. 18 días para cuerpo y cabeza y 15 días para piojos de pubis.

La respuesta correcta es: 18 días para cuerpo y cabeza y 15 días para piojos de pubis.

Windows taskbar: 17:11 16/11/2016

Sindicato de enfermería x Cuestionario: Enfermedades x Responder al mensaje x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077448 ☆

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Si este paciente sufriera una reactivación de su tuberculosis pasada ¿qué tipo de aislamiento sería necesario para este tipo de enfermedad?

Seleccione una:

- ☐ a. No precisa aislamiento.
- ☐ b. Aislamiento gotas.
- ☒ c. Aislamiento aéreo. ✓
- ☐ d. Aislamiento estricto.

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Qué tipo de mascarilla sería necesaria para el personal sanitario y familiares?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla FFP3.
- ☐ b. Mascarilla quirúrgica.
- ☒ c. Mascarilla FFP2. ✓
- ☐ d. Únicamente quirúrgica a menos de un metro del paciente.

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2.

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Cuáles serían los síntomas característicos para reconocer el sarampión que pasó nuestro paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Enfermedad vírica aguda, con síntomas de diarrea, vómitos es escopeta y abundantes nauseas.
- ☐ b. Enfermedad bacteriana, con aparición de vesículas prominentes en extremidades.
- ☒ c. Enfermedad vírica aguda, muy contagiosa con periodos prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la mejilla. ✓
- ☐ d. Enfermedad bacteriana, con presencia de tos seca y abundantes secreciones.

La respuesta correcta es: Enfermedad vírica aguda, muy contagiosa con periodos prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la mejilla.

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

¿Qué tipo de aislamiento necesitaríamos para el sarampión?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento estricto.
- ☐ b. Aislamiento protector.
- ☒ c. Aislamiento aéreo. ✓
- ☐ d. Aislamiento contacto.

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

Windows Taskbar: 17:11 16/11/2016

Sindicato de enfermería x Cuestionario: Enfermedades x Responder al mensaje x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077448 ☆

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Nuestro paciente ha sufrido una reactivación de la enfermedad de la varicela en forma de herpes zoster, ¿qué porcentaje de la población puede sufrir esta reactivación?

Seleccione una:

- ☐ a. 30%.
- ☐ b. 20%.
- ☒ c. 15%. ✓
- ☐ d. 45%.

La respuesta correcta es: 15%.

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Tras consultar a las personas convivientes, todos ellos están vacunados frente a la varicela o presentan anticuerpos frente a ella, ¿es necesario vacunarlos con la vacuna de la varicela?

Seleccione una:

- ☒ a. Si en la serología se observan anticuerpos de varicela, están inmunizados por lo que no es necesario vacunarlos. ✓
- ☐ b. Si es necesario vacunarlos ya que es un contacto directo.
- ☐ c. Deberemos esperar si presentan síntomas de aparición de varicela, si es así se vacunará.
- ☐ d. Solo vacunaremos a aquellos que se hayan administrado la vacuna hace más de diez años.

La respuesta correcta es: Si en la serología se observan anticuerpos de varicela, están inmunizados por lo que no es necesario vacunarlos.

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Nuestro paciente sufrió una tuberculosis previa, ¿sería necesario realizar aislamiento aéreo?

Seleccione una:

- ☒ a. No ya que la enfermedad está resuelta. ✓
- ☐ b. En ámbito hospitalario si, para proteger a otros pacientes.
- ☐ c. Si siempre por riesgo de reactivación de la enfermedad.
- ☐ d. Únicamente se aislará utilizando mascarilla FFP2 para realizar maniobras invasivas.

La respuesta correcta es: No ya que la enfermedad está resuelta.

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
▼ Marcar pregunta

Tras varios días ingresado se quiere recoger muestra biológica del paciente para descartar tuberculosis bacilífera pulmonar ¿qué tipo de muestra es la idónea para detectar bacilos ácido alcohol resistentes?

Seleccione una:

- ☐ a. Exudado nasofaríngeo.
- ☐ b. Gastroscopia y recogida de muestra.
- ☒ c. Espujo u otros líquidos corporales. ✓
- ☐ d. Muestra de orina.

La respuesta correcta es: Espujo u otros líquidos corporales.

Windows Taskbar: 17:11 16/11/2016

Sindicato de enfermería x Cuestionario: Enfermedades x Responder al mensaje x

← → ↻ prescripcion.fuden.es/mod/quiz/review.php?attempt=1077448 ☆

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuál sería el periodo de incubación para la tuberculosis?

Seleccione una:

- ☐ a. Tres semanas.
- ☐ b. Cinco días.
- ☒ c. De dos a diez semanas. ✓
- ☐ d. 48-72 horas.

La respuesta correcta es: De dos a diez semanas.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Uno de los principales síntomas es una tos intensa que puede durar:

Seleccione una:

- ☐ a. 1 semana.
- ☒ b. 3 semanas o más. ✓
- ☐ c. Menos de 5 días.
- ☐ d. Más de 5 semanas.

La respuesta correcta es: 3 semanas o más.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

En caso de posible tuberculosis activa ¿sería necesario realizar la prueba de mantoux a los convivientes?

Seleccione una:

- ☒ a. Si a todos. ✓
- ☐ b. No es necesario.
- ☐ c. Solo aquellos que hayan tenido relaciones sexuales con él.
- ☐ d. Solo a aquellos que tengan diagnóstico confirmado de VIH.

La respuesta correcta es: Si a todos.

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuánto tiempo dura el periodo de transmisibilidad de la tuberculosis?

Seleccione una:

- ☒ a. Mientras expulse bacilos tuberculosos, con el tratamiento adecuado la transmisibilidad se elimina de dos a cuatro semanas. ✓
- ☐ b. Desde el momento que se pone tratamiento 1 semana.
- ☐ c. Desde el inicio de síntomas hasta seis semanas que es cuando deja de producir bacilos tuberculosos.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Mientras expulse bacilos tuberculosos, con el tratamiento adecuado la transmisibilidad se elimina de dos a cuatro semanas.

17:11 16/11/2016