

Comenzado el	jueves, 27 de julio de 2017, 12:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 4 de agosto de 2017, 16:30
Tiempo empleado	8 días 4 horas
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con cuál de los siguientes fármacos puede aparecer candidiasis orofaríngea:
Seleccione una:

- a. Agonistas
- b. Glucocorticoides inhalados
- c. Anticolinérgicos
- d. Teofilina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucocorticoides inhalados

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes características de los fármacos agonistas B2-adrenergicos es falsa:
Seleccione una:

- a. Los agonistas de acción prolongada se emplean en monoterapia
- b. Como reacciones adversas pueden aparecer taquicardia y palpitaciones
- c. Se pueden administrar por vía inhalatoria, oral y parenteral
- d. Los agonistas B2-adrenergicos son los broncodilatadores mas rapidos qu existen

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los agonistas de acción prolongada se emplean en monoterapia

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes indicaciones de los fármacos anticolinérgicos es incorrecta:
Seleccione una:

- a. Bromuro de ipratropio se emplea como alternativa en pacientes que no toleran el tratamiento con agonistas
- b. Bromuro de tiotropio está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento en pacientes con EPOC

- c. Bromuro de tiotropio se emplea como broncodilatador en las crisis asmáticas
- d. Bromuro de ipratropio se puede utilizar como coadyuvante de agonistas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bromuro de tiotropio se emplea como broncodilatador en las crisis asmáticas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes reacciones adversas no es debida a la administración de codeína:

Seleccione una:

- a. Sedación
- b. Nauseas
- c. Depresión respiratoria con dosis altas
- d. Diarrea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diarrea

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguiente fármacos agonistas B2-adrenergicos es de acción prolongada:

Seleccione una:

- a. A: formoterol
- b. C: salmeterol
- c. B: terbutalina
- d. A y C son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctos

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes fármacos mucolíticos no se puede administrar por vía inhalatoria:

Seleccione una:

- a. Dornasa alfa
- b. Mesna
- c. Carbocisteina
- d. N- Acetilcisteina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbocisteína

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes fármacos se emplea como fármaco de rescate:

Seleccione una:

- a. Agonistas B2-adrenergicos de acción larga
- b. Glucocorticoides sistémicos
- c. Agonistas B2-adrenergicos de acción rápida
- d. Glucocorticoides inhalados

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agonistas B2-adrenergicos de acción rápida

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes factores reducen la eliminación de teofilina:

Seleccione una:

- a. Embarazo
- b. Fumadores de tabaco
- c. Ancianos
- d. Fiebre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ancianos

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es uno de los errores más frecuentes en el manejo de inhaladores:

Seleccione una:

- a. C: Inspiración bucal en lugar de nasal
- b. A: No realizar la apnea post-inspiratoria
- c. B: Inspiración demasiado rápida
- d. A y B son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son ciertas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes analgésicos cuál puede exacerbar el asma:

Seleccione una:

- a. AAS
- b. Paracetamol
- c. Codeína
- d. Tramadol

Retroalimentación

La respuesta correcta es: AAS

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes factores predisponentes que incrementan el riesgo de padecer asma uno es incorrecto:

Seleccione una:

- a. Edad
- b. Ejercicio
- c. Obesidad
- d. Factores genéticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ejercicio

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El modo de empleo correcto de los dispositivos de polvo seco multidosis es:

Seleccione una:

- a. Destapar-agitar-espirar-colocar en la boca y comenzar a inspirar-disparar y terminar la inspiración-aguantar la respiración
- b. Destapar-cargar el dispositivo -colocar la boquilla entre los labios-espirar- inspirar-aguantar la respiración
- c. Destapar-agitar-colocar en la boca- disparar-espirar- inspirar-aguantar la respiración
- d. Destapar-cargar el dispositivo-espirar-colocar la boquilla entre los labios e inspirar-

aguantar la respiración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Destapar-cargar el dispositivo-espirar-colocar la boquilla entre los labios e inspirar-aguantar la respiración

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento del asma persistente grave (escalón 5) consiste en:

Seleccione una:

- a. Glucocorticoide inhalado a dosis medias y un agonistas

- b. Glucocorticoide inhalado a dosis altas y un agonista
- c. Glucocorticoide inhalado a dosis baja de forma regular
- d. Glucocorticoide inhalado a dosis bajas y un agonistas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucocorticoide inhalado a dosis altas y un agonista

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la administración de los antagonistas del receptor de leucotrienos una de las siguientes recomendaciones es falsa

Seleccione una:

- a. Los comprimidos masticables de montelukast deben tomarse con alimentos
- b. Zafirlukast y los comprimidos masticables de montelukast deben tomarse en ayunas
- c. Montelukast se debe administrar por la noche
- d. Los comprimidos recubiertos y la presentación en granulado de montelukast pueden administrarse con o sin alimentos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los comprimidos masticables de montelukast deben tomarse con alimentos

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de las agudizaciones asmáticas se suele emplear:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Glucocorticoides sistémicos
- c. Oxígeno
- d. Agonistas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es cierto de ambroxol que:

Seleccione una:

- a. Disminuye la secreción de las vías respiratorias
- b. La administración intravenosa excesivamente rápida puede provocar cefalea, dolor en piernas y postración
- c. No se puede administrar por vía intravenosa

d. Las reacciones adversas más frecuentes son dermatológicas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La administración intravenosa excesivamente rápida puede provocar cefalea, dolor en piernas y postración

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué fármacos constituyen el tratamiento más efectivo del asma persistente:
Seleccione una:

a. Agonistas

b. Glucocorticoides inhalados

c. Anticolinérgicos

d. Antagonistas del receptor de leucotrienos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucocorticoides inhalados

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un inconveniente de los inhaladores de polvo seco unidosis:
Seleccione una:

a. Eliminan la dificultad de sincronizar pulsación con inhalación

b. Permiten controlar si la dosis ha sido administrada

c. Puede repetirse la inhalación cuando aún queda polvo en la cápsula

d. No recomendados en crisis asmática

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No recomendados en crisis asmática

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes diferencias entre asma y EPOC es incorrecta
Seleccione una:

a. En el asma la obstrucción es irreversible y en la EPOC es reversible.

b. El asma puede aparecer a cualquier edad, mientras que la EPOC suele darse a partir de los 40 años

c. Los pacientes asmáticos frecuentemente presentan rinitis, conjuntivitis y dermatitis, siendo infrecuente en los pacientes con EPOC

d. En el asma la respuesta a glucocorticoides es muy buena, mientras que en la EPOC es variable

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el asma la obstrucción es irreversible y en la EPOC es reversible.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes sentencias sobre omalizumab es falsa:

Seleccione una:

- a. Es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une selectivamente a la inmunoglobulina E
- b. Una de las reacciones adversas que puede aparecer es anafilaxia
- c. Está indicado como tratamiento adicional en asma alérgico grave y persistente
- d. Se administra por vía intramuscular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se administra por vía intramuscular