

Pregunta 1 Correcta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las recomendaciones que haríamos a Guillermo en el momento que presenta alteración del sabor de los alimentos estaría el no fomentar el cocinado con microondas o vapor pues desprenden más olor.

Seleccione una:



a. Falso



b. Verdadero

Pregunta 2 Correcta

Enunciado de la pregunta

Dos meses después de realizarse la laringuectomía total Guillermo no consigue reiniciar la alimentación oral de manera satisfactoria. Se realiza una gastrostomía para sustituir la SNG. Esta decisión no es acertada.

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso

Pregunta 3 Correcta

Enunciado de la pregunta

En el caso de alimentación con nutrición enteral no es necesario ser tan estricto con la higiene bucal.

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso

Pregunta 4 Incorrecta

Enunciado de la pregunta

En el momento del diagnóstico del carcinoma de boca sería más adecuado administrar la nutrición enteral de manera continua en lugar de intermitente.

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso.

Pregunta 5 Correcta

Enunciado de la pregunta

En la administración de Nutrición Enteral por sonda gastroeyunal es necesario hacerlo de manera continua.

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso

Pregunta 6 Incorrecta

Enunciado de la pregunta

Es más adecuado utilizar Nutrición Parenteral en el caso de Guillermo.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta 7 Incorrecta

Enunciado de la pregunta

Guillermo solicita comer y beber cuando ya se sabe que el cáncer se ha extendido y no hay posibilidad de modificar su pronóstico. Dejarle saborear algunos alimentos no es una medida acertada por el riesgo de broncoaspiración.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta 8 Correcta

Enunciado de la pregunta

La administración continua de Nutrición Enteral por la luz yeyunal de la sonda gastroyeyunal disminuye el riesgo de broncoaspiración.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta 9 Incorrecta

Enunciado de la pregunta

La Neumonía aspirativa es una complicación metabólica de la Nutrición Enteral.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero

Pregunta 10 Correcta

Enunciado de la pregunta

La sonda gastroyeyunal está absolutamente contraindicada en el caso de fístula digestiva alta.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

Pregunta 11 Correcta

Enunciado de la pregunta

La sustitución de la sonda por otra de mayor calibre en el caso de pérdida de contenido alimentario por el estoma es una medida adecuada.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta 12 Incorrecta

Enunciado de la pregunta

Las fórmulas nutricionales normocalóricas y normoproteicas son aquellas que aportan más de 1,1 Kcal/ml y más del 18% de la fórmula en forma de proteínas.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero

Pregunta 13 Incorrecta

Enunciado de la pregunta

Sería más conveniente administrarle a Guillermo una fórmula de nutrición enteral hipercalórica e hiperproteica.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso.
- ☐ b. Verdadero

Pregunta 14 Correcta

Enunciado de la pregunta

Tomar batidos a base de lácteos ayuda a paliar la xerostomía.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta 15 Correcta

Un valor de Albúmina de 2,9 gramos/litro indica un estado de desnutrición moderada.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso