

Navegación por el
cuestionario[Finalizar revisión](#)

Comenzado el lunes, 27 de junio de 2016, 20:10
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 27 de junio de 2016, 20:26
Tiempo empleado 16 minutos 20 segundos
Puntos 20,00/20,00
Calificación **10,00** de un máximo de 10,00 (**100%**)
Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La siguiente definición: "problemas, situaciones o etapas vitales que pueden generar respuestas humanas disfuncionales que precisen la puesta en marcha de planes de cuidados para resolver o controlar el problema o sus manifestaciones" corresponde al termino:

Seleccione una:

- a. Proceso vital de cuidados. ✓
 b. Diagnóstico de enfermería.
 c. Intervención enfermera.
 d. Diagnóstico de salud.

El proceso de inmunización está recogido en la metodología enfermera como un Proceso Vital de Cuidados (PVC), denominado problemas, situaciones o etapas vitales que pueden generar respuestas humanas disfuncionales que precisen la puesta en marcha de planes de cuidados para resolver o controlar el problema o sus manifestaciones.

La respuesta correcta es: Proceso vital de cuidados.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes efectos adversos no se considera neurológico?

Seleccione una:

- a. Hipotonía.
 b. Encefalitis.
 c. Convulsiones.
 d. Fiebre. ✓

Neurológicas: encefalopatías, encefalitis, convulsiones, hipotonía, disminución del estado de alerta, síndrome del llanto persistente.

La respuesta correcta es: Fiebre.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué calendario se debe aplicar en caso tener un niño o adolescente que no recibe las vacunas contempladas en el calendario oficial de vacunaciones a la edad recomendada?

Seleccione una:

- a. Calendario infantil.
 b. Calendario sistemático.
 c. Calendario acelerado. ✓
 d. Calendario de adultos.

Calendario acelerado: cualquier niño o adolescente que no recibe las vacunas contempladas en el calendario oficial de vacunaciones a la edad recomendada se convierte en una persona mal vacunada o incorrectamente vacunada para su edad y por tanto tiene un riesgo aumentado frente a las enfermedades que se intenta prevenir.

La respuesta correcta es: Calendario acelerado.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale la opción correcta sobre la situación de la polio en España:

Seleccione una:

- a. La cobertura vacunal en España de la polio es mayor del 90 %.
 b. El último brote autóctono fue a finales de los años 80.
 c. A y B son correctas. ✓
 d. Ninguna es correcta.

Poliomielitis: en España no hay casos de polio autóctona desde 1989, la cobertura vacunal es mayor del 90%.

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la composición de las vacunas estas pueden ser:

Seleccione una:

- a. De gérmenes vivos.
 b. De gérmenes atenuados.
 c. Recombinantes.
 d. Monovalentes. ✓

Tipos de vacunas según su composición: - Vacunas monovalentes: presentan un único antígeno, que corresponde a una misma especie microbiana. Ejemplo, vacuna del virus de la hepatitis B. - Vacuna polivalentes: presentan distintos tipos

antigénicos, que corresponden a una misma especie (sin inmunidad cruzada entre ellos). Ejemplo, vacuna oral, tipo Sabin, de la poliomielitis, que posee los serotipos 1, 2 y 3 del virus. - Vacunas combinadas: presentan distintos elementos antigénicos, que corresponden a distintas especies. Entre sus principales beneficios son la reducción del número de inyecciones por cada vacuna, disminuyendo, también, las posibles reacciones adversas y facilita el cumplimiento del calendario vacunal.

La respuesta correcta es: Monovalentes.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Sobre el calendario de adulto señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. El calendario de vacunación del adulto recoge las recomendaciones de vacunación a partir de los 18 años de edad. ✓
- b. El calendario no contempla nuevas recomendaciones de vacunación a partir de los 60 años.
- c. Es quizás el calendario vacunal más importante, este calendario vacunal va destinado a la población infantil de 0 a 18 años.
- d. Todas son correctas.

Calendario adulto: el calendario de vacunación del adulto recoge las recomendaciones de vacunación a partir de los 18 años de edad. Las recomendaciones de vacunación no se agotan con la infancia y hay vacunas especialmente indicadas para personas mayores.

La respuesta correcta es: El calendario de vacunación del adulto recoge las recomendaciones de vacunación a partir de los 18 años de edad.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué se define como el resultado de dividir el número de personas (numerador) a los que se les ha administrado una determinada vacuna, entre las personas (denominador) a las que se les debería haber administrado?

Seleccione una:

- a. Índice vacunal.
- b. Cobertura poblacional.
- c. Estado vacunal.
- d. Ninguna de las opciones es correcta. ✓

La cobertura vacunal se define como resultado de dividir el número de personas (numerador) a los que se les ha administrado una determinada vacuna, entre las personas (denominador) a las que se les debería haber administrado.

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En caso de paciente anticoagulado ¿Cuál será la vía de administración de una vacuna?

Seleccione una:

- a. Subcutánea. ✓
- b. Intradérmica.
- c. Intramuscular.
- d. Oral.

En caso de administración de tratamiento anticoagulado la vía de administración será la subcutánea.

La respuesta correcta es: Subcutánea.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Cuándo se administró la primera vacuna de viruela?

Seleccione una:

- a. 200 a C en las regiones de India y China.
- b. Hace más de 200 años fue cuando Edward Jenner administró la primera vacuna de viruela. ✓
- c. No ha existido vacuna de viruela, es una enfermedad que se erradicó sin necesidad de vacunarse.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Hace más de 200 años fue cuando Edward Jenner administró la primera vacuna de viruela, y desde ese momento se han producido grandes avances en el territorio de la vacunación; dándole además la importancia que se merece.

La respuesta correcta es: Hace más de 200 años fue cuando Edward Jenner administró la primera vacuna de viruela.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



La alergia al huevo grave es una contraindicación para la siguiente vacuna:

Seleccione una:

- a. Meningitis C.
- b. Neumococo 13V.
- c. Poliomielitis.
- d. Parotiditis. ✓

Las contraindicaciones de la vacuna antiparotiditis son las generales de todas las vacunas, embarazo, alergia al huevo, inmunodeficiencias y terapias inmunosupresoras (Ver tabla 1 texto aula virtual).

La respuesta correcta es: Parotiditis.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué tipo de prevención nace ante la necesidad de controlar la iatrogenia de la propia medicina?

Seleccione una:

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria. ✓

El concepto de prevención cuaternaria nace, pues, con características propias, ante la necesidad de controlar la iatrogenia de la propia medicina.

La respuesta correcta es: Prevención cuaternaria.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál fue la siguiente vacuna a la de la viruela que generó un gran avance en este tema?

Seleccione una:

- a. Varicela.
- b. Poliomielititis.
- c. Tos ferina.
- d. Ninguna de las anteriores. ✓

La vacuna contra la rabia de Louis Pasteur, generada en 1885, fue la siguiente en provocar un gran efecto contra las enfermedades humanas.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuánto tiempo debe dejarse para la administración entre dos vacunas de gérmenes vivos si no se ponen al mismo tiempo?

Seleccione una:

- a. 4 semanas. ✓
- b. 6 semanas.
- c. 8 semanas.
- d. Es indiferente.

Una vacuna de gérmenes vivos atenuados debe aplicarse o en la misma sesión o separada de otras 4 semanas de otra vacuna de virus vivos.

La respuesta correcta es: 4 semanas.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

La tuberculosis activa ¿Qué tipo de contraindicación es?

Seleccione una:

- a. Falsa.
- b. Relativa. ✓
- c. Grave.
- d. Absoluta.

Contraindicaciones generales: reacción anafiláctica a dosis previa, embarazo, trastornos neurológicos evolutivos, enfermedad aguda grave con o sin fiebre, inmunodeficiencias... Relativas: afectación del estado general acompañado de fiebre, tuberculosis activa, inmunodeficiencia primaria o secundaria... Falsas contraindicaciones: antecedentes familiares de convulsiones, administración concomitante de tratamiento de desensibilización, administración de tratamientos antibióticos, madre lactante, peso bajo al nacer, edad avanzada...

La respuesta correcta es: Relativa.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

La expresión "(00186) Disposición para mejorar el estado de inmunización" es un:

Seleccione una:

- a. Diagnóstico de enfermería: Diagnóstico de salud ✓
- b. Diagnóstico de enfermería. Diagnóstico real.
- c. Diagnóstico de enfermería. Diagnóstico de riesgo.
- d. Proceso vital de cuidados.

Los diagnósticos de salud compatibles con el PVC inmunización son: - (00186) Disposición para mejorar el estado de inmunización.

La respuesta correcta es: Diagnóstico de enfermería: Diagnóstico de salud

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

La siguiente definición aportada por la OMS en 1988 "Son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes" pertenece a:

Seleccione una:

- a. Prevención primaria. ✓
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.

Prevención primaria: "Son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes" (OMS, 1998)

La respuesta correcta es: Prevención primaria.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿A qué se refiere la siguiente definición "aquella sustancia que potencia la respuesta inmunitaria frente a un antígeno específico prolongando el efecto inmunogénico"?

Seleccione una:

- a. Adyuvante. ✓
- b. Dosis de refuerzo.
- c. Antígeno.
- d. Toxoide.

Adyuvante: se define como aquella sustancia que potencia la respuesta inmunitaria frente a un antígeno específico

prolongando el efecto inmunogénico.
La respuesta correcta es: Adyuvante.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Sobre las condiciones de almacenaje de las vacunas señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. El volumen de vacunas almacenadas no debe exceder del 40% de la capacidad total del frigorífico.
- b. En el exterior de la puerta del frigorífico deben colocarse documentos como: las hojas de registro de las temperaturas, teléfonos de contacto en caso de avería, protocolos de actuación. ✓
- c. Los envases no deben tocar las paredes, guardando una distancia mínima de 2 cm para evitar la congelación y posible degradación.
- d. Las vacunas que más se usen deben colocarse en la puerta.

Almacenaje: - El frigorífico en el que se almacenen las vacunas debe estar conectado a la red general eléctrica de forma directa mediante enchufe de fuerza y con toma de tierra y como medida de seguridad nunca debe estar enchufado simultáneamente con otros aparatos eléctricos y esto debe estar señalado en el enchufe con una pegatina que ponga "uso exclusivo". - En el exterior de la puerta del frigorífico deben colocarse documentos como: las hojas de registro de las temperaturas, teléfonos de contacto en caso de avería, protocolos de actuación. - El volumen de vacunas almacenadas no debe exceder del 50% de la capacidad total del frigorífico. La colocación de los preparados vacunales debe permitir de forma óptima la circulación del aire por el interior. - Los envases no deben tocar las paredes, guardando una distancia mínima de 5 cm para evitar la congelación y posible degradación. Deben conservarse en su envase original hasta el mismo momento de la administración. - Las vacunas de uso más frecuente deben tener más fácil acceso pero nunca deben colocarse en la puerta.

La respuesta correcta es: En el exterior de la puerta del frigorífico deben colocarse documentos como: las hojas de registro de las temperaturas, teléfonos de contacto en caso de avería, protocolos de actuación.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Respecto al mantenimiento de la temperatura de la nevera señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. La temperatura de la nevera tiene que estar en 2°C y 8°C.
- b. No se deben utilizar los frigoríficos tipo no frost.
- c. En el estante inferior, colocar las botellas de agua y/o de suero fisiológico para mantener la temperatura en caso de avería o corte de suministro.
- d. Todas son correctas. ✓

Mantenimiento de la temperatura - Debe disponer de un termostato que mantenga la temperatura ideal entre +2 °C y +8 °C. - No se deben utilizar los frigoríficos tipo no frost (sistema que incorporan algunos frigoríficos consistente en un sistema de enfriamiento por aire que evita la formación de escarcha en el aparato y, por tanto, que haya que descongelarlo dos veces al año) porque no mantienen la temperatura estable ni uniforme en su interior y en determinados lugares pueden alcanzar temperaturas por debajo de 0°C. - En el estante inferior se colocarán las botellas de agua y/o de suero fisiológico para mantener la temperatura en caso de avería o corte de suministro.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Respecto a la prevención terciaria señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. El concepto de prevención terciaria nace con características propias, ante la necesidad de controlar la iatrogenia de la propia medicina.
- b. En este caso las intervenciones del personal sanitario irán dirigidas a aquellas personas que ya presentan la enfermedad pero están asintomáticas.
- c. Este primer tipo de intervención va dirigido a todos aquellos individuos sanos con el fin de evitar posibles enfermedades evitables y sus consecuencias.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta. ✓

Prevención terciaria: En la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las mismas. Por ejemplo, en lo relativo a rehabilitación ejemplificamos: la realización de fisioterapia luego de retirar un yeso por fractura.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta.

[Finalizar revisión](#)