

[Saltar a contenido principal](#)

Campus Virtual CODEM

PABLO

Notificaciones



[Ver todo](#)

Correo

Escribe a tu tutor/a

[Bandeja de entrada](#)

[Destacado](#)

[Borradores](#)

[Enviado](#)

[Basura](#)

[Contacto soporte técnico](#)

[URG-2](#)



- [CODEM](#)
- [Expertos](#)
- [Formación online](#)



[Ruta a la página](#)

- [Página Principal](#)
- [Mis cursos](#)
- [URG-2](#)
- [Módulo 7: Técnicas en Urgencias y Emergencias](#)
- [Evaluación inicial Módulo 7: Autoevaluación asignatura 10](#)

Cuidados de práctica avanzada en urgencias y emergencias

Comenzado el jueves, 30 de enero de 2020, 12:14

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 30 de enero de 2020, 12:23

Tiempo empleado 9 minutos 13 segundos

Puntos 15,00/20,00

Calificación **7,50** de 10,00 (75%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas que ofrece el acceso central por vía periférica, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Disminución de la tasa de infecciones.
- b. Permite infundir líquidos con mayor rapidez que una vía central.
- c. Genera menos complicaciones y de menor gravedad.
- d. Ofrece mayor comodidad al paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permite infundir líquidos con mayor rapidez que una vía central.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Sobre la mascarilla laríngea Fastrach®, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Permite el aislamiento definitivo de la vía aérea al pasar un tubo orotraqueal a su través.
- b. No existen tamaños para niños menores de 30 kg.
- c. Permite la posición neutra del cuello durante su inserción.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

La colocación de la cánula nasofaríngea:

Seleccione una:

- a. Está contraindicada en pacientes con sospecha de fractura de la base del cráneo.
- b. Se puede colocar en pacientes conscientes.
- c. No protege contra la broncoaspiración.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Dentro de los condicionantes que pueden interferir en los resultados de una glucemia, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Muestra de sangre insuficiente.
- b. Acceso venoso con fluidoterapia en el mismo miembro.
- c. Esmalte de uñas.
- d. Falta e higiene de la piel.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esmalte de uñas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

La fórmula para calcular el número del tubo orotraqueal en niños entre 1 y 8 años es:

Seleccione una:

- a. $2 + \text{edad en años}/2$
- b. $4 + \text{edad en años}/4$
- c. $3 + \text{edad en años}/3$
- d. $4 + \text{edad en años}/2$

Retroalimentación

La respuesta correcta es: $4 + \text{edad en años}/4$

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Con respecto a la intubación orotraqueal, ¿cuál de las siguientes respuestas es incorrecta?:

Seleccione una:

- a. Debe ser realizada en un tiempo breve, menor de 30 segundos.
- b. Se deberá comprobar siempre la correcta ubicación del tubo orotraqueal.
- c. Se deberá comprobar siempre el correcto estado del material, previamente a la realización de la técnica.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

¿Qué nombres reciben los rudos percibidos durante la toma de tensión arterial?

Seleccione una:

- a. Stamirnoff.
- b. Korotkoff.
- c. Strogoff.
- d. Kotrokoz.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Korotkoff.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

El transductor, en la canalización de una vía arterial tiene como función:

Seleccione una:

- a. Mantener la permeabilidad del catéter.
- b. Obtener una onda de pulso.
- c. Facilitar la medición de la PVC.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

El punto de punción indicado para la canalización de una vía intraósea en niños menores de 8 años se encuentra en:

Seleccione una:

- a. Tibia proximal.
- b. Tibia distal.
- c. Fémur distal.
- d. Región media esternal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tibia proximal.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

A la hora de canalizar una vía umbilical es importante que tengamos en cuenta que:

Seleccione una:

- a. La vena umbilical se encuentra situada de forma tangencial a la arteria umbilical y es de menor calibre.
- b. La vena umbilical se encuentra situada en el centro del cordón umbilical y es de mayor calibre que las arterias.
- c. Las venas umbilicales tienen las paredes más gruesas que las arterias.
- d. Las venas umbilicales se localizan alrededor de la arteria umbilical, que se encuentra a su vez en el centro del cordón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La vena umbilical se encuentra situada en el centro del cordón umbilical y es de mayor calibre que las arterias.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

La colocación de una cánula orofaríngea, exige que:

Seleccione una:

- a. Que el paciente colabore.
- b. Que el enfermo esté intubado previamente.
- c. Que el enfermo esté inconsciente.
- d. Que el enfermo hable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que el enfermo esté inconsciente.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Con respecto a la mascarilla laríngea, es falso que:

Seleccione una:

- a. Permite una ventilación adecuada en condiciones de parada cardiorrespiratoria.
- b. Es el mejor método de aislamiento definitivo de la vía aérea.
- c. La punta de la mascarilla queda alojada en el esfínter esofágico superior.
- d. El aprendizaje para su colocación es más simple que para la intubación orotraqueal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el mejor método de aislamiento definitivo de la vía aérea.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor que modifica la toma de tensión arterial?

Seleccione una:

- a. Uso de un manguito más estrecho.
- b. Uso de un manguito más ancho.
- c. Ropa holgada por encima del lugar de colocación del manguito.
- d. Todas modifican los valores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ropa holgada por encima del lugar de colocación del manguito.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Dentro de las indicaciones de la intubación orotraqueal, encontramos:

Seleccione una:

- a. Saturación de oxígeno mayor de 90%.
- b. Glasgow mayor o igual a 8 puntos.
- c. Paciente incapaz de proteger la vía aérea por si mismo.
- d. Paciente con obstrucción de la vía aérea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paciente incapaz de proteger la vía aérea por si mismo.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

¿Cuándo debe realizarse una cricotiroidotomía de emergencia?

Seleccione una:

- a. En ahogamientos en agua salada.
- b. Siempre que no se tenga experiencia en la intubación orotraqueal.
- c. Para poder retirar la mascarilla laríngea.
- d. Ante una obstrucción insalvable de la vía aérea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ante una obstrucción insalvable de la vía aérea.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Sobre el tubo esofago-traqueal, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. La elección del tamaño adecuado se relaciona con el peso del paciente.
- b. Dispone de dos balones de neumotaponamiento.
- c. Permite el establecimiento de una vía aérea segura y efectiva.
- d. Está provisto de dos luces unidas en su extremo distal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La elección del tamaño adecuado se relaciona con el peso del paciente.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

En cuanto a la ventilación con resucitador manual:

Seleccione una:

- a. Es un buen método de aislamiento de la vía aérea.
- b. Permite retirar la cánula de Guedel.
- c. Es el sistema preferido de ventilación cuando no es posible el aislamiento de la vía aérea mediante otros sistemas.
- d. Es preferible a la intubación orotraqueal como sistema de ventilación por ser menos traumática.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el sistema preferido de ventilación cuando no es posible el aislamiento de la vía aérea mediante otros sistemas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Entre las complicaciones más frecuentes en la canalización de una vía central, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Embolia gaseosa.
- b. Neumotórax.
- c. Arritmias cardiacas.
- d. Todas son posibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son posibles.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las complicaciones de las cánulas orofaríngeas?

Seleccione una:

- a. Un tamaño inadecuado puede producir obstrucción de la vía aérea.
- b. La lengua puede desplazarse hacia atrás a colocar una cánula de tamaño mayor y colapsar las vías aéreas.
- c. Si el paciente no está inconsciente puede provocar el vómito.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Enunciado de la pregunta

Con respecto al sondaje vesical es falso que:

Seleccione una:

- a. Se debe fijar la sonda vesical al muslo del paciente con esparadrapo para evitar retiradas traumáticas.
- b. Si no se dispone de bolsas antirreflujo, no se deberá colocar la bolsa por encima del paciente.
- c. Una vez colocada se hinchará el globo con 10 ml de suero fisiológico.
- d. La postura para el sondaje femenino es en decúbito supino con rodillas flexionadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una vez colocada se hinchará el globo con 10 ml de suero fisiológico.

[Guardar el estado en las marcas](#)

Finalizar revisión

[Volver a: Módulo 7: Técni...](#)

[Saltar Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario

[Pregunta 1 Esta página](#) [Pregunta 2 Esta página](#) [Pregunta 3 Esta página](#) [Pregunta 4 Esta página](#) [Pregunta 5 Esta página](#) [Pregunta 6 Esta página](#) [Pregunta 7 Esta página](#) [Pregunta 8 Esta página](#) [Pregunta 9 Esta página](#) [Pregunta 10 Esta página](#) [Pregunta 11 Esta página](#) [Pregunta 12 Esta página](#) [Pregunta 13 Esta página](#) [Pregunta 14 Esta página](#) [Pregunta 15 Esta página](#) [Pregunta 16 Esta página](#) [Pregunta 17 Esta página](#) [Pregunta 18 Esta página](#) [Pregunta 19 Esta página](#) [Pregunta 20 Esta página](#)
[Finalizar revisión](#)

©2020 CODEM Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

[CODEM](#) | [Aviso legal](#) | [Seguridad](#) | [Cookies](#) | [Protección Datos Personales](#) | [Ayuda](#)