

ACTUALIZACIONES EN EL TRATAMIENTO NUTRICIONAL DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

Dirección: Dra. Katherine García Malpartida
Sra. Amparo Quilis Gimeno

i Curso
Programa
Metodología docente
Módulo
Módulo 1 > Artículo <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación > Encuesta
Módulo 2 > Artículo <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación > Encuesta
Módulo 3 > Artículo <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación > Encuesta
Módulo 4 > Artículo > Evaluación > Encuesta
Módulo 5 > Artículo > Evaluación > Encuesta
Caso práctico
> Artículo > Evaluación > Encuesta
Evaluación del curso
Pizarra de evaluación

Hola, **AMPA**

 Inicio

 Cerrar sesión

Actualizaciones en el Tratamiento Nutricional del Paciente Oncológico

Módulo 4: ¿Qué soporte nutricional es el adecuado?

1) La cuidadora de un paciente oncológico sometido a nutrición enteral a través de gastrostomía endoscópica percutánea en su domicilio nos cuenta que el paciente tiene estreñimiento. ¿Qué le recomendaría?

- ☐ a) Aportes adecuados de fibra.
- ☐ b) Aportes adecuados de agua.
- ☐ c) Movilizar al paciente de acuerdo con sus posibilidades.
- ☐ d) Solo las respuestas a y b son ciertas.
- ☒ e) Las respuestas a, b y c son ciertas.

2) ¿Cuál de los siguientes factores no se relaciona con la desnutrición asociada a la enfermedad en el paciente oncológico?

- ☐ a) Edad.
- ☐ b) Sexo.
- ☐ c) Estadio tumoral.
- ☒ d) Localización tumoral.
- ☐ e) Cirugía oncológica.

3) ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de nutrición parenteral en el paciente oncológico?

- ☐ a) Fístula enterocutánea de alto débito a nivel yeyunal.
- ☒ b) Situación terminal con pronóstico vital inferior a 1 mes.
- ☐ c) Preoperatorio en el paciente con desnutrición.
- ☐ d) Intolerancia a la nutrición enteral.
- ☐ e) Obstrucción intestinal.

4) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones nutricionales no está indicada en pacientes con cáncer?

- ☐ a) Restricción de la ingesta de fibra.
- ☐ b) Restricción de la ingesta de calorías.
- ☐ c) Restricción de la ingesta de sal.
- ☐ d) Restricción de alimentos ricos en proteínas.
- ☒ e) No se debe restringir ningún nutriente de la dieta.

5) Ramón es un varón de 42 años, diagnosticado de carcinoma epidermoide de lengua. Tiene colocada una gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) para nutrición enteral (NE). Necesita administrarse un analgésico a través de la PEG. ¿Qué le recomendaría?

- ☐ a) Introducir la cápsula entera.
- ☐ b) Machacar un comprimido de liberación prolongada.
- ☒ c) Buscar una alternativa en forma líquida.
- ☐ d) Machacar un comprimido con cubierta entérica.
- ☐ e) Diluir el fármaco en la fórmula de NE.

6) Pedro es un varón de 56 años, diagnosticado de carcinoma epidermoide de laringe. Ha perdido un 10 % de su peso corporal en el último mes. Presenta problemas de seguridad de la deglución. ¿Qué le recomendaría para mejorar su estado nutricional?

- ☒ a) Consejo dietético.
- ☐ b) Suplemento nutricional.
- ☐ c) Nutrición enteral completa por vía oral.
- ☐ d) Nutrición enteral completa a través de sonda nasogástrica.
- ☐ e) Nutrición parenteral.

7) En relación con el soporte nutricional de los pacientes oncológicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?

- ☒ a) Todos los pacientes deben recibir suplementos nutricionales al diagnóstico de la enfermedad.
- ☐ b) Los módulos nutricionales sirven para enriquecer la dieta en algún nutriente.
- ☐ c) El consejo dietético es el primer paso en el tratamiento nutricional.
- ☐ d) Se recomienda utilizar nutrición parenteral en pacientes con enteritis rídica con intolerancia digestiva.
- ☐ e) Todas son ciertas.

8) ¿Cuál de las siguientes es una complicación potencial de la nutrición parenteral?

- ☒ a) Infección.
- ☐ b) Neumonía por aspiración.
- ☐ c) Diarrea.
- ☐ d) Retraso del vaciado gástrico.
- ☐ e) Ninguna de las anteriores.

9) Los pacientes diagnosticados de cáncer pueden presentar hiponatremia por:

- ☐ a) Dolor.
- ☐ b) Náuseas.
- ☐ c) Tratamiento con morfina.
- ☐ d) Resistencia a la insulina e hiperglucemia.
- ☒ e) Todas son ciertas.

10) En la elección de la fórmula de nutrición enteral, se debe considerar:

- ☐ a) Requerimientos nutricionales del paciente.
- ☐ b) Funcionalidad del tracto digestivo.
- ☐ c) Si existe otra enfermedad de base.
- ☐ d) Composición y características de la solución.
- ☒ e) Todas son ciertas.

Continuar

