

**Calificación 10,00 de 10,00 (100%)**

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué tipo de shock será necesaria la utilización de medidas de asistencia ventricular una vez que haya fallado el tratamiento anterior?

Seleccione una:

- a. Shock hipovolémico
- b. Shock anafiláctico
- c. Shock cardiogénico
- d. Shock neurogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock cardiogénico

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el shock cursa con hipotensión, alteración del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes, diuresis aún más disminuida, acidosis metabólica progresiva y pueden aparecer arritmias, estamos en fase:

Seleccione una:

- a. Inicial
- b. Compensada
- c. Descompensada
- d. Irreversible

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descompensada

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para que se manifieste la situación de shock hipovolémico, la pérdida de sangre debe ser superior a:

Seleccione una:

- a. 25%
- b. 35%
- c. 30%
- d. 15%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 25%

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más común del shock cardiogénico es:

Seleccione una:

- a. Infarto agudo de miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo
- b. Insuficiencia cardiaca crónica
- c. Ambas son correctas
- d. Ambas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infarto agudo de miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Es necesario corregir la volemia antes de iniciar tratamiento con drogas vasoactivas.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso
- c. Solo en casos de shock hipovolémico
- d. Solo en casos de shock cardiogénico

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Como medida principal para el manejo de un paciente en estado de shock:

Seleccione una:

- a. Apertura de la vía aérea y correcta oxigenación
- b. Control estricto de las constantes vitales, diuresis...
- c. Vigilancia estricta del nivel de conciencia
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

el shock más frecuente de tipo distributivo es:

Seleccione una:

- a. Shock anafiláctico
- b. Shock endocrino
- c. Shock tóxico
- d. Shock séptico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock séptico

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El microorganismo que produce el shock de tipo toxico es:

Seleccione una:

- a. Staphilococcus aureus
- b. Klebsiella pneumoniae
- c. Estreptococo del grupo A
- d. Todos son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estreptococo del grupo A

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La alineación cervical, el uso de corticoides y atropina, es un tratamiento específico del shock de tipo:

Seleccione una:

- a. Cardiogénico
- b. Séptico
- c. Anafiláctico
- d. Neurogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neurogénico

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos diferenciar dos tipos de shock hipodinámico e hiperdinámico. El shock hipodinámico engloba:

Seleccione una:

- a. Shock anafiláctico, shock cardiogénico y shock obstructivo
- b. Shock obstructivo, shock cardiogénico y shock hipovolémico
- c. Shock hipovolémico, shock distributivo y shock cardiogénico
- d. Shock séptico, shock anafiláctico y shock neurogénico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock obstructivo, shock cardiogénico y shock hipovolémico