

## Exámen Módulo II

Question1

Puntos: --/1

A qué tipo de síntomas pertenecen los delirios característicos de los trastornos psicóticos

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Delirantes
- ☒ b. Positivos
- ☐ c. Negativos
- ☐ d. Desorganización

Enviar

Question2

Puntos: --/1

Cuál de los siguientes no es un subtipo de Trastorno de Ideas delirantes

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Erotomaniaco
- ☐ b. Celotípico
- ☒ c. Político

Enviar

Question3

Puntos: --/1

Cuál de los siguientes no está considerado un Trastorno de Ansiedad

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Trastorno Obsesivo - Compulsivo
- ☒ b. Agorafobia
- ☐ c. Trastorno de Angustia
- ☐ d. Trastorno por Estrés Postraumático

Enviar

Question4

Puntos: --/1

Cuáles de los siguientes criterios son necesarios para establecer el diagnóstico de Trastorno Obsesivo - Compulsivo

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Presencia de obsesiones o compulsiones lo suficientemente graves como para ocasionar pérdidas de tiempo de más
- ☐ b. La Compulsiones se desencadenan para prevenir o eliminar la ansiedad, y no para provocar placer
- ☐ c. Las Compulsiones se desencadenan para provocar placer, y no para prevenir o eliminar la ansiedad
- ☒ d. A y B son ciertas

Enviar

Question5

Puntos: --/1

Cuáles son las principales características de los trastornos de la personalidad

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Tienen carácter permanente e inflexible y provocan malestar o perjuicios para el sujeto
- ☐ b. Las personas con trastorno de la personalidad tienen mal carácter.
- ☐ c. Aparecen en la tercera década de vida y no duran más de dos años
- ☐ d. Son fácilmente modificables y de escasa duración.

Enviar

Question6

Puntos: --/1

Cuánto han de durar como máximo los síntomas de ansiedad tras un acontecimiento traumático para establecer el diagnóstico de Trastorno por Estrés Agudo

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Unos días
- ☒ b. Un mes
- ☐ c. Seis semanas
- ☐ d. Menos de un año

Enviar

Question7

Puntos: --/1

El episodio de alteración del estado del ánimo que cursa con un estado de ánimo bajo o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades y cuyos síntomas se mantienen la mayor parte del día, casi cada día, durante al menos 2 semanas consecutivas se conoce como:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Episodio Maníaco
- ☒ b. Episodio Depresivo Mayor
- ☐ c. Episodio Mixto
- ☐ d. Episodio Bipolar tipo I

Enviar

Question8

Puntos: --/1

El estado de alegría desbordante, la frenética actividad, la logorrea, la fuga de ideas y la excesiva energía son síntomas de:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Esquizofrenia desorganizada
- ☐ b. Trastorno de Ansiedad Generalizada

- ☒ c. Manía
- ☐ d. Psicosis generalizada

Enviar

Question9

Puntos: --/1

El miedo y, o creencia de tener una enfermedad debido a sensaciones físicas interpretadas por el sujeto como síntomas de una enfermedad se denomina:

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Hipocondría
- ☐ b. Trastorno Dismórfico Corporal
- ☐ c. Somatización
- ☐ d. Trastorno por somatización

Enviar

Question10

Puntos: --/1

El Trastorno del estado del ánimo crónico y con fluctuaciones que comprenden numerosos períodos de síntomas hipomaniacos y depresivos, que no llegan a constituir un episodio hipomaniaco ni un episodio depresivo mayor se denomina:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Trastorno Distímico
- ☒ b. Trastorno Ciclotímico
- ☐ c. Trastorno Bipolar tipo I
- ☐ d. Trastorno de Angustia

Enviar

Question11

Puntos: --/1

El Trastorno Distímico es:

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Un estado de ánimo crónicamente depresivo que está presente la mayor parte del día de la mayoría de los días durante al menos dos años
- ☐ b. Imposibilidad de mostrar emociones
- ☐ c. Estado de ánimo que alterna episodios depresivos y de manía
- ☐ d. Episodio depresivo que cursa después de un período de alta ansiedad.

Enviar

Question12

Puntos: --/1

En la Fobia Específica, con qué nombre se conoce el objeto o la situación concreta que es temida

Seleccione una respuesta.

☐ a. Objeto o situación fobógena

☒ b. Estímulo fóbico

☐ c. Origen del miedo

☐ d. Desencadenante

Enviar

Question13

Puntos: --/1

En un trastorno bipolar tipo II podemos encontrar:  
Seleccione una respuesta.

☐ a. Episodios de manía, depresivos e hipomaníacos

☐ b. Episodios de manía únicamente

☐ c. Episodios depresivos únicamente

☒ d. Episodios depresivos muy recurrentes, pero sin manía. **NO**

Enviar

Question14

Puntos: --/1

La ansiedad puede manifestarse de muchas formas sin llegar a requerir atención clínica. Aun así, cabe la posibilidad de que la envergadura de la respuesta de ansiedad sea lo suficientemente intensa como para suponer la aparición de algún Trastorno de Ansiedad. Qué criterios serían necesarios para justificar el trastorno

Seleccione una respuesta.

☐ a. Malestar clínicamente significativo

☐ b. Problemas de pareja

☐ c. Deterioro social importante en varias áreas de la vida de la persona.

☒ d. A y C son ciertas

Enviar

Question15

Puntos: --/1

La ansiedad y la preocupación excesivas que se observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en una muy amplia gama de acontecimientos y situaciones, son características del:  
Seleccione una respuesta.

☒ a. Trastorno por Ansiedad Generalizada

☐ b. Trastorno de Angustia

☐ c. Panofobia

☐ d. Trastorno Histriónico de la Personalidad

Enviar

Question16

Puntos: --/1

La aparición de síntomas que afectan las funciones motoras o sensoriales y que sugieren un trastorno neurológico sin que se puedan explicar completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos directos de una sustancia o por otro trastorno mental se conoce como:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Trastorno Somatomorfo de la Movilidad y la Sensación
- ☐ b. Hipocondría
- ☒ c. Trastorno de Conversión
- ☐ d. Trastorno de Somatización

Enviar

Question17

Puntos: --/1

La característica esencial del Trastorno Dismórfico Corporal es:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Múltiples defectos físicos
- ☒ b. Preocupación por algún defecto en el aspecto físico, que o bien no existe, o no es tan importante como lo percibe la persona
- ☐ c. Crisis de angustia repetitivas
- ☐ d. Miedo al reflejo de su imagen en un espejo o superficie reflectante

Enviar

Question18

Puntos: --/1

La presencia de qué tipo de crisis de angustia es necesaria para establecer el diagnóstico de Trastorno de Angustia

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Crisis de Angustia Inesperadas
- ☐ b. Crisis de Angustia Situacionales
- ☐ c. Crisis de Angustia más o menos relacionadas con una situación determinada
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Enviar

Question19

Puntos: --/1

Las obsesiones y las compulsiones:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Siempre se dan ambas en un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)
- ☒ b. No siempre se dan ambas, depende del tipo de TOC. Existen las obsesiones sin compulsiones

☐ c. Siempre se dan juntas

☐ d. Significan lo mismo

Enviar

Question20

Puntos: --/1

Palpitaciones, sudoración, falta de aliento, opresión torácica, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir y sofocaciones, son síntomas típicos de:

Seleccione una respuesta.

☐ a. Trastornos disociativos

☒ b. Una crisis de angustia

☐ c. Hiperactividad

☐ d. Trastornos psicóticos

Enviar

Question21

Puntos: --/1

Para establecer el diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor se requieren:

Seleccione una respuesta.

☐ a. Historia de episodios depresivos mayores con historia de episodios maníacos

☐ b. Historia de episodios depresivos mayores con historia de episodios mixtos

☒ c. Historia de episodios depresivos mayores sin historia de episodios maníacos o mixtos

☐ d. Historia de episodios maníacos sin historia de episodios mixtos o depresivos mayores

Enviar

Question22

Puntos: --/1

Para establecer el diagnóstico de Trastorno por Somatización es necesaria la presencia de una historia de dolor en cuatro zonas o funciones diferentes del cuerpo además de:

Seleccione una respuesta.

☐ a. Dos síntomas gastrointestinales

☐ b. Un síntoma sexual o reproductivo

☐ c. Un síntoma Neurológico

☒ d. Todas las anteriores son ciertas.

Enviar

Question23

Puntos: --/1

Señale la definición correcta sobre el concepto psicótico

Seleccione una respuesta.

☐ a. Trastorno de la percepción de la realidad.

- ☐ b. Trastorno del contenido del pensamiento.
- ☐ c. Trastorno de la forma del pensamiento.
- ☒ d. No existe un consenso internacional sobre el concepto de "psicótico".

Enviar

Question24

Puntos: --/1

Tras padecer dos o más crisis de angustia inesperadas, cuánto ha de durar como mínimo la preocupación por la posibilidad de padecer nuevas crisis y por sus posibles consecuencias para que se pueda diagnosticar un Trastorno de Angustia

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Un año
- ☒ b. Un mes
- ☐ c. Una semana
- ☐ d. La duración es indiferente

Enviar

Question25

Puntos: --/1

Un criterio para considerar unas conductas como indicadoras de un trastorno de la personalidad es:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Que se alternen con periodos de normalidad
- ☒ b. Que sean estables en el tiempo
- ☐ c. Que se trate de episodios de larga duración y que cursen con delirios de referencia
- ☐ d. Que se den siempre en situaciones estresantes y amenazantes.

Enviar